

Chem.
102 h

16. K. H. v. b.

Fresenius



BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Anleitung
zur
qualitativen chemischen Analyse

oder

die Lehre von den Operationen, von den Reagentien
und von dem Verhalten der bekannteren Körper
zu Reagentien,

sowie

systematisches Verfahren zur Auffindung der in der Pharmacie, den
Künsten und Gewerben häufiger vorkommenden Körper in einfachen
und zusammengesetzten Verbindungen.

Für Anfänger bearbeitet

von

Dr. C. Remigius Fresenius,

Assistent am chemischen Laboratorium der Ludwigs-Universität zu Gießen.

Mit einem Vorwort

von


Dr. Justus Liebig.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Braunschweig,

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

1843.




qualitativen chemischen Analyse

oder

die Lehre von den Operationen, von den Reagentien
und von dem Verhalten der bekannten Körper
zu Reagentien,

von

systematisches Verfahren zur Aufklärung der in der Pharmacie, den
Künsten und Gewerben häufiger vorkommenden Körper in einfachen
und zusammengesetzten Verbindungen.



Dr. C. Hennig'schen

Verlag des Verlegers, Laboratorium der Ludwig-Maximilians-Universität zu München.

Mit einem Vorwort

von

Dr. Justus Liebig.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Brannschweig,

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

1843

Bayerische
Staatsbibliothek
München

H e r r n

Dr. Clamor Marquart,

Apotheker und Vorsteher des pharmaceutischen Instituts in Bonn,

aus Hochachtung und Dankbarkeit

gewidmet

vom Verfasser.

Gießen, den 6. Aug. 1842

Dr. Justin Liebig.

H e r r n

Dr. Clamor Marquardt,

Apotheker und Vorsteher des pharmaceutischen Instituts in Bonn,

aus Hochachtung und Dankbarkeit

Gewinnet

von Verleger

Verlag von
J. Neumann, Neudamm
1874

V o r w o r t.

Herr Dr. Fresenius, welcher in dem hiesigen Universitäts-Laboratorium den Unterricht der Anfänger in der Mineral-Analyse leitet, hat in den beiden letzten Semestern die Methode befolgt, die in seiner „Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse“ von ihm beschrieben worden ist. Dieser Weg hat sich meiner Erfahrung gemäß eben so leicht fasslich als einfach und nützlich bewährt, so dass ich seine Methode Allen empfehlen kann, die sich in den Anfangsgründen der Mineralanalyse unterrichten wollen. Ich betrachte das vorliegende Werk als eine sehr zweckmäßige Vorschule für die Benutzung des trefflichen Handbuches vom Professor H. Rose und halte es für zum Unterricht in Lehranstalten und namentlich für Apotheker besonders geeignet. Die in dem hiesigen Laboratorium gemachten mannigfaltigen neuen Erfahrungen haben Herrn Dr. Fresenius in den Stand gesetzt, sein Werk mit vielen neuen und vereinfachten Scheidungsmethoden auszustatten, so dass es auch Denen willkommen sein wird, welche die gröfseren Werke über die Mineralanalysen schon besitzen.

Gießen, den 6 Aug. 1842.

Dr. Justus Liebig.

Vorrede zur ersten Auflage.

Da ich längere Zeit nicht das Glück hatte, mich unter der Leitung eines Lehrers mit chemischen Analysen zu beschäftigen, sondern in ihrer Ausführung ganz auf mich selbst beschränkt war, so bot sich mir besondere Gelegenheit, die Schwierigkeiten zu erkennen, welche dem sich selbst überlassenen Anfänger, trotz der trefflichen Anleitungen von H. Rose, Duflos und anderen Meistern, fast unvermeidlich entgegentreten. Diesen Schwierigkeiten einigermaßen zu begegnen ist der Zweck dieses Versuchs. Ich schrieb ihn anfänglich nur zu eigener Uebung, und würde nicht gewagt haben, ihn dem Drucke zu übergeben, wäre ich nicht von einem sachkundigen, bewährten Manne, dem ich ihn zur Beurtheilung vorlegte, dazu aufgefordert worden. Bei der Ausarbeitung wurden sowohl die ausgezeichneten Schriften, welche wir über diesen Theil der Chemie haben, als auch besonders die mir durch Mittheilung gewordenen Erfahrungen Anderer und die eignen zu Rathe gezogen. Ich fasste dabei hauptsächlich drei Punkte in's Auge, auf welche nach meiner Ansicht alles das Analysiren von Anfang besonders Erschwerende zurückgeführt werden kann. Erstens nemlich glaube ich bemerkt zu haben, dass Anfänger sich in dem großen Reichthum des Materials, welchen z. B. Rose's klassisches Werk bietet, öfters nicht zurecht finden, und trotz der Klarheit des genannten Handbuchs häufig den deutlichen Ueberblick verlieren. Zweitens halte ich dafür, dass die Theorie des Verfahrens von dem Anfänger nicht immer klar durchschaut wird, dass er dem Gange öfters mechanisch folgt, ohne sich der Gründe deutlich

bewusst zu sein, und drittens möchte häufiges Stocken und vielfache Irrungen der Anwesenheit solcher Substanzen zuzuschreiben sein, welche die bisherigen Anleitungen zum systematischen Verfahren nicht aufgenommen haben und welche doch nicht selten vorkommen dürften. Zur Abhülfe in Ansehung dieses letztern Punktes wurde der Kreis der Stoffe erweitert und hauptsächlich auch auf die dem Pharmaceuten wichtigen organischen Säuren Rücksicht genommen. Der Anfänger kann sich bei seinen Uebungen den Kreis nichts destoweniger nach Belieben enger ziehen, da es bei der getroffenen Einrichtung leicht sein wird, die Abschnitte, welche alsdann zu berücksichtigen, welche zu übergehen sind, aufzufinden.

Der leitende Gedanke bei Aufstellung des Verfahrens war möglichste Sicherheit. Die Ausführbarkeit alles Gesagten und die Richtigkeit der Schlüsse habe ich durch vielfache Versuche durchgängig geprüft.

Außer allgemeinen chemischen Kenntnissen wird auch die Kenntniss der Reagentien und der zu qualitativen Analysen nöthigen Instrumente und Apparate vorausgesetzt. Zu ihrer Erwerbung bieten die Schriften von Lindes: „die Reagentien und deren Anwendung“, und Winkelblech: „Elemente der analytischen Chemie“, treffliche Mittel.

Ob meine Hoffnung, mich dem gesetzten Ziele einigermaßen genähert zu haben, gegründet ist, mögen milde Beurtheiler dieses ersten Versuchs, möge der Erfolg entscheiden.

Frankfurt a. M., im April 1841.

Vorrede zur zweiten Auflage.

Bei der Abfassung meiner im vorigen Jahre erschienenen „Anleitung zur qualitativen Analyse“ bezweckte ich den angehenden Chemiker schnell zu einfacheren chemischen Untersuchungen zu befähigen, ihm einen klaren Ueberblick über diesen Fundamentaltheil der Chemie zu verschaffen. Die Einführung des Schriftchens im Liebig'schen Laboratorium, im pharmaceutischen Institute zu Bonn u. s. w., die nachsichtsvolle Beurtheilung, welche demselben überhaupt zu Theil geworden, gewährte mir die grösste Freude, zugleich aber auch die Ueberzeugung, dass meine Arbeit ihren Zweck nicht verfehlt, sondern einem Bedürfnisse angehender Chemiker einigermaßen entsprochen habe.

In Folge der guten Aufnahme, deren sich das Werkchen zu erfreuen hatte, ist bereits eine zweite Auflage desselben nöthig geworden. Ich übergebe dieselbe hiermit dem verehrten Publikum, und zwar nicht nur auf's sorgfältigste durchgesehen und vielfach verbessert, sondern auch mit Hinzufügung einer ganz neuen propädeutischen Abtheilung, so dass das Werkchen jetzt als ein zum Studium und zur gründlichen Erlernung der einfacheren qualitativen Analyse vollständiger Leitfaden angesehen, als ein selbstständiges Ganzes betrachtet werden kann. Ich entschloss mich zur Ausarbeitung dieses

propädeutischen Theiles erst, nachdem mir durch eigene Erfahrung die Ueberzeugung geworden war, dass eine derartige Erweiterung keineswegs überflüssig, dass sie vielmehr zur vollständigen Erreichung meiner Absicht zweckmäfsig und nützlich sei. Auch in dieser Abtheilung ist, wie überhaupt in dem ganzen Werkchen, nur auf die in der Pharmacie, den Künsten und Gewerben vorkommenden Körper Rücksicht genommen worden.

Mein eifrigstes Bestreben bei der gegenwärtigen Zusammenstellung war es, das Ganze möglichst consequent durchzuführen und jeden einzelnen Abschnitt in deutliche Beziehung zu den übrigen zu setzen. Es wurde daher sowohl bei der Auswahl der Reagentien, als auch bei der Angabe des Verhaltens der Körper zu Reagentien auf den Inhalt der zweiten Abtheilung ganz vorzügliche Rücksicht genommen. — Im Uebrigen ist der Plan und die Eintheilung des propädeutischen Theiles zu einfach, um weiterer Erläuterung zu bedürfen.

Der zweite Hauptabschnitt, welcher den Gang der Analyse enthält, ist zuvörderst mit einer Anweisung zur Untersuchung der einfachsten Verbindungen vermehrt worden. Ich bemerke dabei, dass ich diesen einfachen Gang hauptsächlich als Vorschule zu verwickelteren Untersuchungen betrachte, was mir zur Rechtfertigung dienen mag, dass ich darin dem kürzeren Weg öfters den weiteren, wo er mir lehrreicher schien, vorgezogen habe. — Die vielfachen Verbesserungen des systematischen Ganges zur Analyse zusammengesetzter Verbindungen verdanke ich theils eigenen fortgesetzten Bestrebungen, theils und hauptsächlich aber auch gütigen mündlichen Mittheilungen.

Da mir meine gegenwärtige Stellung als Assistent am Liebig'schen Laboratorium einen Blick in die Vorbildung einer sehr bedeutenden Anzahl beginnender Chemiker gestattet, da sie mich ihre Bedürfnisse und die Schwierigkeiten, welche sich dem Anfänger gleich beim Eintritt entgegenstellen, deutlich und

sicher erkennen lässt, so glaube ich einige Hoffnung hegen zu dürfen, in diesem Werkchen das wahrhaft Nothwendige von dem Entbehrlicheren glücklich geschieden und eine zur schnellen Einführung in den Gegenstand, zum klaren Verständniss der Sache möglichst zweckmäßige Darstellung gewählt zu haben.

Gießen im August 1842.

Mein eifrigstes Bestreben bei der gegenwärtigen Umarbeitung war es, das Ganze möglichst consequent durchzuführen und jeden einzelnen Abschnitt in deutliche Beziehung zu den übrigen zu setzen. Es wurde daher sowohl bei der Auswahl der Reagentien, als auch bei der Angabe des Verfahrens der Körper zu Reagentien auf den Inhalt der zweiten Abtheilung ganz vorzügliche Rücksicht genommen — Im Uebrigen ist der Plan und die Eintheilung des propädeutischen Theiles zu einfach, um weiterer Erläuterung zu bedürfen.

Der zweite Hauptabschnitt, welcher den Gang der Analyse enthält, ist zunächst mit einer Anweisung zur Untersuchung der einfachsten Verbindungen versehen worden. Ich bemerke dabei, dass ich diesen einfachen Gang hauptsächlich als Vorschule zu verwickelteren Untersuchungen beachte, was mir zur Rechtfertigung dienen mag, dass ich darin dem kürzeren Weg öfters den weiteren, wo er mir lehrreicher schien, vorgezogen habe. — Die vielfachen Verbesserungen des systematischen Ganges zur Analyse zusammengefasst, Verbindungen verdanke ich theils eigenen fortgesetzten Bestrebungen, theils und hauptsächlich aber auch gütigen mündlichen Mittheilungen.

Da mir meine gegenwärtige Stellung als Assistent am physikalischen Laboratorium einen Blick in die Vorbildung einer sehr bedeutenden Anzahl beginnender Chemiker gestattet, da sie mich ihre Bedürfnisse und die Schwierigkeiten, welche sich dem Anfänger gleich beim Eintritt entgegenstellen, deutlich und

Inhalt.

Erste Abtheilung.

Propädeutik der qualitativen chemischen Analyse.

	Seite
Ueber Begriff, Aufgabe, Zweck, Nutzen und Gegenstand der qualitativen chemischen Analyse und über die Bedingungen, worauf ein erfolgreiches Studium derselben beruht . . .	1

Erster Abschnitt.

Die Operationen §. 1.	4
1. Die Auflösung §. 2.	—
2. Die Krystallisation §. 3.	6
3. Die Fällung §. 4.	7
4. Die Filtration §. 5.	9
5. Die Decantation §. 6.	—
6. Das Abdampfen §. 7.	10
7. Die Destillation §. 8.	11
8. Das Glühen §. 9.	—
9. Die Sublimation §. 10.	12
10. Das Schmelzen und Aufschmelzen §. 11.	—
11. Die Anwendung des Löthrohrs §. 12.	13

Anhang zum ersten Abschnitt.

Apparate und Geräthschaften §. 13.	16
--	----

Zweiter Abschnitt.

Die Reagentien §. 14.	19
-------------------------------	----

A. Reagentien auf nassem Wege.

I. Allgemeine Reagentien.

a) Solche, welche vorzugsweise als einfache Lösungsmittel gebraucht werden.

1. Wasser §. 15.	22
2. Alkohol §. 16.	—
3. Aether §. 17.	23

b. Reagentien, welche hauptsächlich als chemische Lösungsmittel Anwendung finden.	
---	--

1. Chlorwasserstoffsäure §. 18.	23
2. Salpetersäure §. 19.	24
3. Salpetersalzsäure §. 20.	25
4. Essigsäure §. 21.	—
5. Chlorammonium §. 22.	26

c. Reagentien, welche besonders zur Abscheidung oder zur anderweitigen Charakterisirung von Körpergruppen dienen.	
---	--

1. Reagenspapiere §. 23.	27
2. Schwefelsäure §. 24.	28
3. Schwefelwasserstoff §. 25.	29
4. Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium §. 26.	30
5. Schwefelkalium §. 27.	31
6. Kali §. 28.	32
7. Kohlensaures Kali §. 29.	33
8. Ammoniak §. 30.	34
9. Kohlensaures Ammoniak §. 31.	35
10. Chlorbarium §. 32.	—
11. Salpetersaurer Baryt §. 33.	36
12. Chlorcalcium §. 34.	37
13. Salpetersaures Silberoxyd §. 35.	—
14. Eisenchlorid §. 36.	38

II. Besondere Reagentien auf nassem Wege.

a. Solche, welche vorzugsweise zur Erkennung oder Abscheidung einzelner Basen dienen.	
---	--

1. Schwefelsaures Kali §. 37.	39
---------------------------------------	----

	Seite		Seite
2. Phosphorsaures Natron §. 38.	40	2. Kohlensaurer Baryt §. 76.	57
3. Neutrales chromsaures Kali §. 39.	—	3. Salpetersaures Kali §. 77.	—
4. Cyankalium §. 40.	41	<i>II. Löthrohrreagentien.</i>	
5. Ferrocyankalium §. 41.	42	1. Kohle §. 78.	58
6. Ferridcyankalium §. 42.	42	2. Kohlensaurer Natron §. 79.	59
7. Kieselfluorwasserstoffsäure §. 43.	—	3. Cyankalium §. 80.	60
8. Oxalsäure §. 44.	43	4. Borax §. 81.	62
9. Oxalsaures Ammoniak §. 45.	44	5. Phosphorsalz §. 82.	63
10. Weinsteinsäure §. 46.	—	6. Salpetersaures Kobaltoxydul §. 83.	64
11. Saures weinsteinsaures Kali §. 47.	45	<i>Dritter Abschnitt.</i>	
12. Essigsaurer Baryt §. 48.	—	Verhalten der Körper zu Reagentien §. 84.	65
13. Kaustischer Baryt §. 49.	—	<i>A. Verhalten der Metalloxyde.</i>	
14. Zinnchlorür §. 50.	46	Erste Gruppe §. 85.	66
15. Goldchlorid §. 51.	—	a. Kali.	66
16. Platinchlorid §. 52.	47	b. Natron.	67
17. Zink §. 53.	—	c. Ammoniak.	—
18. Eisen §. 54.	48	Zweite Gruppe §. 86.	68
19. Kupfer §. 55.	—	a. Baryt.	69
b. Solche, welche vorzugsweise zur Erkennung oder Abscheidung einzelner Säuren dienen.		b. Strontian.	70
1. Essigsaures Kali §. 56.	—	c. Kalk.	—
2. Aetzkalk §. 57.	49	d. Magnesia.	71
3. Schwefelsaurer Kalk §. 58.	—	Dritte Gruppe §. 87.	73
4. Chlormagnesium §. 59.	50	a. Thonerde.	74
5. Schwefelsaures Eisenoxydul §. 60.	—	b. Chromoxyd.	—
6. Eisenoxyduloxydulösung §. 61.	51	Vierte Gruppe §. 88.	76
7. Bleioxyd §. 62.	—	a. Zinkoxyd.	—
8. Neutrales essigsaures Bleioxyd §. 63.	—	b. Manganoxydul.	77
9. Bleiessig §. 64.	52	c. Nickeloxyd.	78
10. Kupferoxyd §. 65.	—	d. Kobaltoxydul.	79
11. Schwefelsaures Kupferoxyd §. 66.	53	e. Eisenoxydul.	80
12. Salpetersaures Quecksilberoxydul §. 67.	53	f. Eisenoxyd.	81
13. Quecksilberoxyd §. 68.	54	Fünfte Gruppe §. 89.	84
14. Quecksilberchlorid §. 69.	—	Erste Abtheilung §. 90.	85
15. Salpetersaures Silberoxyd-Ammoniak §. 70.	—	a. Silberoxyd.	—
16. Schweflige Säure §. 71.	—	b. Quecksilberoxydul.	—
17. Chlor §. 72.	55	c. Bleioxyd.	87
18. Indiglösung §. 73.	56	Zweite Abtheilung §. 91.	88
19. Stärkekleister §. 74.	—	a. Quecksilberoxyd.	—
B. Reagentien auf trockenem Wege.		b. Kupferoxyd.	89
<i>I. Aufschliefsungs- und Zersetzungs-mittel.</i>		c. Wismuthoxyd.	91
1. Mischung von kohlensaurem Natron und kohlensaurem Kali §. 75.	—	d. Cadmiumoxyd.	92
		Sechste Gruppe §. 92.	93
		Erste Abtheilung §. 93.	94
		a. Goldoxyd.	—
		b. Platinoxyd.	—
		Zweite Abtheilung §. 94.	95
		a. Antimonoxyd.	—
		b. Zinnoxydul.	98
		c. Zinnoxyd.	99
		d. Arsenige Säure.	100
		e. Arseniksäure.	107

Seite	Seite
B. Verhalten der Säuren §. 95.	111
I. Unorganische Säuren.	
Erste Gruppe.	
Erste Abtheilung §. 96.	113
a. Arsenige und Arsen-Säure.	—
b. Chromsäure.	—
Zweite Abtheilung §. 97.	114
a. Schwefelsäure.	—
Dritte Abtheilung §. 98.	115
a. Phosphorsäure.	—
b. Borsäure.	117
c. Oxalsäure.	118
d. Fluorwasserstoffsäure.	119
Vierte Abtheilung §. 99.	122
a. Kohlensäure.	—
b. Kieselsäure.	—
Zweite Gruppe §. 100.	124
a. Chlorwasserstoffsäure.	—
b. Bromwasserstoffsäure.	125
c. Jodwasserstoffsäure.	126
d. Cyanwasserstoffsäure.	128
e. Schwefelwasserstoffsäure.	129
Dritte Gruppe §. 101.	131
a. Salpetersäure.	—
b. Chlorsäure.	132
II. Organische Säuren.	
Erste Gruppe §. 102.	134
a. Oxalsäure.	—
b. Weinsteinsäure.	—
c. Traubensäure.	135
d. Citronensäure.	136
e. Aepfelsäure.	137
Zweite Gruppe §. 103.	139
a. Bernsteinsäure.	—
b. Benzoësäure.	140
Dritte Gruppe §. 104.	141
a. Essigsäure.	—
b. Ameisensäure.	142

Zweite Abtheilung.

Systematischer Gang der qualitativen chemischen Analyse.

Seite	Seite
Ueber den Gang einer qualitativen chemischen Analyse im Allgemeinen und über den Plan der vorliegenden zweiten Abtheilung insbesondere.	147
Erster Abschnitt.	
Praktisches Verfahren.	
I. Einleitende Prüfung §. 105.	150
A. Der zu untersuchende Körper ist fest.	—
1. Er ist weder ein regulinisches Metall, noch eine Legirung.	—
2. Er ist entweder ein regulinisches Metall, oder eine Legirung.	154
B. Der zu untersuchende Körper ist eine Flüssigkeit.	155
II. Auflösung der Körper oder Eintheilung derselben nach ihrem Verhalten zu gewissen Lösungsmitteln §. 106.	156
A. Der Körper ist weder ein regulinisches Metall, noch eine Legirung.	157
B. Der Körper ist ein Metall oder eine Legirung.	159
III. Eigentliche Untersuchung.	
Verbindungen, in welchen nur eine Basis und eine Säure oder ein Metall und ein Metalloid vorausgesetzt wird.	
A. In Wasser lösliche Körper.	
Auffindung der Base §. 107.	161
Auffindung der Säure.	
1. Einer unorganischen §. 108.	167
2. Einer organischen §. 109.	169
B. In Wasser unlösliche, in Salzsäure oder Salpetersäure lösliche Körper.	
Auffindung der Base §. 110.	171
Auffindung der Säure.	
1. Einer unorganischen §. 111.	174
2. Einer organischen §. 112.	176
C. In Wasser und Säuren unlösliche oder schwer lösliche Körper.	
Auffindung der Base und der Säure §. 113.	176
Verbindungen, in denen sämtliche Basen, Säuren, Metalle und Metalloide vorausgesetzt werden.	

	Seite		Seite
A. In Wasser lösliche und in Wasser unlösliche, aber in Salzsäure oder Salpetersäure lösliche Körper.		II. Bei Anwesenheit organischer Säuren §. 126.	209
Auffindung der Basen §. 114.	178	B. In Wasser und in Salzsäure unlösliche oder schwerlösliche Körper.	—
I. Man hat eine rein wässrige Lösung.	—	Ausmittlung der Basen und Säuren §. 127.	—
Auffindung des Silbers und Quecksilberoxyduls.	179	Besonderes Verfahren zur Zerlegung in Wasser unlöslicher Cyauverbindungen §. 128.	216
II. Man hat eine salzs. Lösung.	181	Allgemeine Regeln zur Auffindung unorganischer Körper, wenn zugleich organische die Reactionen verdeckende oder hindernde Substanzen zugegen sind §. 129.	217
III. Man hat eine salpetersaure Lösung.	—	IV. Bestätigende Versuche §. 130.	218
Auffindung des Silbers.	—		
Fällung mit Schwefelwasserstoff §. 115.	—	Zweiter Abschnitt.	
Behandlung der gefällten Schwefelmetalle mit Schwefelammonium.	183	Erklärung des praktischen Verfahrens, Zusätze und Bemerkungen zu demselben.	219
Auffindung der Oxyde der sechsten Gruppe: Arsen, Zinn, Antimon, Gold, Platin §. 116.	184	I. Bemerkungen zur einleitenden Prüfung, zu §. 105.	—
Behandlung der in Schwefelammonium unlöslichen Schwefelmetalle mit Salpetersäure.	188	II. Bemerkungen zur Auflösung der Körper, zu §. 106.	220
Auffindung der Oxyde der fünften Gruppe: Blei, Wismuth, Kupfer, Cadmium, Quecksilberoxyd §. 117.	—	III. Bemerkungen zur eigentlichen Untersuchung zu §. 107 — 129.	222
Fällung mit Schwefelammonium.	190	A. Allgemeine Uebersicht und Erklärung des analytischen Ganges	—
Auffindung der Oxyde der dritten und vierten Gruppe etc.: Thonerde, Chromoxyd, Eisen, Mangan, Zink, Kobalt, Nickel, phosphorsaure und oxalsaure alkalische Erden §. 118.	—	a. Auffindung der Basen	—
Fällung mit kohlensaurem Ammoniak.	196	b. Auffindung der Säuren	226
Auffindung der Oxyde der zweiten Gruppe: Baryt, Strontian, Kalk §. 119.	—	B. Besondere Bemerkungen und Zusätze zum Gang der Analyse	230
Magnesia §. 120.	198	Zu §. 114.	—
Auffindung der Oxyde der ersten Gruppe.	—	Zu §. 115.	231
Kali, Natron §. 121.	—	Zu §. 116.	233
Ammoniak §. 122.	200	Zu §. 117.	235
Auffindung der Säuren.	—	Zu §. 118.	236
A. 1. In Wasser lösliche Körper.		Zu §. 127.	238
I. Bei Abwesenheit organischer Säuren §. 123.	—	Zu §. 128.	239
II. Bei Anwesenheit organischer Säuren §. 124.	203	Anhang zur zweiten Abtheilung.	
A. 2. In Wasser unlösliche, in Salzsäure oder in Salpetersäure lösliche Körper.		I. Allgemeines Schema, nach dem man die Substanzen, welche zur Erlernung der qualitativen Analyse untersucht werden sollen, zweckmäfsig auf einander folgen lässt.	242
I. Bei Abwesenheit organischer Säuren §. 125.	207	II. Zusammenstellung der häufiger vorkommenden Verbindungen der berücksichtigten Körper mit Angabe ihrer Löslichkeit in Wasser und Säuren.	145

Erste Abtheilung.

Propädeutik

der

qualitativen chemischen Analyse.

Erste Abtheilung.

Propädeutik

der

qualitativen chemischen Analyse

A. Vorlesung über die allgemeine Chemie	1
B. Vorlesung über die organische Chemie	15
C. Vorlesung über die anorganische Chemie	35
D. Vorlesung über die physikalische Chemie	55
E. Vorlesung über die analytische Chemie	75
F. Vorlesung über die mikroskopische Chemie	95
G. Vorlesung über die chemische Technologie	115
H. Vorlesung über die chemische Industrie	135
I. Vorlesung über die chemische Medizin	155
J. Vorlesung über die chemische Pharmazie	175
K. Vorlesung über die chemische Zoologie	195
L. Vorlesung über die chemische Botanik	215
M. Vorlesung über die chemische Geologie	235
N. Vorlesung über die chemische Mineralogie	255
O. Vorlesung über die chemische Meteorologie	275
P. Vorlesung über die chemische Kosmologie	295
Q. Vorlesung über die chemische Astronomie	315
R. Vorlesung über die chemische Ethnologie	335
S. Vorlesung über die chemische Anthropologie	355
T. Vorlesung über die chemische Linguistik	375
U. Vorlesung über die chemische Philosophie	395
V. Vorlesung über die chemische Poesie	415
W. Vorlesung über die chemische Religion	435
X. Vorlesung über die chemische Politik	455
Y. Vorlesung über die chemische Jurisprudenz	475
Z. Vorlesung über die chemische Historie	495

Ueber

Begriff, Aufgabe, Zweck, Nutzen und Gegenstand

der

qualitativen chemischen Analyse

und

über die Bedingungen,

worauf ein erfolgreiches Studium derselben beruht.

Die Chemie ist, wie bekannt, die Wissenschaft, welche uns die Stoffe, aus denen unsere Erde besteht, ihre Zusammensetzung und Zersetzung, überhaupt ihr Verhalten zu einander kennen lehrt. Eine besondere Abtheilung derselben wird mit dem Namen analytische Chemie bezeichnet, insofern sie einen bestimmten Zweck, nämlich die Zerlegung (die Analyse) zusammengesetzter Körper und die Ausmittlung ihrer Bestandtheile verfolgt. Wird bei dieser Ausmittlung der Bestandtheile nur auf die Art derselben Rücksicht genommen, so ist die Analyse eine qualitative, soll aber die Menge jedes einzelnen Stoffes erforscht werden, so ist sie eine quantitative. Die erstgenannte hat daher zur Aufgabe, die Bestandtheile einer unbekannten Substanz in schon bekannten Formen darzustellen, so dass diese neuen Formen sichere Schlüsse auf die Anwesenheit der einzelnen Stoffe gestatten. Der Werth ihrer Methode hängt von zwei Umständen ab, sie muss nämlich erstens unfehlbar und zweitens möglichst schnell zum Ziele führen. — Die Aufgabe der quantitativen Analyse hingegen ist, die durch die qualitative Untersuchung bekannt gewordenen Stoffe in Formen darzustellen, welche eine möglichst scharfe Gewichtsbestimmung zulassen.

Die Wege, auf welchen diese verschiedenen Zwecke erreicht werden, weichen wie natürlich sehr von einander ab. Es muss daher das Studium der qualitativen und quantitativen Analyse getrennt und der Natur der Sache nach mit der Erlernung der ersteren der Anfang gemacht werden.

Nachdem so der Begriff und die Aufgabe der qualitativen Analyse im Allgemeinen festgestellt ist, müssen zuerst die Vorkenntnisse, welche zur Beschäftigung damit berechtigen, der Rang, welchen sie überhaupt im Gebiete der Chemie einnimmt, die Gegenstände, auf die sie sich erstreckt, und ihr Nutzen erwogen, sodann aber die Hauptpunkte, auf welche ihr Studium sich stützt, die Hauptabtheilungen, in welche es zerfällt, in Betrachtung gezogen werden.

Eine Beschäftigung mit qualitativen Untersuchungen setzt vor Allem eine Bekanntschaft mit den chemischen Elementen und ihren wichtigsten Verbindungen, wie auch mit den Grundsätzen der Chemie voraus, und erfordert Uebung in der Erklärung chemischer Processe. Sie verlangt ferner strenge Ordnung, größte Reinlichkeit und ein gewisses Geschick beim Arbeiten. Kommt hierzu noch die Gewöhnung, in allen Fällen, in welchen der Erfahrung widersprechende Erscheinungen eintreten, den Fehler stets zuerst an sich, oder vielmehr an dem Mangel einer zum Eintreten der Erscheinung nothwendigen Bedingung zu suchen, wie diese Gewöhnung ja aus dem festen Vertrauen auf die Unveränderlichkeit der Naturgesetze hervorgehen muss, so ist Alles gegeben, das Studium der analytischen Chemie zu einem erfolgreichen zu machen.

Obgleich sich nun die chemische Analyse auf die allgemeine Chemie stützt und ohne Kenntnisse in derselben nicht ausgeübt werden kann, so muss sie andererseits auch als ein Hauptpfeiler betrachtet werden, auf dem das ganze Wissenschaftsgebäude ruht, denn sie ist für alle Theile der Chemie, der theoretischen sowohl, als der angewandten fast von gleicher Wichtigkeit und der Nutzen, den dieselbe dem Arzte, dem Pharmaceuten, dem Mineralogen, dem rationellen Landwirth, dem Techniker und Andern gewährt, bedarf keiner Auseinandersetzung.

Es wäre dies gewiss Ursache genug, die Sache mit möglichster Gründlichkeit, mit ernstem Eifer zu betreiben, brächte die Beschäftigung damit auch eben keine Annehmlichkeit mit sich, wie sie dies doch Jedem, der sich ihr mit Lust und Liebe hingiebt, unzweifelhaft thun muss. Denn der menschliche Geist hat ein Streben nach Wahrheit; er gefällt sich im Lösen von Räthseln, und wo böten sich ihm mehr, bald leichter, bald schwerer zu lösende, als eben hier. Wie aber ein Räthsel, eine Aufgabe, deren Lösung wir nach längerem Sinnen nicht finden können, den Geist unlustig macht und entmuthigt, so ist dies auch bei jeder chemi-

schen Untersuchung der Fall, wenn man dabei seinen Zweck nicht erreicht hat, wenn die Resultate nicht den Stempel der Wahrheit, der unumstößlichen Gewissheit tragen. Es muss daher ein Halbwissen, wie überall, so ganz besonders hier für schlimmer als ein Nichtwissen erachtet und vor oberflächlicher Beschäftigung mit der chemischen Analyse ganz vorzüglich gewarnt werden. —

Eine qualitative Untersuchung kann man in zweifacher Absicht anstellen, entweder nämlich zum Beweis, dass irgend ein bestimmter Körper in einer Substanz vorhanden oder nicht vorhanden sey, z. B. Blei im Wein; oder zweitens zur Nachweisung aller Bestandtheile einer chemischen Verbindung oder eines Gemenges. — Gegenstand einer chemischen Analyse aber kann wie natürlich jeder Körper seyn.

Wir ziehen jedoch in dem vorliegenden Werkchen, wie schon in der Vorrede bemerkt worden, nur diejenigen Elemente und Verbindungen in den Kreis unserer Betrachtung, welche in der Pharmacie, den Künsten und Gewerben Anwendung finden, und verstehen darunter folgende:

I. Basen.

Kali, Natron, Ammoniak, Baryt, Strontian, Kalk, Magnesia, Thonerde, Chromoxyd, Zinkoxyd, Manganoxydul, Kobaltoxydul, Nickeloxyd, Eisenoxydul, Eisenoxyd, Cadmiumoxyd, Bleioxyd, Wismuthoxyd, Kupferoxyd, Silberoxyd, Quecksilberoxydul, Quecksilberoxyd, Platinoxyd, Goldoxyd, Zinnoxydul, Zinnoxyd, Antimonoxyd.

II. Säuren.

Schwefelsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure, arsenige Säure, Arseniksäure, Borsäure, Kohlensäure, Chromsäure, Chlorsäure, Kieselsäure, Oxalsäure, Weinsteinssäure, Traubensäure, Citronensäure, Aepfelsäure, Benzoësäure, Bernsteinsäure, Essigsäure, Ameisensäure.

III. Salzbildner und nicht metallische Körper: Chlor, Jod, Brom, Cyan, Fluor, Schwefel, Kohlenstoff.

Das Studium der qualitativen Analyse beruht nun hauptsächlich auf vier Punkten, nämlich erstens auf der Bekanntschaft mit den Operationen, zweitens auf dem Kennen der Reagentien und ihrer Anwendung, drittens auf der Kenntniss des Verhaltens der Körper zu den Reagentien, und viertens auf

dem Verstehen des bei jeder Untersuchung einzuschlagenden systematischen Ganges.

Da sich hieraus ergibt, dass die chemische Analyse nicht nur ein Wissen, sondern auch ein Können erfordert, so liegt der Schluss nahe, dass eine bloß geistige Beschäftigung damit eben so wenig, als ein rein empirisches Betreiben derselben zum Ziele führen kann und dass dahin nur die vereinten Wege der Theorie und der Praxis gelangen lassen.

Erster Abschnitt.

Die Operationen.

§. 1.

Die Verrichtungen, wodurch man chemische Processe herbeiführt und die dadurch gewonnenen Edukte oder Produkte isolirt, werden mit dem Namen „chemische Operationen“ bezeichnet. Diese Verrichtungen sind in der synthetischen, wie in der analytischen Chemie die nämlichen, sie erleiden nur, in Folge des abweichenden Zwecks und der geringen Quantitäten, mit denen man bei Analysen zu thun hat, gewisse Modificationen.

Die hauptsächlichsten bei qualitativen Untersuchungen in Anwendung kommenden Operationen sind folgende:

§. 2.

1. Die Auflösung.

Nimmt man das Wort Auflösung in seiner allgemeinsten Bedeutung, so versteht man darunter die Vereinigung irgend eines Körpers mit einer Flüssigkeit zu einem homogenen Liquidum. Ist dieser Körper gasförmig, so wird die Auflösung Absorption, ist er flüssig, öfters Mischung genannt, ist er aber fest, so hat man eine Auflösung im engern oder im gewöhnlichen Sinn.

Eine Auflösung wird um so mehr erleichtert, je feiner zertheilt der aufzulösende Körper ist. Die Flüssigkeit, wodurch die Lösung bewirkt wird, heißt das Auflösungsmittel. Geht dieses mit dem gelösten Körper eine chemische Verbindung ein, so ist die Auflösung eine chemische, geht es hingegen keine be-

stimmte Verbindung mit demselben ein, so hat man eine einfache Lösung. In einer solchen ist der gelöste Körper unverbunden, mit allen seinen ursprünglichen Eigenschaften, insofern dieselben nicht von seiner Form abhängig sind, enthalten; er scheidet sich unverändert ab, wenn das Lösungsmittel entfernt wird. Lässt man z. B. Kochsalz in Wasser zergehen, so hat man eine einfache Lösung. Der Geschmack derselben ist wie der des Salzes. Man erhält dieses in ursprünglicher Gestalt wieder, wenn man das Wasser verdunsten lässt. — Eine einfache Lösung heißt gesättigt, wenn das Lösungsmittel so viel von dem aufzulösenden Körper aufgenommen hat, als es vermag. Flüssigkeiten lösen aber im Durchschnitt um so größere Mengen eines Körpers auf, je höher ihre Temperatur ist. Es kann sich also der Ausdruck — gesättigt — immer nur auf eine bestimmte Temperatur beziehen und es muss als Regel betrachtet werden, dass Erwärmung einfache Lösungen erleichtert und beschleunigt.

Eine chemische Lösung enthält den aufgelösten Körper nicht in dem Zustande und mit den Eigenschaften, die er zuvor besaß; er ist nicht frei darin enthalten, sondern mit dem Lösungsmittel, welches seine Eigenschaften ebenfalls eingebüßt hat, zu einem neuen Körper innig verbunden, daher die Lösung jetzt die Eigenschaften dieses neu entstandenen Körpers zeigt. Eine chemische Lösung kann zwar durch Temperaturerhöhung ebenfalls beschleunigt werden und sie wird es auch in der Regel, indem ja Erwärmung die Einwirkung der Körper auf einander überhaupt begünstigt. Die Quantität des gelösten Körpers aber bleibt bei einer gegebenen Menge des Lösungsmittels auch bei verschiedenen Wärmegraden immer dieselbe, sie ist eine unabänderliche, von der Temperatur unabhängige.

Bei der chemischen Lösung nämlich haben das Lösungsmittel und der Körper, auf welchen es einwirkt, stets entgegengesetzte Eigenschaften; ihr Bestreben ist Ausgleichung dieses Gegensatzes. Ist dieses Bestreben befriedigt, so fehlt der Grund zur weitem Auflösung; es bleiben also weitere Quantitäten des festen Körpers unverändert. Die Lösung heißt alsdann ebenfalls gesättigt oder besser neutralisirt, der Punkt aber, welcher die beendigte Ausgleichung bezeichnet, heißt der Sättigungs- oder Neutralitätspunkt.

Die Stoffe, welche chemische Lösungen hervorbringen, sind in den meisten Fällen entweder Säuren oder Alkalien. Sie bedürfen sämtlich zuvor eines einfachen Lösungsmittels, um als Flüs-

sigkeiten zu erscheinen. Hat sich der Gegensatz zwischen Säure und Base ausgeglichen und ist die neue Verbindung entstanden, so erfolgt der wirkliche Uebergang in flüssige Form nur dann, wenn der neue Körper die Eigenschaft hat von der vorhandenen Flüssigkeit zu einer einfachen Lösung aufgenommen zu werden. Bringt man z. B. eine Auflösung von Essigsäure in Wasser mit Bleioxyd zusammen, so erfolgt zuerst eine chemische Verbindung der Säure mit dem Oxyd, sodann eine einfache Lösung des entstandenen essigsauren Bleioxyds in dem vorhandenen Wasser. —

Den Gegensatz zur Auflösung machen die zwei folgenden Operationen, die Krystallisation und die Präcipitation, indem sie das Ueberführen eines flüssigen oder gelösten Körpers in feste Form zum Zwecke haben. Da beide im Durchschnitt auf derselben Ursache, nämlich auf dem Mangel an Lösungsmittel beruhen, so ist ihre scharfe Begrenzung unmöglich, sie gehen in vielen Fällen in einander über. Wir betrachten jedoch beide gesondert, da sie sich in ihren extremen Formen wesentlich unterscheiden und da die speciellen Zwecke, welche wir durch dieselben zu erreichen suchen, meist sehr verschieden sind.

§. 3.

2. Die Krystallisation.

Man versteht darunter im weitern Sinne jede Operation, jeden Vorgang, wodurch ein Körper in eine feste, mathematisch bestimmbare, regelmässige Form übergeführt wird. Da jedoch solche Formen, welche wir Krystalle nennen, um so regelmässiger, also vollkommener werden, je langsamer die Operation eingeleitet wird, so verbindet man mit Krystallisation stets den Nebebegriff der langsamen Ausscheidung, des allmäligen Ueberganges in feste Form. Die Bildung der Krystalle hängt von der gesetzmässigen Anordnung der kleinsten Körpertheilchen (der Atome) ab; sie kann blofs Statt finden, wenn diesen freie Bewegung gestattet ist, also in der Regel nur, wenn ein Körper aus flüssigem oder gasförmigem Zustand in den festen übergeht. Die Fälle, in denen ein blofses Glühen oder Erweichen eines starren Körpers schon hinreicht, dem Streben der Atome nach gesetzmässiger Anordnung (nach Krystallbildung) den Sieg über die verminderte Cohäsionskraft zu verleihen, sind als Ausnahmen zu betrachten, z. B. das Trübwerden (die Krystallisation) des Gerstenzuckers, wenn er feucht wird.

Um eine Krystallisation einzuleiten, müssen die Ursachen der flüssigen oder Gas-Form eines Körpers aufgehoben werden. Diese Ursachen sind entweder nur Wärme, z. B. bei geschmolzenen Metallen, oder nur Lösungsmittel, wie bei einer wässrigen Kochsalzsolution, oder beide vereinigt, wie bei einer heiss gesättigten Lösung des Salpeters in Wasser. Im ersten Falle erhält man also Krystalle durch bloße Abkühlung, im zweiten durch bloße Verdunstung und im dritten durch jedes der beiden Mittel. Der am häufigsten vorkommende Fall ist die Krystallisation durch Abkühlung heiss gesättigter Lösungen. — Flüssigkeiten, welche nach der Ausscheidung der Krystalle zurückbleiben, nennt man Mutterlaugen. — Starre Körper, welche keine Krystallform haben, heissen amorphe Körper. —

Die Absicht bei der Krystallisation ist meistens entweder die Gewinnung des krystallisirten Körpers in fester Form, oder die Trennung desselben von anderen neben ihm in derselben Flüssigkeit aufgelösten Substanzen.

§. 4.

3. Die Fällung oder Präcipitation.

Sie unterscheidet sich von der Krystallisation dadurch, dass bei einer Fällung der Uebergang des gelösten Körpers in feste Form nicht wie bei jener allmähig, sondern plötzlich erfolgt; gleichgültig, ob der sich abscheidende Körper krystallinisch oder amorph ist, ob er in der Flüssigkeit untersinkt, schwebt oder aufsteigt. Eine Fällung wird entweder veranlasst durch die Veränderung des Lösungsmittels, so scheidet sich Gyps aus seiner Auflösung in Wasser augenblicklich ab, wenn man dieses durch Zusatz von Alkohol in verdünnten Weingeist verwandelt. Oder sie ist Folge der Ausscheidung eines in der vorhandenen Flüssigkeit unlöslichen Eduktes, so wird die Thonerde gefällt, wenn man zu einer Lösung von schwefelsaurer Thonerde Ammoniak setzt, denn sie wird ja dadurch abgeschieden und ist in dem vorhandenen Wasser nicht auflöslich. Oder die Ursache einer Fällung ist endlich das Entstehen neuer in der vorhandenen Flüssigkeit unlöslicher Verbindungen durch einfache oder doppelte Wahlverwandtschaft, so entsteht eine Fällung von oxalsaurem Kalk, wenn man essigsaurer Kalklösung Oxalsäure zusetzt, — von chromsaurem Bleioxyd, wenn chromsaures Kali mit salpetersaurem Bleioxyd vermischt wird. Bei solchen Zersetzungen durch einfache oder doppelte Wahlver-

wandtschaft bleibt meistens eine der entstehenden Verbindungen, oder auch der educirte Körper aufgelöst, wie in den angeführten Beispielen das schwefelsaure Ammoniak, die Essigsäure und das salpetersaure Kali. Es können jedoch auch Fälle eintreten, in welchen sich Edukt und Produkt oder zwei Produkte niederschlagen und in der Flüssigkeit Nichts gelöst bleibt, z. B. beim Vermischen von schwefelsaurer Magnesialösung mit Barytwasser, oder beim Fällen einer Auflösung von schwefelsaurem Silberoxyd mit Chlorbaryum.

Der Zweck einer Fällung ist entweder wie bei der Krystallisation Gewinnung einer Substanz in fester Form, oder Trennung eines Körpers von anderen zugleich gelösten Stoffen. In der qualitativen Analyse aber dient diese Operation besonders häufig zur Erkennung von Körpern an der Farbe, überhaupt den Eigenschaften und dem Verhalten derselben, wenn sie isolirt oder in einer Verbindung niedergeschlagen werden. — Der feste Körper, welcher sich bei einer Fällung abscheidet, heißt **Präcipitat** oder **Niederschlag**, die Substanz, welche die Abscheidung unmittelbar veranlasst, das **Fällungsmittel**. Die Niederschläge werden je nach ihrer Beschaffenheit zu näherer Bezeichnung verschieden benannt, so unterscheidet man krystallinische, pulverige, flockige, käsige, gelatinöse Niederschläge u. s. w. Sind Niederschläge so fein zertheilt und so gering, dass ihre Theilchen nicht deutlich unterschieden werden können und die Flüssigkeiten, in welchen sie suspendirt sind, nur unklar erscheinen, so bedient man sich der Ausdrücke **Trübung**, **getrübt**. — Die Abscheidung eines Niederschlags wird in der Regel durch starkes Schütteln, wie auch durch Erwärmen der Flüssigkeit begünstigt. Die Gefäße, in welchen man Fällungen vornimmt, müssen daher wo möglich Beides gestatten. Unten zugeschmolzene Röhren von dünnem Glase, sogenannte **Proberöhrchen** oder **Probecylinder** (§. 13. 7.) sind es daher, deren man sich bei der qualitativen Analyse vorzugsweise bedient. Sie gewähren außer den genannten Vortheilen das Angenehme, alle Vorgänge, sowie die Farbe der Flüssigkeiten und Niederschläge aufs beste sehen und mit sehr kleinen Mengen experimentiren zu können.

Zur mechanischen Trennung einer Flüssigkeit von einem darin suspendirten Körper wendet man bei der Analyse je nach

den Umständen zwei verschiedene Operationen an, die Filtration und die Decantation.

§. 5.

4. Die Filtration.

Man erreicht durch diese Operation den eben angeführten Zweck, indem man die Flüssigkeit, welche von den darin schwimmenden festen Körpertheilchen getrennt werden soll, sammt diesen auf einen Seiheapparat gießt, und zwar in der Regel auf ein in einen Trichter zweckmäfsig gelegtes ungeleimtes Papier (Filtrum), da ein solches die Flüssigkeit leicht durchsickern lässt, die festen Theilchen aber vollständig zurückhält. Man wendet glatte und faltige Filtra an, erstere, wenn der abfiltrirte feste Körper benutzt werden soll, letztere, wenn es nur darauf ankommt, die durchlaufende Flüssigkeit (das Filtrat) klar zu erhalten. Die glatten Filtra erhält man durch doppeltes Zusammenfalten eines kreisrunden Papiers, so dass die Falten rechte Winkel bilden. Die Anfertigung der faltigen lässt sich besser zeigen als beschreiben. Bei genauen Arbeiten dürfen die Filtra nicht über den Rand des Trichters hervorragen. — In den meisten Fällen ist es vortheilhaft, das Filtrum vor dem Aufgießen anzufeuchten, weil das Filtriren alsdann nicht nur schneller von Statten geht, sondern auch von dem abzufiltrirenden Körper weniger leicht etwas durch die Poren gerissen wird. Das Papier, welches man zum Filtriren wählt, muss möglichst frei von unorganischen Substanzen, besonders von Eisen und Kalk sein. Es ist zweckmäfsig, zwei Sorten vorrätbig zu haben, ein dichteres zum Abscheiden sehr feiner Niederschläge und ein poröseres zum schnellen Abfiltriren gröberer Theilchen. Die Trichter müssen von Glas oder Porzellan sein. (§. 13. 10.)

§. 6.

5. Die Decantation oder das Abgießen.

Man bedient sich dieser Operation häufig statt des Filtrirens, wenn die abzuscheidenden festen Theilchen ein bedeutend größeres specifisches Gewicht als die Flüssigkeit, von der sie zu trennen sind, haben. Sie sinken alsdann schnell unter und setzen sich auf dem Boden ab, so dass man die überstehende Flüssigkeit entweder durch Neigen des Gefäßes abgießen oder mittelst eines Hebers oder einer Pipette abnehmen kann.

Ist bei dem Filtriren oder Decantiren das Gewinnen des festen Körpers Zweck, so muss derselbe durch wiederholtes Waschen von der ihm noch anhängenden Flüssigkeit befreit werden. Diese Operation heisst Aussüßsen oder Auswaschen. Zum Aussüßsen eines auf einem Filtrum gesammelten Niederschlages bedient man sich meistens der Spritzflasche, eines Glasgefäßes, welches mit einem Kork, in den eine kleine, nach außen in eine feine Spitze ausgezogene Glasröhre gepasst ist, verstopft wird. Bläst man durch die Röhre Luft in die Flasche und dreht sie, wenn die Luft hinlänglich comprimirt ist, um, so dass die innere Oeffnung der Glasröhre unter Wasser kommt, so wird ein feiner Wasserstrahl mit einer gewissen Heftigkeit herausgetrieben. Ein solcher Strahl ist alsdann zum Abspülen eines Niederschlages besonders geeignet.

Der Operationen, durch welche man flüchtige Substanzen von minder oder nicht flüchtigen trennt, hat man vier, das Abdampfen, die Destillation, das Glühen und die Sublimation. Von diesen beziehen sich die ersten beiden stets auf Flüssigkeiten, die zwei anderen nur auf feste Körper.

§. 7.

6. Das Abdampfen.

Es ist eine der am häufigsten in Anwendung kommenden Operationen. Man stellt sie immer an, wenn man eine flüchtige Flüssigkeit von einem andern minder oder nicht flüchtigen Körper, gleichgültig, ob dieser flüssig oder fest ist, trennen will, im Fall bei dieser Trennung nur dieser zurückbleibende Körper gewonnen werden, der sich verflüchtigende aber unberücksichtigt bleiben soll. Also zum Beispiel, um der Lösung eines Salzes einen Theil des Wassers zu entziehen, damit das Salz krystallisire, oder wenn man aus der Lösung eines nicht krystallisirbaren Körpers alles Wasser entfernen will, um denselben in trockner Form zu haben u. s. w. In beiden Fällen giebt man das sich verflüchtigende Wasser verloren und will nur im ersten Falle eine concentrirtere Flüssigkeit, im letzteren einen trocknen Körper gewinnen. Man erreicht diese Zwecke stets dadurch, dass man die zu entfernende Flüssigkeit in Gasform bringt, also in den gewöhnlichen Fällen durch Erhitzen derselben; zuweilen auch, indem man die Flüssigkeit längere Zeit

mit der Atmosphäre, oder mit einer durch hygroskopische Substanzen stets trocken erhaltenen, abgeschlossenen Luft in Berührung lässt; oder endlich in manchen Fällen, indem man die Flüssigkeit bei gleichzeitiger Anwendung hygroskopischer Substanzen in einen luftverdünnten Raum bringt. Das Erhitzen geschieht entweder über freiem Feuer (Kohlenfeuer oder Weingeistflamme), in erhitztem Sand (im Sandbad), mittelst Wasserdämpfen (im Wasserbad) u. s. w. — Als die zweckmässigsten und billigsten hygroskopischen Substanzen sind concentrirte Schwefelsäure und gebrannter Kalk, wohl auch Chlorcalcium im Gebrauch. Die Gefäße zum Abdampfen sind von Porcellan, Glas, Platin oder Silber und haben in der Regel Schalenform.

§. 8.

7. Die Destillation.

Sie hat die Trennung einer flüchtigen Flüssigkeit von einem weniger oder nicht flüchtigen festen oder flüssigen Körper zum Zweck, wenn dabei die sich verflüchtigende Flüssigkeit wieder gewonnen werden soll. Um diesen Zweck zu erreichen, muss man Sorge tragen, dass die Flüssigkeit aus der Dampfform, in welcher sie entfernt wurde, wieder in die tropfbar flüssige Form zurückgeführt werde. Bei einem Destillationsapparate sind also jederzeit drei Theile zu unterscheiden, gleichgültig ob dieselben getrennt werden können oder nicht. Nämlich erstens ein Gefäß, in welchem die zu destillirende Flüssigkeit erhitzt, also in Dampfform übergeführt wird, zweitens eine Vorrichtung, in der die Dämpfe abgekühlt, also wieder in die tropfbar flüssige Form zurückgeführt werden und drittens eines, in welchem die durch Abkühlung der Dämpfe erhaltene Flüssigkeit (das Destillat) sich ansammelt. Im Kleinen bedient man sich zur Destillation meist gläserner Retörtchen und Vorlagen, im Großen aber entweder metallener Apparate (kupferner Destillirblasen mit Helm und Kühlröhre von Zinn) oder auch großer Glasretorten.

§. 9.

8. Das Glühen.

Was das Abdampfen für Flüssigkeiten ist, ist das Glühen gewissermaßen für feste Körper. Es hat nämlich ebenfalls, wenigstens im Durchschnitt die Trennung eines flüchtigen Körpers von einem weniger flüchtigen oder feuerbeständigen zum Zweck, wenn da-

bei nur der zurückbleibende beachtet wird. Das Glühen setzt immer die Anwendung einer hohen Temperatur voraus, wodurch es sich vom Trocknen unterscheidet. Der Zustand, welchen der verflüchtigte Körper beim Erkalten annimmt, ob er also gasförmig bleibt, wie wenn man kohlessauren Kalk glüht, ob er flüssig wird, wie wenn man Kalkhydrat erhitzt, oder fest, wie beim Glühen einer Salmiak enthaltenden Mischung, ist für die Benennung der Operation gleichgültig.

Der bereits genannte Zweck des Glühens ist der gewöhnliche. Zuweilen glüht man jedoch auch Substanzen, nur um ihren Zustand zu verändern, ohne dass sich dabei etwas verflüchtigt, z. B. bei der Ueberführung des Chromoxyds in die sogenannte unlösliche Modification u. s. w. — Die Gefäße, deren man sich zum Glühen bedient, sind die Tiegel. Zu analytischen Versuchen wählt man je nach den Substanzen Porcellan-, Platin- oder Silbertiegel. Im Großen wendet man hessische oder auch Graphyt-Tiegel an. Zum Erhitzen bedient man sich entweder des Kohlenfeuers oder im Kleinen am häufigsten der Berzelius'schen Spirituslampe.

§. 10.

9. Die Sublimation.

Verwandelt man feste Körper durch Erhitzen in Dämpfe und verdichtet diese wieder durch Abkühlung, so heißt diese Operation Sublimation; der verflüchtigte, wieder verdichtete Körper aber ein Sublimat. Die Sublimation ist daher eine Destillation fester Körper. Man wendet dieselbe meist zur Trennung verschiedenen flüchtiger Substanzen an. In der Analyse ist sie zur Erkennung mehrerer Körper z. B. des Arsens von größter Wichtigkeit. Die Sublimirgefäße sind, je nach der Flüchtigkeit der Substanz von sehr mannigfacher Gestalt. Sublimationen behufs der Analyse nimmt man in der Regel nur in zugeschmolzenen Glasröhren vor.

§. 11.

10. Das Schmelzen und Aufschließen.

Man bezeichnet mit Schmelzen das Ueberführen eines festen Körpers in flüssige Form durch Hitze, und bezweckt mit dieser Operation im Durchschnitt die Vereinigung oder Zersetzung von Körpern. Verändert oder zersetzt man in Wasser und Säuren unlösliche oder schwerlösliche Körper durch Zusammenschmelzen mit anderen in der Art, dass dieselben, oder die neu entstandenen

Verbindungen nachher durch Wasser oder Säuren in Auflösung gebracht werden können, so heisst die Operation Aufschliessen. Das Schmelzen und Aufschliessen geschieht bei Analysen, je nach Umständen, in Porcellan-, Silber- oder Platin-Tiegeln. Vermag man mit der Berzelius'schen Weingeistlampe nicht den gehörigen Hitzgrad hervorzubringen, so bringt man den die Mischung enthaltenden Tiegel in einen grösseren hessischen und setzt diesen dem Kohlenfeuer aus.

Die Körper, zu deren Analyse man das Aufschliessen vorzugsweise nöthig hat, sind die schwefelsauren alkalischen Erden und viele kieselsauren Verbindungen. Das gewöhnlichste Aufschliessungsmittel ist kohlsaures Natron oder kohlsaures Kali, besser ein Gemenge beider zu gleichen Atomgewichten, siehe §. 75. In gewissen Fällen wird statt der kohlsauren Alkalien kohlsaurer Baryt angewendet, siehe §. 76.

Das Aufschliessen mit kohlsauren Alkalien, wie auch mit kohlsaurem Baryt geschieht im Platintiegel.

Um Schaden vorzubeugen soll hier kurz an die beim Gebrauche von Platingefässen nöthigen Vorsichtsmaassregeln erinnert werden. Es dürfen nämlich in Platingefässen keine Substanzen behandelt werden, welche Chlor entwickeln, salpetersaures Kali, Aetzkali, Metalle, Schwefel und Schwefelmetalle, dürfen nicht darin geschmolzen, leicht desoxydirbare Metalloxyde, organische Metallsalze und phosphorsaure Salze bei Gegenwart organischer Verbindungen nicht darin geglüht werden. Endlich leidet die Platintiegel, besonders in Bezug auf ihre Deckel, Noth, wenn man sie direkt in starkes Kohlenfeuer setzt, weil sich alsdann durch Einwirkung der Asche leicht Kieselplatin bildet, wodurch sie spröde und zerbrechlich werden.

§. 12.

11. Die Anwendung des Löthrohrs.

Diese Operation gehört nur der analytischen Chemie an und ist für dieselbe von äusserster Wichtigkeit. Wir haben zuerst die dazu nöthigen Apparate, sodann die Art ihrer Anwendung und endlich den Erfolg des Löthrohrblasens ins Auge zu fassen.

Das Löthrohr ist ein kleines, gewöhnlich aus Messing gefertigtes Instrument. Es wurde zuerst von den Metallarbeitern zum Löthen gebraucht und hat daher seinen Namen. Man unterscheidet daran drei Theile. Erstens eine Röhre, durch welche man mit dem Munde Luft einbläst. Zweitens ein kleines Gefäss, in wel-

ches diese Röhre luftdicht eingerieben ist (es dient zum Ansammeln der mitgerissenen Feuchtigkeit), und drittens eine ebenfalls in dieses Gefäß eingepasste kleinere Röhre, welche mit der größern einen rechten Winkel bildet und am vordern Ende eine sehr feine Oeffnung hat (§. 13. 3.). Das Löthrohr dient dazu, einen fort-dauernden feinen Luftstrom in eine Kerzen- oder Lampenflamme zu führen. Brennt eine solche unter gewöhnlichen Umständen, so sehen wir daran drei Theile, nämlich erstens einen dunkeln Kern in der Mitte, zweitens einen ihn umgebenden leuchtenden Theil und drittens einen nur schwach leuchtenden die ganze Flamme umschließenden Mantel. Den dunklen Kern bilden die durch die Hitze aus dem Oel oder Fett entwickelten Gasarten, welche aus Mangel an Sauerstoff nicht verbrennen können. In der leuchtenden Sphäre kommen diese Gasarten mit einer zu ihrem vollständigen Verbrennen unzureichenden Menge Luft in Berührung. Es verbrennt daher hauptsächlich der Wasserstoff der Kohlenwasserstoffgase, während der Kohlenstoff im glühenden Zustande ausgeschieden wird und das Leuchten dieses Flammentheils bedingt. In dem äußern Mantel endlich ist der Zutritt der Luft nicht mehr beschränkt, alle noch unverbrannten Stoffe verbrennen daselbst. Dieser Theil der Flamme ist der heißeste. Bringt man daher oxydable Körper in denselben, so oxydiren sie sich möglichst schnell, denn die Bedingungen dazu, hohe Temperatur und unbeschränkter Sauerstoffzutritt sind gegeben. Es heißt daher dieser Theil der Flamme die *Oxydationsflamme*. Bringt man aber oxydirte Körper, welche Neigung haben, ihren Sauerstoff abzugeben, in den leuchtenden Theil der Flamme, so findet das Entgegengesetzte statt, das heißt, die Körper verlieren ihren Sauerstoff, er wird denselben von dem in dieser Sphäre befindlichen Kohlenstoff und dem noch unverbrannten Kohlenwasserstoff entzogen, sie werden reducirt. Der leuchtende Theil der Flamme heißt deshalb die *Reductionsflamme*.

Führt man nun in eine Flamme einen feinen Luftstrom, so hat man nicht nur außen um die Flamme, sondern auch innen in derselben Sauerstoff; es findet also hier und dort ein Verbrennen statt. Die eingeblasene Luft strömt aber mit einer gewissen Heftigkeit in die Flamme, sie reißt daher die entwickelten Gase mit sich fort, mengt sich innig mit denselben und bewirkt ihre Verbrennung erst in einer gewissen Entfernung von der Löthrohrspitze. Diese Stelle giebt sich durch ein bläuliches Licht zu er-

kennen. Sie ist die heißeste der ganzen Flamme, weil daselbst die Verbrennung in Folge der innigen Mischung der Luft mit den Gasen am vollständigsten geschieht. Indem so der leuchtende Theil der Flamme auf beiden Seiten von sehr heißen Flammen umgeben ist, wird auch seine Temperatur außerordentlich gesteigert und diese Steigerung ist der hauptsächlichste Zweck, der durch das Löthrohr erreicht werden soll; der heißeste Punkt ist alsdann wie natürlich etwas vor der Spitze des innern Kerns. In einer solchen Reductionsflamme schmelzen nun viele Körper mit Leichtigkeit, welche in einer gewöhnlichen Flamme unverändert bleiben. Auch die Temperatur der Oxydationsflamme wird durch das Löthrohr bedeutend erhöht, indem ihre Hitze sich mehr auf einen Punkt concentrirt.

Als Brennmaterial nimmt man entweder eine Oellampe, eine Wachskerze, oder eine Lampe, die mit einer Auflösung von Terpentinöl in Weingeist gespeist wird. Eine gewöhnliche Spiritusflamme giebt nicht in allen Fällen den erforderlichen Hitzgrad.

Das Blasen geschieht nur mit den Wangenmuskeln und nicht mit der Lunge. Man erlernt es leicht, wenn man sich eine Zeit lang übt, mit aufgeblasenen Backen ruhig zu athmen. Hat man es dahin gebracht, dass man auf diese Art ruhig fortathmen kann, auch wenn man das Löthrohr zwischen den Lippen hält, so bedarf es nur noch der Uebung, um eine ununterbrochene richtige und stete Flamme hervorzubringen.

Die Unterlagen, auf welchen man die zu untersuchenden Körper der Löthrohrflamme aussetzt, sind in der Regel entweder Holzkohle, Platindraht oder Platinblech. Bei Auswahl der Kohlen für Löthrohrversuche hat man darauf zu sehen, dass sie gut ausgebrannt sind, weil sie sonst spritzen und die Probe wegschleudern, siehe §. 78. Die zu prüfenden Substanzen bringt man in kleine konische Grübchen, welche man mit einem Messerchen oder mit einer kleinen Blechröhre in die Kohle gräbt. Im Durchschnitt bedient man sich der Kohle als Unterlage, wenn man ein Metalloxyd reduciren oder einen Körper auf seine Schmelzbarkeit prüfen will. Sind Metalle in der Hitze der Reductionsflamme flüchtig, so verdampfen sie während der Reduction ganz oder theilweise. Die Metaldämpfe aber verbrennen beim Durchgang durch die äußere Flamme wieder zu Oxyd und dieses legt sich als ein Anflug an die Kohle rings um die

Probe an. Solche Anflüge heißen Beschläge. Viele derselben haben eigenthümliche Farbe, so dass daran die Metalle erkannt werden können. — Den Platindraht, wie auch das Platinblech wählt man ziemlich dünn (siehe §. 13, 5 und 6). Man bedient sich des Platindrahts in der Regel, wenn man Körper mit Flussmitteln (siehe unten §. 81 u. 82) behandelt, um aus der Farbe, überhaupt den Eigenschaften der entstehenden Perlen auf die Natur der Substanzen zu schliessen.

Die Löthrohrflamme ist bei chemischen Untersuchungen besonders deswegen sehr geschätzt, weil ihre Wirkungen augenblicklich zu Resultaten führen. Diese Resultate sind zweierlei Art. Entweder nämlich lernen wir nur die allgemeinen Eigenschaften des Körpers kennen, wodurch uns also bloß ein Schluss auf die Classe, in die er zu rechnen, gestattet wird, das heißt, wir erfahren, ob er feuerbeständig, flüchtig, schmelzbar ist u. s. w., oder wir sehen an den eintretenden Erscheinungen sogleich, mit welchem speciellen Körper wir zu thun haben. Welcher Art diese Erscheinungen sind, werden wir zu beachten Gelegenheit haben, wenn wir an das Verhalten der einzelnen Körper zu Reagentien kommen.

Anhang zum ersten Abschnitt.

§. 13.

Apparate und Geräthschaften.

Da es Vielen, welche sich mit chemischen Analysen zu beschäftigen anfangen, schwer fallen dürfte, bei der Auswahl der dazu nöthigen Apparate und Geräthschaften sogleich die zweckmässigsten von den minder geeigneten, die nothwendigen von den entbehrlichen zu unterscheiden, so füge ich hier ein Verzeichniss bei, welches die zur Ausführung einfacherer Untersuchungen wirklich erforderlichen Apparate in kurzer Zusammenstellung enthält, wobei ich zugleich Gelegenheit nehme, auf Einiges aufmerksam zu machen, was beim Einkauf oder der Anfertigung derselben besonders ins Auge zu fassen ist.

1. Eine Berzelius'sche Weingeistlampe. Bei einer solchen ist wohl zu berücksichtigen, dass der Weingeistbehälter nur durch eine enge Röhre mit dem Behälter des Dochtes in Verbindung stehen, nicht aber geradezu in denselben

übergehen darf, weil sonst beim Anzünden sehr häufig äußerst unangenehme Explosionen eintreten. — Außerdem muss beachtet werden, dass der Schornstein nicht zu eng sei und der Stöpsel auf der Oeffnung, durch welche man den Weingeist eingießt, nicht luftdicht schliesse. — Man wähle eine Lampe, welche an einem Statif herauf und herab geschoben werden kann. An demselben Statif befinde sich außerdem ein beweglicher Ring zum Aufsetzen kleiner Schalen u. s. w. und eine bewegliche Klammer zum Festhalten der Kolbenhälse. Zum Aufsetzen der Tiegel bediene man sich stets kleiner Gestelle von mässig dicken Eisendrähten, deren drei so zusammengedreht werden, dass sie in der Mitte ein Dreieck bilden.

2. Eine gläserne Weingeistlampe mit übergreifendem, gut eingeriebenem Glasdeckel und messingener Dochthülse.

3. Ein Löthrohr. (vergl. §. 12.) Man wähle ein messingenes mit einer passenden Mundspitze von Horn oder Bein. Das große Rohr kann je nach der Sehweite eine Länge von etwa 7 Zoll haben, das kleine sei etwa 2 Zoll lang. Beide müssen luftdicht in den zum Absetzen der Feuchtigkeit bestimmten Behälter eingerieben sein. Es ist gut, wenn man zwei kleine Röhren hat, eine mit engerer, die andere mit etwas weiterer Oeffnung, welche man alsdann, je nach Bedarf, in den Behälter einschiebt. An diesen Röhrchen sind meistens vorn nur kleine durchbohrte Platinplättchen eingesetzt, zweckmäßiger und haltbarer sind die Spitzen, über welche kleine fein durchbohrte Platinhüllen gestülpt sind. Werden diese Hüllen mit der Zeit verstopft, so bedarf es meistens nur eines Ausglühens derselben vor dem Löthrohr um sie wieder zu öffnen.

4. Ein Platintiegel. Man wähle einen, der $1\frac{1}{2}$ bis 2 Drachmen Wasser fasst, dessen Deckel durch Uebergreifen schliesst und der im Verhältniss zur Breite nicht zu tief ist.

5. Platinblech. Man nimmt es nicht zu dünn, möglichst glatt und blank von etwa 2 Zoll Länge und 1 Zoll Breite.

6. Platindraht. Man wählt welchen von der Stärke dünner Klaviersaiten, schneidet ihn in 3 bis 4 Zoll lange Stückchen, deren jedes an beiden Enden zu einem kleinen Ohr umgebogen wird. Mit 3 oder 4 solcher Dräthchen hat man hinlänglich genug. Sie werden zweckmässig in einem Gläschen

mit Wasser aufbewahrt. Man hat sie alsdann immer rein, da die meisten Perlen bei längerer Berührung mit dem Wasser aufweichen und sich lösen.

7. Ein Gestell mit 12 bis 20 Probecylinder. Diese seien 6 bis 8 Zoll lang, theils weiter, theils enger. Alle müssen aus dünnem weißem Glase gefertigt und so gut abgekühlt sein, dass sie nicht springen, wenn siedendes Wasser hineingegossen wird. Sie müssen ferner einen etwas umgebogenen, ganz runden Rand und keine Schnauze haben, da solche Ausgüsse gar keinen Nutzen gewähren und ein festes Zstopfen, sowie gründliches Schütteln sehr erschweren. —

8. Einige Bechergläser und Kölbchen, möglichst dünn im Glas und gut abgekühlt.

9. Einige Porzellanschälchen und verschiedene kleine Porzellantiegel. Die aus der königlichen Porzellanfabrik in Berlin lassen, was geeignete Form und Dauerhaftigkeit anbetrifft, Nichts zu wünschen übrig.

10. Einige Glastrichter von verschiedener Gröfse. Sie müssen in einem Winkel von 60° geneigt sein und nicht allmählig in die Röhre verlaufen, sondern in einem bestimmten Winkel in dieselbe übergehen.

11. Eine Spritzflasche. Siehe oben §. 5. Sie halte etwa 12 bis 16 Unzen Wasser.

12. Einige Glasstäbchen und verschiedene Glasröhren. Letztere werden über der Berzelius'schen Lampe gebogen, ausgezogen u. s. w.

13. Eine Auswahl Uhrgläser.

14. Eine kleine Reibschale von Achat.

15. Einige eiserne Löffelchen. Sie können den Umfang eines Groschenstückes haben und lassen sich sehr einfach aus Eisenblech machen. Das Stielchen wird mit dem Löffelchen aus einem Stücke gefertigt.

16. Eine kleine Tiegelzange. Diese Zangen haben am zweckmässigsten Griffe wie eine Scheere. Ihre äusseren Schenkel sind am Ende in einem rechten oder etwas stumpfen Winkel gebogen und sind dann am besten construirt, wenn sie nicht blofs an einem Punkt, sondern überall schliessen. Sehr zweckmässig werden die Zangen zur Verhütung des Rostens gefirnisst.

Zweiter Abschnitt.

Die Reagentien.

§. 14.

Bei Zerlegung und Vereinigung von Körpern können wie bekannt mannigfache Erscheinungen eintreten. Bald ändert eine Flüssigkeit ihre Farbe, bald entsteht ein Niederschlag, bald ein Aufbrausen, bald eine Verpuffung u. s. w. — Sind nun solche Erscheinungen sehr auffallend und begleiten sie nur die Vereinigung oder Zerlegung zweier bestimmter Körper, so ist es klar, dass man durch den einen dieser Körper immer die Gegenwart des andern darthun kann. Wenn man z. B. weiß, dass beim Zusammenkommen von Baryt mit Schwefelsäure ein weißer Niederschlag von ganz bestimmten Eigenschaften entsteht, so ist es begreiflich, dass, wenn man durch Zusatz von Baryt zu irgend einer Flüssigkeit einen Niederschlag von demselben Verhalten bekommt, der Schluss nahe liegt, diese Flüssigkeit enthalte Schwefelsäure.

Die Körper nun, welche die Gegenwart anderer durch irgend auffallende Erscheinungen anzeigen, nennt man, in Betracht ihrer wechselseitigen Einwirkung, gegenwirkende Mittel, Reagentien.

Je nach dem Zwecke, den man durch die Anwendung der Reagentien erreicht, unterscheidet man allgemeine und besondere Reagentien. Unter den ersteren versteht man diejenigen, welche dazu dienen, die Classe oder Gruppe auszumitteln, zu welcher der zu untersuchende Körper zu rechnen ist, besondere aber nennt man solche, welche uns auf einzelne bestimmte Körper hinweisen. Dass die Grenze zwischen diesen beiden Abtheilungen durchaus nicht scharf gezogen werden kann, thut dieser Eintheilung keinen Eintrag, sie soll ja nur darauf hinführen, dass wir uns über die Absicht, in welcher wir mit einem Reagens operiren, ob also eine Gruppe oder ein einzelner Körper charakterisirt werden soll, jedesmal deutliche Rechenschaft geben.

Der Werth der Reagentien ist von zwei Umständen abhängig, nämlich erstens davon, ob sie charakteristisch und zweitens davon, ob sie empfindlich sind. Characteristisch ist ein Reagens, wenn die Veränderung, die es bei Gegenwart des Körpers, zu dessen Entdeckung es dienen soll, hervorbringt, so ausgezeichnet ist,

dass sie keinen Fehlschluss zulässt. Eisen ist also ein charakteristisches Reagens für Kupfer, Zinnchlorür für Quecksilber, weil die dadurch hervorgebrachten Erscheinungen, die Ausscheidung des metallischen Kupfers und der Quecksilberkügelchen, keine Verwechselung möglich machen. Empfindlich ist ein Reagens, wenn seine Wirkung noch deutlich ist, auch wenn nur eine höchst geringe Menge des zu bestimmenden Körpers zugegen ist, z. B. Stärkemehl auf Jod.

Sehr viele Reagentien sind zugleich charakteristisch und empfindlich, z. B. Chlorgold auf Zinnoxidul, Ferrocyankalium auf Eisenoxyd und Kupfer u. s. w. —

Dass die Reagentien, wenn ihre Aussagen zuverlässig sein sollen, in der Regel unbedingt chemisch rein sein müssen, das heisst, dass ausser den Bestandtheilen, welche wir als ihre wesentlichen kennen, keine uns unbekannte Körper darin enthalten sein dürfen, bedarf kaum der Erwähnung. Es geht daraus die Regel hervor, dass man ein Reagens, sei es, dass man es selbst dargestellt, sei es, dass man es käuflich bezogen habe, einer sorgfältigen Prüfung unterwerfen muss, bevor man sich seiner zur Untersuchung bedient. Dass bei der nachfolgenden Anleitung zur Prüfung der Reagentien auf ihre Reinheit nur auf die Stoffe Rücksicht genommen werden konnte, mit welchen sie in Folge ihrer Bereitungsart leicht verunreinigt sind, nicht aber auf ganz zufällige, versteht sich von selbst. —

Das Verfehlen des gehörigen Maasses, der richtigen Quantität beim Zusatz eines Reagens zu einem zu prüfenden Körper ist eine der gewöhnlichsten Fehlerquellen bei qualitativen Analysen. Ausdrücke, wie ein Zusatz im Ueberschuss, Uebersättigen u. a. m., verleiten den Anfänger oft zu der Meinung, man könne von dem Reagens gar nicht zu viel zusetzen und damit sie nur keine zu geringe Menge nehmen, giessen Manche, um einige Tropfen einer alkalischen Flüssigkeit zu übersättigen, ein Proberöhrchen voll Säure zu, während doch jeder Tropfen der Säure, welcher zugesetzt wird, nachdem einmal der Neutralitätspunkt erreicht ist, schon als ein Säureüberschuss angesehen werden muss. Ebenso wie nun ein zu reichlicher, so muss auch ein zu geringer Zusatz vermieden werden, indem bei unzureichender Menge eines Reagens oft ganz andere Erscheinungen eintreten, als bei einem Ueberschuss desselben. So wird z. B. Quecksilberchlorid von wenig Schwefelwasserstoff weiss, von überflüssigem aber schwarz gefällt. Als Erfahrungs-

satz jedoch kann aufgestellt werden, dass sich Anfänger ihre Arbeiten gewöhnlich dadurch erschweren und unsicher machen, dass sie zu reichliche Mengen von den Reagentien zusetzen. Der Grund, warum dadurch die Untersuchung an Sicherheit verliert, liegt am Tage, wenn man sich erinnert, dass die durch Reagentien bewirkten Veränderungen alle nur bis zu einer gewissen Grenze bemerkbar sind, dass sie also um so weniger in's Auge fallen, um so leichter übersehen werden, je mehr man sich dieser Grenze durch Verdünnung der Flüssigkeit nähert.

In Betreff der Vermeidung dieser besprochenen Fehlerquelle lassen sich durchaus keine bestimmten Gesetze aufstellen, wohl aber ein allgemeines und dieses reicht auch hin, in allen, wenigstens in den meisten Fällen stets das richtige Maafs zu treffen. Es besteht einfach darin, dass man jedesmal vor dem Zusatz eines Reagens klar überdenkt, in welcher Absicht man es anwendet, welche Erscheinung man dadurch hervorrufen will.

Je nachdem man den zum Einwirken der Reagentien nothwendigen flüssigen Zustand durch Hitze, oder durch nasse Lösungsmittel herstellt, unterscheidet man Reagentien auf trockenem und Reagentien auf nassem Wege. Der Uebersicht wegen bringen wir diese Hauptgruppen in folgende Unterabtheilungen.

A. Reagentien auf nassem Wege.

I. Allgemeine Reagentien.

- a. Solche, welche vorzugsweise als einfache Lösungsmittel gebraucht werden.
- b. Solche, welche hauptsächlich als chemische Lösungsmittel Anwendung finden.
- c. Solche, welche besonders zur Abscheidung oder zur anderweitigen Characterisirung von Körpergruppen dienen.

II. Besondere Reagentien.

- a. Solche, welche besonders zur Erkennung der einzelnen Basen dienen.
- b. Solche, welche vorzugsweise zur Auffindung der einzelnen Säuren in Anwendung kommen.

B. Reagentien auf trockenem Wege.

I. Aufschliessungsmittel.

II. Löthrohrreagentien.

A. Reagentien auf nassem Wege.

I. Allgemeine Reagentien.

a. Solche, welche vorzugsweise als einfache Lösungsmittel gebraucht werden.

§. 15.

1. Wasser.

Bereitung. Man destillirt Brunnenwasser aus einer kupfernen Blase, oder aus einer Glasretorte und lässt ein Viertel desselben zurück. — Im Freien aufgefangenes Regenwasser kann das destillirte Wasser in den meisten Fällen ersetzen.

Prüfung. Es darf beim Verdampfen keinen Rückstand hinterlassen und Georginenpapier nicht verändern. Salpetersaures Silber, Chlorbaryum, oxalsaures Ammoniak und Kalkwasser dürfen es nicht trüben.

Anwendung. Das Wasser¹⁾ dient uns erstens als einfaches Lösungsmittel für eine sehr große Anzahl von Körpern. Es findet ferner specielle Anwendung zur Zerlegung einiger neutraler Metallsalze in saure lösliche und basische unlösliche Verbindungen, insbesondere der Wismuthsalze und des Chlorantimons.

§. 16.

2. Alkohol.

Bereitung. Man braucht bei Analysen erstens einen Weingeist von 0,83 bis 0,84 spec. Gew., den Spiritus Vini rectificatissimus der Apotheken, und zweitens absoluten Alkohol. Den letztern erhält man durch Rectification des erstern unter Zusatz geschmolzenen Chlorcalciums.

Prüfung. Er muss sich vollständig verflüchtigen, darf zwischen den Händen gerieben keinen Fuselölgeruch hinterlassen, und Lackmuspapier nicht röthen.

Anwendung. Im Alkohol sind manche Körper löslich, andere unlöslich. Er kann uns daher öfters zur Trennung der ersteren von den letzteren dienen. Z. B. zur Scheidung des Chlorstrontiums vom Chlorbaryum. — Der Alkohol wird ferner zur Ab-

¹⁾ Da wir uns bei chemischen Untersuchungen nur des destillirten Wassers bedienen können, so sei hiermit erklärt, dass in dem ganzen Werkchen unter Wasser stets destillirtes Wasser zu verstehen ist.

scheidung in Weingeist unlöslicher Körper aus ihren wässrigen Lösungen angewendet. Z. B. zur Fällung des äpfelsauren Kalks. Wir gebrauchen ihn außerdem zur Erzeugung verschiedener Aetherarten, besonders zur Bildung des durch seinen Geruch charakterisirten Essigäthers. — Der Alkohol dient uns endlich zur Erkennung einiger Substanzen, welche die Flamme darüber angezündeten Weingeists eigenthümlich färben, namentlich der Borsäure, des Strontians, des Natrons und des Kalis.

§. 17.

3. Aether.

Der Aether findet in der qualitativen Analyse anorganischer Körper eine höchst beschränkte Anwendung. Er wird nämlich fast nur zur Isolirung des Broms gebraucht (§. 100 b.). Zu diesem Zwecke ist der käufliche officinelle Aether hinreichend rein und stark.

b. Reagentien, welche hauptsächlich als chemische Lösungsmittel Anwendung finden.

§. 18.

1. Chlorwasserstoffsäure.

Bereitung. Man übergießt in einer Retorte 8 Theile Kochsalz mit einer erkalteten Mischung von $13\frac{1}{2}$ Theilen englischer Schwefelsäure und 4 Theilen Wasser, richtet den Hals der Retorte etwas in die Höhe, erwärmt sie im Sandbade so lange noch Gas übergeht und leitet das sich entwickelnde mittelst einer zweischenkligen Röhre in ein beständig abzukühlendes Glas, welches 12 Theile Wasser enthält. Die Röhre lässt man, um ein Zurücksteigen zu verhüten, nur etwa eine Linie in das vorgeschlagene Wasser tauchen. Enthält die Schwefelsäure Salpetersäure, so muss das zuerst übergehende Gas, welches alsdann Chlor enthält, besonders aufgefangen werden. Nach beendigter Operation prüft man das spec. Gew. der erhaltenen Säure und verdünnt sie mit Wasser bis sie 1,11 bis 1,12 wiegt.

Prüfung. Die Salzsäure muss farblos sein und beim Verdampfen keinen Rückstand lassen. Sie darf Indigolösung beim Kochen nicht entfärben. Chlorbaryum darf in der stark verdünnten Säure weder so einen Niederschlag geben (Schwefelsäure), noch auch nach dem Kochen mit Salpetersäure (schweflige Säure). Schwefelwasserstoff muss sie unverändert lassen. Ferrocyankalium darf sie,

nach der Neutralisation mit Ammoniak und nachherigem Zusatz von etwas überschüssiger Essigsäure, nicht blau färben oder fällen.

Anwendung. Die Salzsäure dient uns als chemisches Lösungsmittel für eine sehr große Anzahl von Körpern, besonders für Oxyde, Superoxyde (bei deren Lösung Chlor frei wird) und Salze mit schwächeren Säuren. Eine erfolgende Lösung der Art ist jederzeit durch die Entstehung eines in Wasser löslichen Chlorids bedingt. — Die Salzsäure ist auch ein einfaches Lösungsmittel für viele Salze, z. B. für die phosphorsauren, borsaauren, oxalsauren alkalischen Erden. — Sie dient ferner zum Austreiben schwächerer Säuren aus ihren Salzen, z. B. der Kohlensäure, Hydrothionsäure, und findet ausserdem specielle Anwendung zur Entdeckung und Abscheidung des Silberoxyds, Quecksilberoxyduls und Bleis (siehe unten), wie auch zur Erkennung des freien Ammoniaks an der auf der Entstehung von Salmiak in der Luft beruhenden Nebelbildung.

§. 19.

2. Salpetersäure.

Bereitung. Man setzt zu käuflicher Salpetersäure, welche fast immer Schwefelsäure und Salzsäure enthält, salpetersaure Silberoxydlösung, so lange noch ein Niederschlag von Chlorsilber entsteht, lässt absetzen, gießt in eine Retorte und destillirt bis auf einen kleinen Rest über. Das Destillat verdünnt man alsdann, wenn es nöthig ist, mit Wasser, bis die Säure ein spec. Gewicht von 1,2 hat.

Prüfung. Sie muss farblos sein und auf einem Platinblech verdampft keinen Rückstand lassen. Salpetersaures Silber und salpetersaurer Baryt dürfen sie nicht trüben. Vor dem Zusatz dieser Reagentien ist die Säure mit Wasser stark zu verdünnen, widrigenfalls sich salpetersaure Salze niederschlagen.

Anwendung. Die Salpetersäure dient erstlich als chemisches Lösungsmittel für Metalle, Oxyde, Schwefelverbindungen, Sauerstoffsalze u. s. w. Ihre Wirkung beruht bei den Metallen und Schwefelmetallen auf Oxydation dieser Körper auf Kosten eines Theils des Sauerstoffs der Säure und auf nachheriger Auflösung der gebildeten Oxyde zu salpetersauren Salzen. Die meisten Oxyde werden von Salpetersäure geradezu als salpetersaure Salze gelöst, ebenso die meisten in Wasser unlöslichen Salze mit schwächeren Säuren, indem bei den letzteren die Salpetersäure die

schwächere Säure austreibt. — Für viele Salze mit stärkeren Säuren ist sie, gerade wie die Salzsäure, ein einfaches Lösungsmittel, z. B. für die phosphorsauren alkalischen Erden. — Die Salpetersäure dient ferner als gewöhnlichstes Oxydationsmittel, z. B. zur Ueberführung des Eisenoxyduls in Oxyd, zur Zersetzung der Jodwasserstoffsäure und Jodmetalle u. s. w.

§. 20.

3. Salpeter-Salzsäure.

Bereitung. Man mischt einen Theil reiner Salpetersäure mit 3 bis 4 Theilen reiner Salzsäure.

Anwendung. Salpetersäure und Salzsäure zerlegen sich in der Art, dass Chlor, Untersalpetersäure und Wasser gebildet werden. Diese Zerlegung hört auf, wenn die Flüssigkeit mit Chlor gesättigt ist, sie beginnt sogleich wieder, wenn dieser Sättigungszustand durch Erwärmen oder dadurch, dass das Chlor sich mit einem Körper verbindet, aufgehoben wird. Man hat also im Königswasser erstens eine fortdauernde Quelle von Chlor und zweitens Untersalpetersäure, eine Verbindung also, welche geneigt ist, Sauerstoff abzugeben. Durch den Gehalt an diesen beiden Substanzen ist die Salpetersalzsäure unser stärkstes Lösungsmittel für Metalle, diejenigen ausgenommen, welche mit Chlor unlösliche Verbindungen bilden. Ihre Hauptanwendung ist die zur Lösung des Golds und Platins, welche sowohl in Salzsäure als Salpetersäure unlöslich sind, zur Zersetzung verschiedener Schwefelmetalle, z. B. des Zinnobers u. s. w.

§. 21.

4. Essigsäure.

Bereitung. Man reibt 10 Theile krystallisirtes neutrales essigsaures Bleioxyd mit 3 Theilen zerfallenem Glaubersalz zusammen, giebt das Gemeng in eine Retorte, setzt ein erkaltetes Gemisch von $2\frac{1}{2}$ Theilen englischer Schwefelsäure und eben so viel Wasser zu und destillirt aus dem Sandbad bis zur Trockne. Die Vorlage verbindet man mit der Retorte sehr zweckmäfsig durch einen Liebig'schen Kühlapparat.

Prüfung. Die Essigsäure darf beim Verdampfen keinen Rückstand lassen. Schwefelwasserstoff, Silber- und Barytlösung dürfen die verdünnte Säure nicht fällen, Barytlösung auch dann nicht,

wenn die Essigsäure zuvor mit Salpetersäure gekocht worden ist. — Indigolösung darf beim Erhitzen mit der Säure nicht entfärbt werden. Siehe §. 101. a.

Anwendung. Die Anwendung der Essigsäure bei der qualitativen Analyse gründet sich meistens darauf, dass sie ein ungleiches Lösungsvermögen für verschiedene Substanzen hat. So wird sie z. B. zur Unterscheidung des oxalsauren Kalks vom phosphorsauren angewendet. — Die Essigsäure dient ferner zum Ansäuern von Flüssigkeiten, wenn Mineralsäuren vermieden werden sollen.

§. 22.

5. Chlorammonium.

Bereitung. Den käuflichen Salmiak kann man meistens durch einfaches Umkrystallisiren rein erhalten. Enthält er Eisen, so setzt man der Auflösung etwas Schwefelammonium zu, lässt den entstehenden Niederschlag sich absetzen, filtrirt, setzt Salzsäure bis zur schwach sauren Reaktion zu, kocht auf, filtrirt, sättigt mit Ammoniak und bringt zur Krystallisation. Einen Theil des Salzes löst man zum Gebrauche in 8 Theilen Wasser.

Prüfung. Auf einem Platinblech verdampft muss die Salmiaklösung einen Rückstand hinterlassen, der sich bei weiterem Erhitzen vollständig verflüchtigt. Schwefelammonium darf sie nicht verändern. Ihre Reaktion sei völlig neutral.

Anwendung. Der Salmiak dient hauptsächlich dazu, gewisse Oxyde, z. B. Manganoxydul, Magnesia, oder Salze, z. B. weinstein-sauren Kalk, in Auflösung zu erhalten, wenn andere Oxyde oder Salze durch Ammoniak oder ein anderes Reagens niedergeschlagen werden. Diese Anwendung gründet sich auf die Neigung der Ammoniaksalze, mit anderen Salzen Doppelverbindungen zu bilden. Ferner dient der Salmiak zur Unterscheidung mancher im Uebrigen ähnlicher Niederschläge, z. B. der in Salmiak unlöslichen basisch phosphorsauren Ammoniak-Magnesia von anderen Magnesianiederschlägen. Endlich wendet man ihn an zur Fällung verschiedener in Kali löslicher, in Ammoniak unlöslicher Körper aus ihren kalischen Lösungen, z. B. der Thonerde, des Chromoxyds. Der Salmiak setzt sich nämlich mit dem Kali um, es bildet sich Chlorkalium, Wasser und Ammoniak. Der

Salmiak findet ferner specielle Anwendung zur Fällung des Platins als Platinsalmiak.

c. Reagentien, welche besonders zur Abscheidung oder zur anderweitigen Charakterisirung von Körpergruppen dienen.

§. 23.

1. Reagenspapiere: α . Blaues Lackmuspapier.

Bereitung. Man digerirt einen Theil käuflichen Lackmus mit 6 Theilen Wasser, theilt die intensiv blaue Flüssigkeit in 2 Theile, sättigt in der einen Hälfte das freie Alkali, indem man wiederholt mit einem in sehr verdünnte Schwefelsäure getauchten Glasstabe umrührt, bis die Farbe eben roth erscheint, mischt die noch blaue Hälfte hinzu, gießt Alles in eine Schale und zieht Streifen feinen, ungeleimten Papiers durch die Tinktur. Zum Trocknen hängt man die Streifen an Fäden auf. Das Lackmuspapier muss gleichmässig, weder zu hell noch zu dunkel gefärbt sein.

Anwendung. Das Lackmuspapier dient zur Entdeckung freier Säure in einer Flüssigkeit, indem dadurch seine blaue Farbe in Roth übergeführt wird. — Dieselbe Umwandlung erleidet es übrigens auch durch die neutralen Salze der meisten Metalloxyde, was wohl zu beachten ist.

β . Geröthetes Lackmuspapier.

Bereitung. Man rührt blaue Lackmustinktur wiederholt mit einem in verdünnte Schwefelsäure getauchten Glasstäbchen um, bis ihre Farbe eben deutlich roth geworden. Mit dieser Tinktur tränkt man sodann Papierstreifen. Sie müssen nach dem Trocknen deutlich roth sein.

Anwendung. Reine Alkalien und alkalische Erden, ebenso die Schwefelverbindungen dieser Körper, kohlensaure Alkalien, wie auch die löslichen Salze einiger anderer schwacher Säuren, namentlich der Borsäure, stellen die blaue Farbe des gerötheten Lackmuspapiers wieder her. Es dient daher zur Erkennung dieser Körper im Allgemeinen.

γ . Georginenpapier.

Bereitung. Die violetten Corollenblätter der *Georgina purpurea* kocht man mit Wasser, oder digerirt sie mit Weingeist und tränkt mit der erhaltenen Tinktur Papierstreifen. Man muss die Flüssigkeit

gerade so concentrirt wählen, dass das Papier nach dem Trocknen eine schön blauviolette, nicht zu dunkle Farbe hat. Fällt es zu roth aus, so setzt man der Tinktur ein Minimum Ammoniak zu.

Anwendung. Das Georginenpapier wird von Säuren roth, von Alkalien schön grün gefärbt. Es ist daher zum Gebrauche sehr bequem, indem es sowohl das blaue als das geröthete Lackmuspapier ersetzt. Bei guter Bereitung ist es sowohl auf Säuren, als Alkalien äußerst empfindlich. Concentrirte Lösungen ätzender Alkalien färben es gelb, indem sie den Farbstoff zerstören.

δ. Curcumapapier.

Bereitung. Man digerirt und erwärmt einen Theil gestossene Curcumawurzel mit 6 Theilen schwachen Weingeistes und tränkt mit der filtrirten Tinktur Streifen von feinem Papier. Das Curcumapapier muss nach dem Trocknen eine schön gelbe Farbe haben.

Anwendung. Es dient ebenso wie das rothe Lackmuspapier und das Georginenpapier zur Entdeckung freier Alkalien u. s. w., indem durch dieselben seine gelbe Farbe in eine braune umgewandelt wird. Es ist nicht so empfindlich wie die anderen Reagenspapiere, die Farbenveränderung ist aber sehr charakteristisch und kann bei manchen gefärbten Flüssigkeiten besonders gut wahrgenommen werden, daher das Curcumapapier nicht gut zu entbehren ist. Bei Prüfungen mit demselben ist zu berücksichtigen, dass auch einige Körper, welche nicht zu den oben (beim gerötheten Lackmuspapier) angeführten gehören, z. B. die Borsäure, seine gelbe Farbe in Braun umwandeln.

Alle Reagenspapiere werden in Streifchen zerschnitten und in gut verschlossenen Kästchen oder Gläsern aufbewahrt.

§. 24.

2. Schwefelsäure.

Man kann sich bei qualitativen Analysen stets der englischen Schwefelsäure bedienen, wenn man dieselbe durch Kochen von Salpetersäure befreit hat und wenn sie kein Arsen enthält.

Prüfung. Die Schwefelsäure darf mit wenig Indigolösung gekocht die blaue Farbe derselben nicht zerstören. Sie muss mit reinem Zink und Wasser Wasserstoffgas liefern, welches beim Durchleiten durch eine glühende Röhre keinen Anflug von Arsen giebt. Vergl. §. 93. d.

Anwendung. Da die Schwefelsäure zu den meisten Basen grössere Verwandtschaft hat, als beinahe alle übrigen Säuren, so


bedient man sich ihrer besonders zum Freimachen und Austreiben anderer Säuren, namentlich der Phosphorsäure, Borsäure, Salzsäure, Salpetersäure und Essigsäure. — Die Schwefelsäure dient ferner zum Freimachen des Jods in den Jodmetallen. Sie oxydirt dabei die Metalle auf Kosten ihres eigenen Sauerstoffs und geht in schweflige Säure über. — Auf die große Verwandtschaft der Schwefelsäure zum Wasser gründet sich die Zersetzung mehrerer Körper, welche ohne Wasser nicht bestehen können (z. B. die der Oxalsäure), wenn sie mit concentrirter Schwefelsäure zusammenkommen. Die frei werdenden Zersetzungsprodukte lassen alsdann auf den zersetzten Körper schliessen. — Die Schwefelsäure ist außerdem zur Entwicklung mehrer Gase, besonders des Wasserstoffgases und Schwefelwasserstoffs in häufigem Gebrauch. — Zur Entdeckung und Fällung des Baryts, Strontians und Bleis findet sie endlich specielle Anwendung. Man bedient sich dazu einer mit 4 Theilen Wasser verdünnten Säure.

§. 25.

3. Schwefelwasserstoff.

Bereitung. In einen rothglühenden Schmelztiegel trägt man portionenweise ein inniges Gemenge von 32 Theilen Eisenfeile und 21 Theilen Schwefelblumen mit der Vorsicht, dass man immer das die Statt findende Vereinigung bezeichnende Erglühen der eingetragenen Menge abwartet, bevor man neue Portionen zusetzt.

Nachdem Alles eingetragen ist, lässt man den Tiegel wohl bedeckt noch eine kleine Weile im Feuer. Die erkaltete Masse schlägt man in Stückchen, übergießt sie in einer Entwicklungsflasche (a) mit Wasser und setzt durch die Trichterröhre (b) concentrirte Schwefelsäure zu. Das sich entwickelnde Gas leitet man zur Reinigung durch etwas Wasser (c).



Das Schwefelwasserstoffwasser bereitet man durch Einleiten des Gases in ausgekochtes, möglichst kaltes Wasser (d) bis zur Sättigung, bis also alles Gas gänzlich unabsorbirt entweicht.

Das Schwefelwasserstoffwasser muss wohlverstopft aufbewahrt werden, sonst erleidet es bald vollständige Zersetzung. Sehr lange hält es sich, wenn man es gleich nach der Bereitung in kleine Fläschchen füllt und diese gut verkorkt in mit Wasser gefüllte Töpfchen umstürzt. Es muss klar sein, in hohem Grade den Geruch des Gases haben und mit Eisenchlorid einen starken Niederschlag von Schwefel geben. Bei Zusatz von Ammoniak darf es nicht schwärzlich werden.

Anwendung. Der Schwefelwasserstoff hat große Neigung sich mit Metalloxyden in Wasser und Schwefelmetalle umzusetzen. Da nun diese größtentheils in Wasser unlöslich sind, so ist eine solche Umsetzung meistens von einer Fällung der Metalloxyde aus ihren Lösungen begleitet. Die Bedingungen, unter welchen diese Fällungen erfolgen, sind in der Art verschieden, dass wir durch Abänderung derselben sämtliche fällbare Metalle wiederum in Gruppen scheiden können, wie dies unten auseinander gesetzt werden soll. Es ist daher der Schwefelwasserstoff zur Trennung der Metalle in Hauptgruppen ein ganz unschätzbares Mittel. Von den durch Schwefelwasserstoff erzeugten Niederschlägen, von den Schwefelmetallen also, haben einige so ausgezeichnete Farbe, dass wir daraus auf die darin enthaltenen Metalle schließen können. Diejenigen Metalle, zu deren specieller Erkennung der Schwefelwasserstoff dient, sind besonders folgende: Zinn, Antimon, Arsen, Cadmium, Mangan und Zink. Das Nähere siehe im 3ten Abschnitt. Durch seine leicht erfolgende Zersetzbarkeit wird der Schwefelwasserstoff auch zum Reductionsmittel für viele Körper, so werden Eisenoxydsalze dadurch in Oxydulsalze verwandelt, Chromsäure in Chromoxyd u. s. w. Bei diesen Reductionen scheidet sich der Schwefel in Form eines feinen weißen Pulvers aus.

§. 26.

4. Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium.

Bereitung. Man leitet durch Ammoniakflüssigkeit Schwefelwasserstoffgas bis zur vollkommenen Sättigung, bis also schwefelsaure Magnesialösung davon nicht mehr gefällt wird. Die erhaltene Flüssigkeit muss in gut verschlossenen Gläsern aufbewahrt werden, da sie sich in Berührung mit der Luft zersetzt.

Prüfung. Das Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium ist anfangs klar und scheidet beim Vermischen mit Säuren keinen Schwefel ab, in Berührung mit der Luft färbt es sich gelb, indem

sich Schwefelammonium im Maximum bildet. Eine solche gelbe Färbung macht das Reagens nicht unbrauchbar. Es scheidet aber jetzt beim Vermischen mit Säuren Schwefel ab, was zu berücksichtigen ist. Das Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium muss klar sein, beim Erhitzen sich ohne Rückstand verflüchtigen und wie gesagt Magnesialösung nicht fällen.

Anwendung. Es wurde bereits angeführt, dass die Scheidung der durch Schwefelwasserstoff fällbaren Metalloxyde in weitere Gruppen von gewissen zu ihrer Präcipitation nothwendigen Bedingungen abhängig sei. Eine dieser Bedingungen ist die Gegenwart, eine andere die Abwesenheit eines Alkalis; das will sagen, gewisse Schwefelmetalle schlagen sich nur dann nieder, wenn die Flüssigkeit alkalisch ist, weil sie in Säuren löslich sind, andere nur, wenn die Flüssigkeit sauer ist, weil sie in alkalischen Schwefelmetallen löslich sind. Das Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium nun, (welches der Kürze wegen in Zukunft nur Schwefelammonium genannt werden soll) kann als ein Reagens betrachtet werden, in dem Schwefelwasserstoff und Ammoniak neben einander wirken. Es sind also darin sowohl die Bedingungen gegeben, welche zur Fällung der eben erwähnten ersten Gruppe nothwendig sind, als auch die, welche der Fällung der Schwefelmetalle der andern Gruppe vorbeugen, oder eine Wiederauflösung derselben bewirken, wenn die aus saurer Lösung niedergeschlagenen mit dem Reagens digerirt werden. Behufs dieser letzteren Anwendung muss das Schwefelammonium in gewissen Fällen einen Ueberschuss an Schwefel enthalten.

Außer Schwefelmetallen, deren Fällung aus einem Zusammenwirken des Schwefelwasserstoffs und des Ammoniaks hervorgeht, schlägt das Schwefelammonium durch bloße Wirkung seines Ammoniaks das Chromoxyd und die Thonerde als Oxydhydrate nieder, sowie auch solche Substanzen, welche nur durch freie Säure gelöst waren, z. B. in Salzsäure gelösten phosphorsauren Kalk, was wohl ins Auge zu fassen.

§. 27.

5. Schwefelkalium.

Bereitung. Man hält dieses Reagens nicht vorrätig, sondern bereitet es sich erst beim jedesmaligen Gebrauche durch Auflösen von etwas Schwefel in erhitzter Kalilauge.

Anwendung. Das Schwefelkalium muss statt des Schwefelammoniums angewendet werden, wenn Schwefelkupfer von in alkalischen Schwefelmetallen löslichen Schwefelverbindungen z. B. von Zinnsulfür getrennt werden soll, da das Schwefelkupfer in Schwefelammonium nicht ganz unlöslich ist.

§. 28.

6. Kali.

Bereitung. Man löst eine Unze reines kohlensaures Kali (§. 29.) in 12 Unzen Wasser, bringt die Lösung in einem blanken eisernen Gefäß zum Kochen und setzt, während die Flüssigkeit fortwährend siedet, so lange Kalkhydrat in kleinen Portionen zu, bis eine Probe der Flüssigkeit, in Salzsäure filtrirt, kein Aufbrausen mehr verursacht. (Man braucht zu 2 Theilen kohlensaurem Kali das Hydrat von etwa 1 Theil kaustischem Kalk). Das Gefäß wird jetzt vom Feuer genommen. Wenn genau nach der Vorschrift verfahren worden ist, setzt sich der gebildete kohlensaure Kalk sehr schnell zu Boden. Man gießt, sowie dies geschehen, die Lauge auf ein Seihezeug von gebleichter Leinwand und verdampft das Filtrat in einem eisernen, besser in einem silbernen Gefäß bei raschem Feuer bis es 4 Unzen beträgt, also etwa ein spec. Gew. = 1,33 hat. Die Kalilauge wird am besten in Fläschchen aufgehoben, welche mit übergreifendem Deckel nach Art der gläsernen Spirituslampen verschlossen sind. In Ermangelung solcher legt man um den Glasstopfen eines gewöhnlichen Glases vor dem Eindrehen ein schmales Streifchen Schreibpapier. Versäumt man diese Vorsichtsmaßregel, so geht nach kurzer Zeit der Stopfen nicht mehr aus dem Glas.

Prüfung. Die Kalilauge muss farblos sein. Sie soll nach Uebersättigung mit Salpetersäure, wobei nur ein geringes Aufbrausen entstehen darf, weder mit Chlorbaryum, noch mit salpetersaurem Silberoxyd Niederschläge geben und nach dem Abdampfen zur Trockne beim Aufnehmen des Rückstandes mit Wasser keine Kieselsäure zurücklassen. Beim Erwärmen mit einer gleichen Menge Salmiaklösung darf keine Trübung entstehen.

Anwendung. Vermöge seiner großen Verwandtschaft zu Säuren zersetzt das Kali die Salze der meisten Basen und schlägt daher aus ihren Lösungen alle diejenigen nieder, welche im Wasser unlöslich sind. Von diesen Oxyden werden manche von Kaliüberschuss gelöst, z. B. Thonerde, Chromoxyd, Bleioxyd; andere nicht, wie Eisenoxyd, Wismuthoxyd u. s. w. Das Kali giebt also auch ein

Mittel an die Hand, die ersteren Oxyde von den letzteren zu trennen. — Das Kali löst ferner viele Salze (z. B. chromsaures Blei), Schwefelverbindungen u. s. w. auf und trägt so sowohl zur Trennung, als auch zur Unterscheidung derselben bei. — Viele der durch Kali erzeugten Niederschläge zeigen eigenthümliche Farbe oder haben sonst charakteristische Eigenschaften, wie z. B. Manganoxydul, Eisenoxydul, Quecksilberoxydul, so dass man an diesen Niederschlägen die Metalle erkennen kann. Das Kali treibt das Ammoniak aus seinen Salzen aus, so dass es sich alsdann an seinem Geruch, seiner Reaction auf Pflanzenfarben u. s. w. erkennen lässt.

§. 29.

7. Kohlensaures Kali.

Bereitung. Man glühe gereinigten Weinstein in einem Eisengefäße bis die Masse vollständig verkohlt ist, koche den Rückstand mit Wasser aus, filtrire die Lauge, verdampfe sie, zuletzt unter stetem Umrühren, in einem blanken eisernen Gefäße zur Trockne und hebe das trockne Salz in einem wohl verschlossenen Glase auf. Zum Gebrauche löst man einen Theil desselben in 5 Theilen Wasser.

Prüfung. Das kohlensaure Kali sei vollkommen weiß. Seine Lösung darf nach Uebersättigung mit Salpetersäure weder von Chlorbaryum noch von salpetersaurem Silberoxyd getrübt werden und muss, mit Salzsäure übersättigt und zur Trockne verdampft, beim Wiederlösen in Wasser keinen Rückstand (Kieselerde) lassen.

Anwendung. Das kohlensaure Kali fällt alle Basen mit Ausnahme der Alkalien und zwar die meisten als kohlensaure Verbindungen, einige auch als Oxyde. Aus sauren Auflösungen werden diejenigen Basen, welche als doppeltkohlensaure Salze in Wasser löslich sind, erst beim Kochen vollständig gefällt. Viele von den durch kohlensaures Kali erzeugten Niederschlägen sind eigenthümlich gefärbt und können daher zur Erkennung der einzelnen Metalle dienen. Die kohlensaure Kalilauge wird ferner zur Zerlegung vieler unlöslicher Salze mit alkalisch erdiger oder metallischer Base, besonders derer mit organischen Säuren angewendet. Diese Salze werden nämlich beim Kochen mit kohlensaurem Kali in kohlensaure Verbindungen umgewandelt, während die Säuren an das Kali treten, also in Lösung kommen. Das kohlensaure Kali dient außerdem zur Sättigung freier Säuren, um sie als Kalisalze zu be-

kommen und findet endlich specielle Anwendung zur Fällung des Platins aus salzsäurehaltigen Lösungen.

§. 30.

8. Ammoniak.

Bereitung. Man löscht 4 Thle. kaustischen Kalk mit $1\frac{1}{2}$ Thl. Wasser, mischt das Hydrat in einem Glaskolben mit 5 Thln. gepulvertem Salmiak und tröpfelt vorsichtig noch so viel Wasser hinzu, dass das Pulver beim Umschütteln Klumpen bildet. Man setzt alsdann den Kolben in ein Sandbad und bringt ihn mit zwei, in der Mitte durch einen kleinen Waschapparat verbundenen Gasleitungsröhren in Verbindung, gerade wie dies oben (§. 25.) bei dem Schwefelwasserstoff angegeben und abgebildet ist. In das Waschgläschen gibt man eine sehr kleine Menge Wasser, in das zur Absorption bestimmte aber 10 Thle. Das letztere stellt man in ein Gefäß mit kaltem Wasser und beginnt alsdann zu erwärmen. Die Gasentwicklung erfolgt rasch. Man feuert, bis keine Blasen mehr kommen, und öffnet alsdann schnell den Pfropf des Kolbens, damit die Flüssigkeit nicht zurücksteige. Der in dem Waschgläschen enthaltene Salmiakgeist ist unrein, der in dem zweiten Glase enthaltene aber ist rein, enthält ungefähr 16 Procent Ammoniak, hat also ein spec. Gew. von etwa 0,93. Man bewahrt ihn in mit Glasstopfen verschlossenen Gläsern auf.

Prüfung. Der Salmiakgeist muss farblos sein, darf beim Verdampfen auf einem Uhrglase nicht den geringsten Rückstand lassen, Kalkwasser nicht trüben (Kohlensäure) und nach dem Uebersättigen mit Salpetersäure weder durch Baryt-, noch durch Silber-Lösung getrübt, noch auch durch Schwefelwasserstoff gefärbt werden.

Anwendung. Das Ammoniak ist eines derjenigen Reagentien, welche mit am häufigsten in Gebrauch kommen. Es dient besonders zum Sättigen saurer Flüssigkeiten, zur Fällung sehr vieler Metalloxyde und Erden, sowie zur Trennung der fällbaren von einander, indem manche derselben von Ammoniaküberschuss als ammoniakalische Doppelsalze gelöst werden, wie Zink-, Cadmium-, Silber-, Kupfer-, Nickel-, Kobalt-Oxyd, andere in freiem Ammoniak nicht löslich sind. Sowohl die Niederschläge, als die ammoniakalischen Lösungen derselben sind zum Theil ausgezeichnet gefärbt und lassen die Metalle erkennen. —

Viele Oxyde, welche aus neutralen Lösungen durch Ammo-

niak niedergeschlagen werden, erleiden dadurch aus sauren Lösungen keine Fällung, indem dieselbe durch das gebildete Ammoniaksalz verhindert wird, vergl. oben Chlorammonium (§. 22.).

§. 31.

9. Kohlensaures Ammoniak.

Bereitung. Man nimmt gereinigtes, nicht mehr nach Thieröl riechendes, anderthalb kohlensaures Ammoniak, wie es im Großen durch Sublimation aus Salmiak und Kreide gewonnen wird, schabt die Rinden auf ihrer äußern und innern Seite sorgfältig ab und löst einen Theil des Salzes in 4 Thln. Wasser, welchem man 1 Thl. Aetzammoniakflüssigkeit zugesetzt hat.

Prüfung. Das kohlensaure Ammoniak muss sich vollständig verflüchtigen und darf nach Uebersättigung mit Salpetersäure weder durch Baryt-, noch Silber-Lösung, noch auch durch Schwefelwasserstoff gefärbt oder gefällt werden.

Anwendung. Das kohlensaure Ammoniak fällt wie das kohlensaure Kali die meisten Metalloxyde und Erden. Die vollständige Fällung vieler derselben erfolgt ebenfalls erst beim Kochen. Von den gefällten Verbindungen lösen sich einige in einem Ueberschusse des Fällungsmittels wieder auf. In gleicher Weise löst das kohlensaure Ammoniak manche Oxydhydrate und gestattet so eine Trennung derselben von anderen unlöslichen. Diese Auflösungs-fähigkeit beruht auf der Neigung der Ammoniaksalze, lösliche, durch freies und kohlensaures Ammoniak unzersetzbare Doppelsalze zu bilden. —

Wie das Aetzammoniak und aus demselben Grunde schlägt auch das kohlensaure Ammoniak viele Oxyde nicht aus sauren Auflösungen nieder, welche aus neutralen Lösungen davon gefällt werden. Vergl. §. 30. — In dem Gang der Analyse dient das kohlensaure Ammoniak vorzüglich zur Abscheidung des Baryts, Strontians und Kalks und zur Trennung derselben von der Magnesia, da die letztere davon bei Gegenwart von Ammoniaksalzen nicht gefällt wird.

§. 32.

10. Chlorbarium.

Bereitung. Man menge 6 Thle. fein gepulverten Schwerspath mit 1 Thl. Kohlenpulver und $1\frac{1}{2}$ Thln. Mehl und setze das Gemenge in einem hessischen Tiegel einer möglichst starken Glüh-

hitze aus. Die erkaltete Masse zerreihe man, bringe etwa $\frac{9}{10}$ davon mit der vierfachen Menge Wasser zum Kochen und versetze mit Salzsäure, bis kein Aufbrausen von Schwefelwasserstoff mehr entsteht und die Flüssigkeit schwach sauer reagirt. Alsdann füge man das letzte $\frac{1}{10}$ des geglühten Gemenges hinzu, koche noch eine Weile, filtrire und bringe die alkalische Flüssigkeit zur Krystallisation. Die getrockneten Krystalle digerire man mit Alkohol und wasche sie damit aus, löse sie wieder in Wasser auf und bringe neuerdings zur Krystallisation. Zum Gebrauche wird ein Theil der Krystalle in 10 Thln. Wasser gelöst.

Prüfung. Das Chlorbaryum darf Pflanzenfarben nicht verändern, seine Lösung darf weder durch Schwefelwasserstoff, noch durch Schwefelammonium verändert werden. Reine Schwefelsäure muss daraus alles Feuerbeständige fällen, so dass die abfiltrirte Flüssigkeit, auf dem Platinblech verdampft, nicht den geringsten Rückstand lässt.

Anwendung. Der Baryt bildet mit manchen Säuren lösliche, mit anderen unlösliche Verbindungen. Es können daher die ersteren Säuren, welche von Chlorbaryum nicht gefällt werden, von den letzteren, in deren Salzlösungen durch Chlorbaryum Niederschläge entstehen, unterschieden werden. Die gefällten Barytniederschläge zeigen zu anderen Körpern (Säuren) ein verschiedenes Verhalten. Indem wir solche Körper auf dieselben einwirken lassen, können wir demnach die Gruppe der fällbaren Säuren wieder in Abtheilungen bringen, gewisse Säuren aber direct erkennen. Das Chlorbaryum ist durch seine Anwendbarkeit zur Unterscheidung der Säuregruppen, wie auch insbesondere zur Entdeckung der Schwefelsäure, eines unserer wichtigsten Reagentien.

§. 33.

11. Salpetersaurer Baryt.

Bereitung. Man bringe eine verdünnte Lösung von Chlorbaryum zum Kochen und setze kohlensaures Ammoniak hinzu, so lange dadurch noch ein Niederschlag entsteht, bis also die Flüssigkeit alkalisch reagirt. Den erhaltenen kohlensauren Baryt wasche man sorgfältig aus und trage ihn in erwärmte verdünnte Salpetersäure, bis die Flüssigkeit nicht mehr sauer reagirt. Die filtrirte Lösung bringe man durch Abdampfen zur Krystallisation. Zum Gebrauche löse man einen Theil des Salzes in 10 Thln. Wasser. — Auf seine Reinheit wird der salpetersaure Baryt eben so wie das

Chlorbaryum geprüft. Durch salpetersaures Silber darf seine Lösung nicht getrübt werden.

Anwendung. Der salpetersaure Baryt wirkt wie das Chlorbaryum, er wird statt dessen angewendet, wenn man kein Chlormetall in eine Flüssigkeit bringen will.

§. 34.

12. Chlorcalcium.

Bereitung. Man bringe in verdünnte erwärmte Salzsäure Kreide bis zum Verschwinden der sauren Reaction, versetze die filtrirte Lösung mit etwas Ammoniak und lasse einige Stunden in gelinder Wärme stehen. Man filtrire alsdann, erhitze das Filtrat zum Kochen, setze kohlensaures Ammoniak zu, bis aller Kalk gefällt ist, und wasche den erhaltenen kohlensauren Kalk sorgfältig aus. — Man erwärme jetzt eine Mischung von 1 Thl. reiner Salzsäure mit 5 Thln. Wasser und bringe so lange von dem ausgewaschenen kohlensauren Kalk hinzu, bis die letzten Portionen nicht mehr gelöst werden und die Flüssigkeit nicht mehr sauer ist, koche alsdann einige Mal auf, filtrire die Lösung und bewahre sie zum Gebrauche auf.

Prüfung. Die Chlorcalciumlösung muss neutral sein, darf von Schwefelammonium nicht gefärbt oder gefällt werden und mit Kali oder Kalkhydrat vermischt kein Ammoniak entbinden.

Anwendung. Das Chlorcalcium wirkt wie das Chlorbaryum und findet auch eine analoge Anwendung. Wird nämlich dieses zur Gruppentheilung der unorganischen Säuren gebraucht, so dient jenes zur Gruppenunterscheidung bei den organischen Säuren, indem es einen Theil derselben nicht niederschlägt, einen andern aber fällt. Wie bei den Barytniederschlägen, so geben auch bei den unlöslichen Kalksalzen die Bedingungen, unter welchen sie niedergeschlagen werden, Mittel zu weiterer Unterscheidung der Säuren an die Hand.

§. 35.

13. Salpetersaures Silberoxyd.

Bereitung. Man löse kupferhaltiges Silber, z. B. ein Guldenstück oder dergl., in Salpetersäure, verdampfe die Lösung zur Trockne und schmelze den Rückstand in einer kleinen Porzellanschale über der Weingeistlampe bei gelinder Hitze, bis alles salpetersaure Kupferoxyd zersetzt ist, bis also die grüne Farbe des Salzes auch bei den an den oberen Wandungen des Schälchens sit-

zenden Theilen vollständig verschwunden ist und eine in Wasser gelöste Probe, mit überschüssigem Ammoniak vermischt, nicht mehr blau wird. Die erkaltete Masse koche man mit Wasser aus und bringe die filtrirte Lösung zur Krystallisation. Einen Theil der Krystalle löse man zum Gebrauche in 20 Thln. Wasser. Das beim Auflösen der geschmolzenen Masse zurückbleibende Kupferoxyd enthält stets etwas Silber. Um dieses nicht zu verlieren, löse man besagten Rückstand in Salpetersäure und fälle aus der Lösung das Silber als Chlorsilber.

Prüfung. Aus der Auflösung des salpetersauren Silbers muss durch verdünnte Salzsäure alles Feuerbeständige gefällt werden, so dass die von dem Chlorsilber abfiltrirte Flüssigkeit, auf einem Uhrglas verdampft, keinen Rückstand lässt und von Schwefelwasserstoff nicht gefällt oder gefärbt wird.

Anwendung. Das Silberoxyd bildet mit manchen Säuren lösliche, mit anderen unlösliche Verbindungen, daher das salpetersaure Silberoxyd, wie das Chlorbaryum zur Gruppenbestimmung der Säuren gebraucht werden kann.

Von den unlöslichen Silberverbindungen sind die meisten in verdünnter Salpetersäure löslich, das Chlor-, Jod-, Brom- und Cyan-Silber werden davon nicht aufgenommen. Es ist daher das salpetersaure Silberoxyd ein treffliches Mittel, die den zuletzt genannten Silberverbindungen entsprechenden Wasserstoffsäuren von allen anderen Säuren zu unterscheiden und zu trennen. — Da viele von den Silberniederschlägen eine eigenthümliche Farbe (chromsaures, arseniksaures Silberoxyd), oder ein eigenthümliches Verhalten zu anderen Reagentien oder beim Erhitzen (ameisensaures Silberoxyd) zeigen, so ist das salpetersaure Silberoxyd auch zur bestimmten Erkennung einzelner Säuren von großer Wichtigkeit.

§. 36.

14. Eisenchlorid.

Bereitung. Man erwärmt 2 Thle. Salzsäure, welche man zuvor mit 6 — 8 Thln. Wasser verdünnt, mit einem Ueberschuss kleiner rostfreier Nägel, bis sich kein Wasserstoffgas mehr entwickelt, giesst die Lösung ab, vermischt sie mit 1 Thle. Salzsäure, bringt in einem sehr geräumigen Gefäß zum Kochen und setzt während des Kochens vorsichtig und allmählig so lange Salpetersäure in kleinen Portionen zu, bis bei weiterm Hinzutröpfeln kein Aufbrausen von Stickoxydgas mehr entsteht, also keine rothen

Dämpfe von salpetriger Säure mehr sichtbar werden, und bis eine Probe Ferridcyankaliumlösung (§. 42.) nicht mehr blau färbt. Ein kleiner Ueberschuss von Salpetersäure bringt nicht den geringsten Nachtheil. Die erhaltene Lösung verdünne man mit Wasser, bringe sie zum Kochen, setze Ammoniak bis zur alkalischen Reaction zu und wasche den erhaltenen Niederschlag von Eisenoxydhydrat vollständig mit heißem Wasser aus. Alsdann erwärme man eine Mischung von $2\frac{1}{2}$ Thl. Salzsäure mit 10 Thln. Wasser und bringe so lange von dem noch feuchten Eisenoxydhydrat hinzu, bis die letzten Antheile auch bei längerem Erwärmen nicht mehr aufgelöst werden. Die filtrirte Lösung bewahre man zum Gebrauche auf.

Prüfung. Die Eisenchloridlösung darf keine überschüssige Säure enthalten, eine Probe derselben muss also beim Umrühren mit einem in Ammoniak getauchten Stäbchen einen beim Umschütteln nicht verschwindenden Niederschlag geben. Ferridcyankalium darf sie nicht blau färben.

Anwendung. Das Eisenchlorid dient zur weiteren Gruppentheilung der durch Chlorcalcium nicht fällbaren organischen Säuren, da es mit benzoësauren und bernsteinsauren Salzen Niederschläge erzeugt, essigsäure und ameisensaure Salze aber nicht fällt. Die neutralen Eisenoxydsalze dieser letzteren Säuren lösen sich mit intensiv rother Farbe in Wasser, es giebt daher das Eisenchlorid auch zu ihrer Erkennung ein brauchbares Mittel ab. — Ueber die Anwendung desselben zur Zerlegung phosphorsaurer alkalischer Erden, wozu es außerordentlich geeignet ist, vergl. unten §. 98. a. 7. Das Eisenchlorid dient endlich zur Entdeckung der Ferrocyanwasserstoffsäure, mit der es Berlinerblau erzeugt.

II. Besondere Reagentien auf nassem Wege.

a. Solche, welche vorzugsweise zur Erkennung oder Abscheidung einzelner Basen dienen.

§. 37.

1. Schwefelsaures Kali.

Bereitung. Man krystallisirt das käufliche um und löst einen Theil des reinen Salzes in 12 Thln. Wasser.

Anwendung. Das schwefelsaure Kali fällt aus Baryt- und

Strontian-Lösungen die in Wasser unlöslichen schwefelsauren Salze dieser Oxyde. Es dient daher zu ihrer Erkennung und Abscheidung. In ganz concentrirten Kalklösungen bringt es ebenfalls einen Niederschlag hervor, er entsteht jedoch meistens erst nach einiger Zeit, verdünnte Kalklösungen fällt es nicht. Das schwefelsaure Kali ist der eben so wirkenden verdünnten Schwefelsäure in vielen Fällen vorzuziehen, weil dadurch die Neutralität der Lösungen nicht gestört wird.

§. 38.

2. Phosphorsaures Natron.

Bereitung. Man erhitzt verdünnte käufliche rohe Phosphorsäure und setzt ihr kohlen saure Natronlösung zu, bis kein Aufbrausen mehr entsteht und die Flüssigkeit schwach alkalisch reagirt. Man filtrirt alsdann, verdampft zur Krystallisation, trocknet die Krystalle, zerreibt sie, mengt sie mit etwas Kohle und Mehl und glüht die Masse in einem hessischen Tiegel heftig. Die geglühte Masse kocht man mit Wasser aus, filtrirt und bringt zur Krystallisation. Ein Theil des Salzes wird zum Gebrauche in 10 Thln. Wasser gelöst. Beim Erwärmen der Lösung mit Ammoniak darf keine Trübung entstehen. Die Niederschläge, welche in der Lösung durch Baryt- und Silberlösung bewirkt werden, müssen bei Zusatz von verdünnter Salpetersäure vollkommen verschwinden.

Anwendung. Das phosphorsaure Natron fällt die alkalischen Erden und alle Metalloxyde durch doppelte Wahlverwandschaft. Es dient in dem Gang der Analyse, nach der Abscheidung der schweren Metalloxyde, zur Prüfung auf alkalische Erden im Allgemeinen, und nach der Abscheidung des Baryts, Strontians und Kalks bei gleichzeitigem Zusatz von Ammoniak, zur Erkennung der Magnesia, welche unter diesen Umständen als basisch phosphorsaure Ammoniak-Talkerde niedergeschlagen wird.

§. 39.

3. Neutrales chromsaures Kali.

Bereitung. Man löst das im Handel vorkommende saure chromsaure Kali in Wasser und setzt kohlen saures Kali bis zur schwach alkalischen Reaction zu. Die jetzt gelbe Flüssigkeit bringt man zur Krystallisation. Von den gut abgewaschenen Krystallen löst man einen Theil in 10 Thln. Wasser. Die Lösung muss neutral sein.

Anwendung. Das chromsaure Kali zersetzt durch doppelte Wahlverwandtschaft die meisten löslichen Metalloxydsalze. Die entstehenden Niederschläge der chromsauren Metalloxyde sind größtentheils sehr schwer löslich und zeigen oft so eigenthümliche Färbungen, dass die Metalle daran leicht zu erkennen sind. Wir bedienen uns des chromsauren Kali's hauptsächlich zur Prüfung auf Blei.

§. 40.

4. Cyankalium.

Bereitung. Man erhitzt käufliches eisenblausaures Kali unter Umrühren gelinde, bis sein Krystallwasser vollständig ausgetrieben ist, zerreibt es alsdann, mengt 8 Thle. des trocknen Pulvers mit 3 Thln. ganz trocknen kohlensauren Kali's, trägt die Mischung in einen rothglühenden Tiegel und erhält denselben wohlbedeckt im hellen Rothglühen, bis die Masse klar und ruhig fließt. Alsdann gießt man das geschmolzene Cyankalium in eine erwärmte Porzellanschale mit der Vorsicht aus, dass von dem am Boden des Tiegels befindlichen, in fein zertheilter Form ausgeschiedenen Eisen nichts mit in die Schale kommt. Das erhaltene Cyankalium ist zur Anwendung in der Analyse trefflich geeignet, obgleich es cyansaures Kali enthält. Es muss vollkommen weiß sein. Zum Gebrauche löst man einen Theil in 4 Thln. Wasser ohne Erwärmen auf.

Anwendung. Das (cyansaures Kali enthaltende) Cyankalium bewirkt in den Lösungen der meisten Metalloxydsalze in Wasser unlösliche Niederschläge von Cyanmetallen, Oxyden oder kohlensauren Salzen. Von diesen sind die ersteren in Cyankalium löslich. Sie lassen sich demnach von den Oxyden ect., die sich in Cyankalium nicht lösen, durch einen weitem Zusatz des Reagens scheiden. Von den Cyanmetallen werden einige, auch bei Anwesenheit freier Blausäure, stets als Cyankalium-Cyanmetalle gelöst, andere vereinigen sich mit Cyan zu neuen Radicalen und bleiben als solche mit Kalium verbunden in Lösung. Die gewöhnlichsten Verbindungen letzterer Art sind das Kobaltcyanidkalium, das Ferro- und Ferrid-Cyankalium. Sie unterscheiden sich von den Cyandoppelverbindungen der andern Art besonders dadurch, dass verdünnte Säuren daraus die Cyanmetalle nicht abscheiden. Es lassen sich also durch Cyankalium auch die solche Verbindungen eingehenden Metalle von allen denjenigen trennen, deren Cyanmetalle aus ihrer Lösung in Cyankalium von Säuren gefällt werden. Im Gang der Analyse findet dieses Reagens eine sehr wichtige Anwendung zur Scheidung des Nickels vom Kobalt.

§. 41.

5. Ferrocyankalium.

Bereitung. Das Blutlaugensalz kommt hinlänglich rein im Handel vor. Zum Gebrauche löst man einen Theil in 12 Thln. Wasser.

Anwendung. Das Ferrocyan bildet mit den meisten Metallen in Wasser unlösliche, oft sehr eigenthümlich gefärbte Verbindungen. Sie entstehen, wenn Ferrocyankalium mit löslichen Metalloxydsalzen, Chloriden u. s. w. zusammenkommt, indem das Kalium mit den Metallen die Stelle tauscht. Die charakteristischsten Färbungen zeigen das Ferrocyankupfer und das Eisenferrocyanid, daher das eisenblausaure Kali besonders als Reagens auf Kupfer und Eisenoxyd Anwendung findet.

§. 42.

6. Ferridcyankalium.

Bereitung. Man leitet in eine Auflösung von 1 Thl. Blutlaugensalz in 10 Thln. Wasser Chlorgas, bis eine Probe der Flüssigkeit zu Eisenchloridlösung gesetzt, dieselbe nicht mehr blau fällt oder färbt. Alsdann concentrirt man die Lösung durch Abdampfen, setzt etwas kohlsaures Kali zu bis zur schwach alkalischen Reaction, filtrirt und lässt erkalten. Von den erhaltenen prächtig rothen Krystallen löst man einen Thl. in 10 Thln. Wasser. Die Lösung darf, wie schon erwähnt, Eisenchloridlösung nicht blau färben oder fällen.

Anwendung. Das Ferridcyankalium zersetzt sich mit Metalloxydlösungen auf dieselbe Art, wie das Ferrocyankalium. Von den Ferridcyanmetallen ist das Ferridcyaneisen durch seine Farbe besonders charakterisirt, daher wir das Ferridcyankalium vorzugsweise als Reagens auf Eisenoxydul gebrauchen. — Zu dieser Prüfung kann es auch recht gut ex tempore dargestellt werden, indem man unter Vermeidung alles Erwärmens zu Ferrocyankaliumlösung so lange unter Umschütteln Salpetersäure tröpfelt, bis eine Probe der Mischung Eisenchloridlösung nicht mehr blau färbt.

§. 43.

7. Kieselfluorwasserstoffsäure.

Bereitung. Man übergießt ein Gemenge von einem Theil Sand und einem Theil Flussspathpulver mit 6 Thln. englischer Schwefelsäure in einem Glaskolben, dessen Oeffnung mit einem

Korke, in welchen das eine Ende einer zweischenkligen Röhre luftdicht eingepasst ist, verschlossen wird. Der andere Schenkel der Gasleitungsröhre gehe bis auf den Boden eines hohen Glasgefäßes mit flachem Boden. In dieses gieße man so viel Quecksilber, dass die Röhre einige Linien hineintaucht und darüber 4 Thle. Wasser. Die Entwicklung des Kieselfluorgases nimmt schon in der Kälte ihren Anfang, man befördert sie durch mäßige Erwärmung des Kolbens im Sandbad. Jede durch das Quecksilber aufsteigende Gasblase bewirkt im Wasser einen Niederschlag von Kieselsäurehydrat, indem sich von je 3 Aeq. Fluorkiesel immer 1 Aeq. mit 3 Aeq. Wasser in Kieselsäure, welche sich ausscheidet, und in Fluorwasserstoffsäure, die sich mit den 2 unzersetzten Aeq. Fluorkiesel zu Kieselfluorwasserstoffsäure verbindet, umsetzt. Durch das ausgeschiedene Kieselsäurehydrat wird die Flüssigkeit gallertartig, weshalb man eben die Röhre unter Quecksilber münden lassen muss, weil sie sich sonst alsbald verstopfen würde. Es bilden sich zuweilen, besonders gegen Ende der Operation, in der Gallerte förmliche Kanäle, durch welche das Gas unzersetzt entweicht. Man verhindere dies durch Umrühren. Wenn die Gasentwicklung aufgehört hat, giebt man den gelatinösen Brei auf ein leinenes Tuch, drückt die Flüssigkeit durch, filtrirt sie alsdann und hebt sie zum Gebrauche auf. Die Kieselfluorwasserstoffsäure darf, mit 2 Thln. Wasser vermischt, in der Lösung eines Strontiansalzes keinen Niederschlag hervorbringen.

Anwendung. Die Kieselfluorwasserstoffsäure setzt sich mit Basen um, es bildet sich Wasser und es entstehen Kieselfluormetalle. Von diesen sind manche unlöslich, andere löslich, letztere können also durch dieses Reagens von ersteren unterschieden werden. Im Gang der Analyse findet es nur zur Erkennung des Baryts Anwendung.

§. 44.

8. Oxalsäure.

Bereitung. Man übergieße in einer Porzellanschale 1 Thl. Stärke mit einer Mischung von 5 Thln. Salpetersäure von 1,42 spec. Gew. und 10 Thln. Wasser und erwärme so lange gelinde, bis keine salpetrige Säure mehr entweicht. Man filtrirt alsdann, bringt zur Krystallisation und reinigt die von der Mutterlauge getrennten Krystalle durch Umkrystallisiren. Die Kleesäure bewahrt man in Pulverform auf, da sich ihre Lösung bald zersetzt. Sie darf beim Kochen mit wenig Indigolösung dieselbe nicht entfärben.

Anwendung. Die Kleesäure bildet mit vielen Basen in Wasser unlösliche Salze. Sie kann daher zur Fällung dieser Basen benutzt werden. Von den in Wasser unlöslichen oxalsauren Salzen sind manche in einem Ueberschuss der Oxalsäure leicht, andere schwierig löslich. Durch dieses Verhalten unterscheiden sich also auch die gefällt werdenden Basen wieder von einander. — Da alle in Wasser unlöslichen kleesauren Salze in stärkeren Säuren (Salzsäure, Salpetersäure) löslich sind, so erfolgt in den meisten Fällen durch Kleesäure nur dann eine vollständige Fällung, wenn die frei werdende Säure durch ein Alkali gesättigt wird. — Im Gang der Analyse ist die Oxalsäure zur Erkennung und Abscheidung des Kalks von grosser Wichtigkeit.

§. 45.

9. Oxalsaures Ammoniak.

Bereitung. Man löst Oxalsäure in Wasser, setzt Ammoniak bis zur schwach alkalischen Reaction zu und bringt zur Krystallisation. Ein Theil des Salzes wird zum Gebrauche in 24 Thln. Wasser gelöst.

Anwendung. Das oxalsaure Ammoniak wendet man der Bequemlichkeit wegen statt Oxalsäure und Ammoniak an. Es hat vor der freien Säure den Vorzug, dass seine Lösung sich beim Aufbewahren nicht zersetzt.

§. 46.

10. Weinsteinsäure.

Die Weinsteinsäure kommt hinlänglich rein im Handel vor. Sie wird am besten als Pulver vorrätig gehalten, da ihre Lösung sich bei längerem Aufbewahren unter Schimmelbildung zersetzt.

Anwendung. Wird Weinsteinsäure einer Lösung von Eisen, Mangan, Chrom, Thonerde, Kobalt und von verschiedenen anderen Metallen zugesetzt und alsdann ein Alkali hinzugefügt, so werden die sonst fällbaren Oxyde der angeführten Metalle nicht niederschlagen, weil sich, durch Alkalien unzerlegbare, weinsaure Doppelsalze gebildet haben.

Es kann daher die Weinsäure zur Trennung der genannten Metalle von solchen, deren Fällung sie nicht verhindert, benutzt werden. — Die Weinsteinsäure bildet mit Kali, nicht aber mit Natron, ein schwer lösliches saures Salz. Sie ist daher eines der besten Mittel, das Kali vom Natron zu unterscheiden.

§. 47.

11. Saures weinsteinsaures Kali.

Der im Handel vorkommende gereinigte Weinstein ist zu der Anwendung, welche er in der qualitativen Analyse findet, hinlänglich rein. Man hält ihn als Pulver vorrätig.

Anwendung. Viele Metalle lösen sich in heißer Weinsteinlösung zu weinsauren Doppelsalzen auf, andere nicht. Die ersteren können daher durch dieses Reagens von den letzteren getrennt werden. — Im Gang der Analyse dient der Weinstein in gewissen Fällen zur Trennung des Antimonoxyds vom Zinnoxid.

§. 48.

12. Essigsaurer Baryt.

Bereitung. Man erhält den essigsauren Baryt wie den salpetersauren (§. 33), wenn man statt der Salpetersäure Essigsäure zur Auflösung des kohlensauren Baryts nimmt. Man kann ihn seiner seltenen Anwendung wegen in trockener Form aufbewahren.

Anwendung. Der essigsaure Baryt dient dazu, schwefelsaure Salze, namentlich schwefelsaure Magnesia und schwefelsaure Alkalien in essigsaure Salze zu verwandeln. Da diese durch Glühen in kohlensaure Verbindungen umgewandelt werden, und die kohlensaure Magnesia in Wasser unlöslich, die kohlensauren Alkalien aber darin löslich sind, so dient demnach der essigsaure Baryt mittelbar zur Trennung der Magnesia von den Alkalien.

§. 49.

13. Aetzbaryt.

Bereitung. Man kocht Schwefelbaryum (§. 32) mit 20 Theilen Wasser, setzt der heißen Lösung gepulverten Kupferhammerschlag im Ueberschuss zu und erhitzt damit, bis eine abfiltrirte Probe mit essigsaurem Blei keine schwarze Färbung mehr hervorbringt. Als dann filtrirt man heiß ab, setzt so viel Wasser zu, dass beim Erkalten nur ein kleiner Theil des aufgelösten Barythydrats herauskrystallisirt und bewahrt das gesättigte Barytwasser in gut verschlossenen Gläsern auf. Sollte es einen geringen Kupfergehalt haben, so setzt man vorsichtig etwas Schwefelwasserstoff zu und filtrirt von dem gefällten Schwefelkupfer ab.

Anwendung. Der kaustische Baryt wirkt dem Kali analog, das heißt er fällt, als starke Base, die in Wasser unlöslichen Metalloxyde und Erden aus ihren Salzlösungen. — Wir bedienen uns

desselben im Gang der Analyse nur zur Fällung der Magnesia. Zu diesem Behufe kann auch eine Lösung von Schwefelbaryum angewendet werden, insofern sie, wie dies in der Regel der Fall ist, kaustischen Baryt enthält. — Das Barytwasser kann ferner ebenso wie die schon abgehandelten Barytsalze zur Fällung der Säuren, welche mit Baryt unlösliche Verbindungen bilden, angewendet werden, wir gebrauchen jedoch dasselbe in dieser Beziehung meist nur zur Entdeckung der Kohlensäure.

§. 50.

14. Zinnchlorür.

Bereitung. Man pulvere englisches Zinn, indem man es in einem eisernen Löffel schmilzt, alsdann vom Feuer nimmt und mit einem Pistill bis zum Erstarren reibt. Dieses Pulver koche man in einem Kolben längere Zeit mit concentrirter Salzsäure (wobei stets Sorge zu tragen, dass Zinn im Ueberschuss vorhanden ist), verdünne die Lösung mit der vierfachen Menge Wasser, dem man etwas weniges Salzsäure zumischt, und filtrire. Die klare Lösung gießt man in ein Glas, in welchem sich kleine Stücke metallischen Zinns befinden, und bewahrt sie darin bei sorgfältigem Verschluss auf. Versäumt man diese Vorsichtsmafsregeln, so wird das Reagens bald unbrauchbar, indem das Chlorür in Chlorid übergeht.

Prüfung. Das Zinnchlorür muss mit Quecksilberchlorid sogleich eine weifse Fällung von Quecksilberchlorür hervorbringen, mit Schwefelwasserstoff einen dunkelbraunen Niederschlag geben und von Schwefelsäure nicht gefällt oder getrübt werden.

Anwendung. Die Neigung des Zinnchlorürs, Sauerstoff aufzunehmen, also Zinnoxid oder vielmehr, da sich das gebildete Oxyd mit der vorhandenen freien Salzsäure im Entstehungsmoment umsetzt, Zinnchlorid zu bilden, macht es zu einem der kräftigsten Reductionsmittel. Wir bedienen uns desselben im Gang der Analyse zur Entdeckung des Goldes, zu welchem Behuf es zuvor mit etwas Salpetersäure ohne Erwärmung zu mischen ist, und ferner zur Prüfung auf Quecksilber.

§. 51.

13. Goldchlorid.

Bereitung. Man übergieße in einem Kölbchen fein zerschnittenes Gold, welches sowohl mit Silber als mit Kupfer legirt sein darf, mit überschüssiger Salpeter-Salzsäure und erwärme gelinde,

bis sich Nichts mehr löst. War das Gold mit Kupfer legirt, was man an dem braunrothen Niederschlag erkennt, welchen Ferrocyankalium in einer mit Wasser verdünnten Probe der Lösung hervorbringt, so versetzt man die kupferhaltige Goldsolution mit Eisenvitriollösung im Ueberschuss. Das Gold wird reducirt und scheidet sich als feines braunschwarzes Pulver aus; man wäscht es in einem Kölbchen aus, löst neuerdings in Königswasser, dampft die Lösung im Wasserbade zur Trockne ab und löst den Rückstand in 30 Thln. Wasser. War das Gold mit Silber legirt, so bleibt dieses bei der Behandlung mit Königswasser als Chlorsilber zurück. Man verdampft alsdann gleich die erste Lösung zur Trockne und löst den Rückstand zum Gebrauche auf.

Anwendung. Das Goldchlorid hat eine grofse Neigung, sein Chlor abzugeben; es verwandelt daher leicht Chlorüre in Chlorid, Oxydule in Oxyde und Chloride u. s. w. Diese Oxydationen geben sich gewöhnlich durch eine Ausscheidung regulinischen Goldes in Form eines braunschwarzen Pulvers zu erkennen. Im Gang der Analyse dient das Goldchlorid nur zur Erkennung des Zinnoxiduls, in dessen Lösungen es eine pupurrothe Färbung oder Fällung erzeugt, siehe unten.

§. 53.

16. Platinchlorid.

Bereitung. Man übergiesse in einem enghalsigen Kolben durch Kochen mit Salpetersäure gereinigte Platinspäne mit concentrirter Salzsäure und etwas Salpetersäure, erwärme gelinde längere Zeit und setze immer von Zeit zu Zeit wieder etwas Salpetersäure zu, bis alles Platin gelöst ist. Die Lösung verdampfe man unter Zusatz von Salzsäure im Wasserbad zur Trockne und löse den Rückstand in 10 Thln. Wasser.

Anwendung. Das Platinchlorid bildet mit dem Chlorkalium und Chlorammonium, nicht aber mit dem Chlornatrium, sehr schwer lösliche Doppelsalze. Es dient daher zur Erkennung des Ammoniaks und des Kalis und ist für das letztere fast unser empfindlichstes Reagens.

§. 53.

17. Zink.

Man wähle ein gutes destillirtes Zink, welches vor Allem kein Arsen enthalten darf, auf welche Verunreinigung es nach der §. 24.

angegebenen Methode geprüft werden muss, schmelze es und giesse einen Theil in einem dünnen unterbrochenen Strahl in ein großes Gefäß mit Wasser, einen andern bringe man durch Ausgießen in mit Kreide ausgestrichene Holzrinnen in die Form kleiner Stängelchen.

Anwendung. Die große Verwandtschaft des Zinks zum Sauerstoff, so wie die des Zinkoxyds zu Säuren bewirkt, dass das Zink sehr viele Metalle, indem es ihnen Sauerstoff und Säure entzieht, regulinisch niederschlägt. Da die ausgeschiedenen Metalle verschiedene Farbe, Form u. s. w. haben, so kann das Zink sowohl zu ihrer Abscheidung, als auch zu ihrer Erkennung dienen. Wir gebrauchen es besonders zur Fällung des Antimons und Zinns. — Das Zink findet ferner zur Entwicklung des Wasserstoffgases häufige Anwendung.

§. 54.

18. Eisen.

Das Eisen reducirt, wie das Zink, viele Metalle und schlägt sie regulinisch nieder. Wir gebrauchen es besonders zur Entdeckung des Kupfers, welches sich darauf mit seiner eigenthümlichen Farbe niederschlägt. Zu dieser Prüfung sind alle blanken Eisenflächen, als Messerklingen, Nadeln, Drahtstückchen u. s. w. sehr geeignet.

§. 55.

19. Kupfer.

Wir wenden es einzig zur Reduktion des Quecksilbers an, welches sich darauf als weißer, beim Reiben silberglänzend werdender Ueberzug niederschlägt. Jede abgeschliffene, mit feinem Sand gescheuerte Kupfermünze, überhaupt jede blanken Kupferfläche lässt sich zu diesem Versuche brauchen.

b. Besondere Reagentien, welche vorzugsweise zur Erkennung oder Abscheidung der Säuren dienen.

§. 56.

1. Essigsaures Kali.

Bereitung. Man löst 1 Thl. reines kohlensaures Kali in 2 Thln. Wasser und sättigt die erwärmte Lösung genau mit Essigsäure.

Anwendung. Jedes Kalisalz kann zur Erzeugung eines Weinstein Niederschlages, also zur Entdeckung der Weinsteinsäure dienen. Das essigsaure Kali ist aber dazu besonders geeignet, da der abgeschiedene Weinstein in der frei werdenden Essigsäure nicht auflöslich ist. Da es nur selten in Anwendung kommt, löst man es am besten erst vor dem jedesmaligen Gebrauche.

§. 57.

2. Aetzkalk.

Man schüttele und digerire frisch bereitetes Kalkhydrat mit kaltem destillirtem Wasser einige Zeit, lasse sich absetzen und hebe die klar abgegossene Flüssigkeit in wohl verschlossenen Gläsern auf. Das Kalkwasser muss Georginenpapier stark grün färben und mit kohlsaurem Kali einen nicht zu geringen Niederschlag geben. Zeigt es diese Eigenschaften nicht mehr, was bald geschieht, wenn es dem Zutritt der Luft ausgesetzt war, so ist es unbrauchbar. — Außer Kalkwasser halte man auch Kalkhydrat vorrätig.

Anwendung. Kalk bildet mit manchen Säuren unlösliche, mit anderen lösliche Salze. Kalkwasser kann daher zur Unterscheidung dieser Säuren dienen, indem es die ersteren fällt, mit den letzteren aber keine Niederschläge hervorbringt. Von den fällbaren Säuren werden manche nur unter gewissen Bedingungen, z. B. beim Kochen (Citronensäure) niedergeschlagen, daher man dieselben durch Abänderung dieser Bedingungen auf eine leichte Weise auch von einander unterscheiden kann. Wir bedienen uns des Kalkwassers insbesondere zur Entdeckung der Kohlensäure, und zur Unterscheidung der Traubensäure, Weinsteinsäure und Citronensäure. Das Kalkhydrat dient wie das Aetzkali zum Freimachen des Ammoniaks und ist demselben in vielen Fällen vorzuziehen.

§. 58.

3. Schwefelsaurer Kalk.

Bereitung. Man versetze eine concentrirte Lösung von Chlorcalcium mit verdünnter Schwefelsäure, wasche den entstandenen Niederschlag gut aus, digerire und schüttele ihn längere Zeit mit Wasser, lasse absetzen und bewahre die klare Flüssigkeit zum Gebrauche auf.

Anwendung. Der schwefelsaure Kalk dient zur weiteren Unterscheidung der durch Chlorcalcium fällbaren Säuren, indem,

seiner Schwerlöslichkeit wegen, in seiner Lösung nur einige Säuren aus der angeführten Gruppe (Oxalsäure, Traubensäure) Niederschläge erzeugen. — Die Gypslösung dient ausserdem auch als Reagens auf Basen, nämlich zur Unterscheidung des Baryts, Strontians und Kalks. Den letztern nämlich kann sie natürlicherweise nicht fällen, zu Baryt- und Strontianlösungen aber zeigt sie dasselbe Verhalten wie eine sehr verdünnte Schwefelsäure, d. h. sie fällt den Baryt sogleich, den Strontian erst nach einiger Zeit.

§. 59.

4. Chlormagnesium.

Bereitung. Man erwärme eine Mischung von 1 Thl. Salzsäure mit $2\frac{1}{2}$ Thln. Wasser und trage so lange basisch kohlensaure Magnesia (Magnesia carbonica der Apotheken) hinein, bis die Flüssigkeit nicht mehr sauer reagirt. Die noch einmal aufgekochte Lösung filtrire man und bewahre sie zum Gebrauch auf. Statt des Chlormagnesiums kann in den meisten Fällen auch schwefelsaure Magnesia angewendet werden.

Anwendung. Das Chlormagnesium dient fast ausschliesslich zur Erkennung der Phosphorsäure, da es aus den wässrigen Lösungen ihrer Salze bei Gegenwart von Ammoniak ein fast unlösliches, in seinem Verhalten sehr charakteristisches Doppelsalz (basisch phosphorsaure Ammoniak-Magnesia) fällt. Das Chlormagnesium wird ausserdem zur Prüfung des Schwefelammoniums gebraucht s. §. 26.

§. 60.

5. Schwefelsaures Eisenoxydul.

Bereitung. Man erwärme eine überschüssige Menge rostfreier Nägel mit verdünnter Schwefelsäure, bis sich kein Wasserstoffgas mehr entwickelt, filtrire die Lösung, setze ihr einige Tropfen verdünnter Schwefelsäure zu und lasse erkalten. War die Lösung hinlänglich concentrirt, so erhält man sogleich Krystalle, war sie verdünnter, so muss sie durch Abdampfen eingeengt werden. Die Krystalle werden mit Wasser, welchem man ein Minimum Schwefelsäure zusetzt, abgewaschen, alsdann getrocknet und aufbewahrt.

Anwendung. Das schwefelsaure Eisenoxydul hat eine grosse Begierde in schwefelsaures Eisenoxyd überzugehen, also Sauerstoff aufzunehmen. Es wirkt daher als ein kräftiges Reductionsmittel. Wir bedienen uns desselben hauptsächlich zur Reduction der Sal-

petersäure, aus welcher es Stickstoffoxyd abscheidet, indem es ihr 3 Atome Sauerstoff entzieht. Da diese Zersetzung von dem Entstehen einer ganz eigenthümlichen, intensiv braunschwarz gefärbten Verbindung des Stickoxyds mit unzersetztem Eisenoxydulsalz begleitet wird, so ist diese Reaction zur Entdeckung der Salpetersäure eine besonders charakteristische und empfindliche. — Das schwefelsaure Eisenoxydul dient außerdem zur Entdeckung der Ferridcyanwasserstoffsäure, mit der es eine Art Berlinerblau erzeugt, und zur Ermittlung des Goldes, welches dadurch aus seinen Lösungen metallisch gefällt wird.

§. 61.

6. Eisenoxyduloxylösung.

Man hält dieses Reagens nicht vorrätig, sondern bereitet es beim Gebrauch durch Vermischen einer Eisenvitriollösung mit etwas Eisenchlorid. Es dient zur Entdeckung der Blausäure, welche damit, wenn sie zuvor an Alkalien gebunden worden, einen Niederschlag von Eisen-Ferrocyanid (Berlinerblau) hervorbringt.

§. 62.

7. Bleioxyd.

Es dient zur Entdeckung der freien Essigsäure, da es nur mit dieser Säure eine lösliche alkalisch reagirende Verbindung eingeht. Zu diesem Versuche ist fein geschlammte Bleiglätte hinlänglich geeignet. Vergl. §. 104. a.

§. 63.

8. Neutrales essigsaures Bleioxyd.

Die bessern Sorten des im Handel vorkommenden Bleizuckers sind genügend rein. Zum Gebrauche löse man einen Theil in 10 Thln. Wasser.

Anwendung. Das Bleioxyd bildet mit sehr vielen Säuren in Wasser unlösliche, zum Theil eigenthümlich gefärbte oder durch charakteristisches Verhalten ausgezeichnete Verbindungen. Es bewirkt daher das essigsaure Bleioxyd in den Lösungen dieser Säuren oder ihrer Salze Niederschläge und trägt zur Charakterisirung und Ausmittelung mehrerer derselben wesentlich bei. So ist namentlich das chromsaure Blei durch seine gelbe Farbe, das phosphorsaure Blei durch sein eigenthümliches Verhalten vor dem Löth-

rohr und das äpfelsaure Blei durch seine Leichtschmelzbarkeit ausgezeichnet.

§. 64.

9. Basisch essigsaures Bleioxyd (Bleiessig).

Bereitung. Man übergießt in einer Flasche 7 Theile fein geschlammte Bleiglätte und 6 Thle. Bleizucker mit 30 Thln. Wasser, und lässt dieselbe unter öfterem Umschütteln wohl verstopft so lange an einem mäßig warmen Ort stehen, bis der Bodensatz darin völlig weiß geworden ist. Nach dem Absetzen giesse man die klare Flüssigkeit ab und bewahre dieselbe in einem gut verschlossenen Glase auf. Ist der Bleiessig kupferhaltig, wird er also beim Vermischen mit Ammoniak blau, so ist er zum Gebrauche nicht geeignet. Man digerirt ihn in diesem Falle mit metallischem Blei, bis alles Kupfer niedergeschlagen ist.

Anwendung. Das basisch essigsaure Bleioxyd schlägt wie das neutrale die Säuren nieder, welche mit Bleioxyd unlösliche Verbindungen eingehen und zwar alle, welche in Essigsäure löslich sind, mit größerer Vollständigkeit als jenes. Man gebraucht es in der Analyse besonders zur Entdeckung des Schwefelwasserstoffs, für welchen es fast das empfindlichste Reagens ist. Es dient außerdem zum Abstumpfen freier Säuren, wenn kein Alkali ins Spiel kommen soll, z. B. um sehr saure salpetersaure Wismuthlösungen durch Wasser fällbar zu machen.

§. 65.

10. Kupferoxyd.

Bereitung. Man fügt zu reinem Kupferhammerschlag portionenweise reine Salpetersäure, bis die Masse die Consistenz eines dicken Breies angenommen hat, verdampft alsdann zur Trockne und setzt das erhaltene grüne Salz in einem bedeckten Tiegel so lange der Rothglühhitze aus, bis sich aus der Masse keine salpetrige Säure mehr entwickelt. Das zerriebene Oxyd bewahre man zum Gebrauche auf.

Anwendung. Das Kupferoxyd setzt sich beim Kochen mit alkalischen Auflösungen von Schwefelmetallen mit diesen um, es bilden sich Metalloxyde und Schwefelkupfer. Es stellt daher, besonders zur Umwandlung des Schwefelarsens in Arseniksäure ein sehr geeignetes Mittel dar.

§. 66.

11. Schwefelsaures Kupferoxyd.

Bereitung. Man reinige käuflichen Kupfervitriol durch wiederholtes UmkrySTALLISIREN.

Anwendung. Das schwefelsaure Kupferoxyd findet in der qualitativen Analyse zur Fällung der Jodwasserstoffsäure als Kupferjodür Anwendung. Zu diesem Behufe muss die Lösung von 1 Thle. Kupfervitriol mit $2\frac{1}{4}$ Thln. schwefelsaurem Eisenoxydul versetzt werden, sonst scheidet sich die Hälfte des Jods in freiem Zustande aus. Das Eisenoxydul geht dabei in Oxyd über, indem es das Kupferoxyd zu Oxydul reducirt. — Der Kupfervitriol ist ausserdem als ein zwar empfindliches, aber keineswegs sehr charakteristisches Reagens für arsenige und Arsenik-Säure im Gebrauch. Zu diesem Zwecke bereitet man sich am besten erst schwefelsaures Kupferoxyd-Ammoniak, indem man der Lösung des Kupfervitriols Ammoniak zusetzt, bis der entstandene Niederschlag eben wieder gelöst ist. — Der Kupfervitriol kann endlich zur Entdeckung der Ferrocyanwasserstoffsäure dienen.

§. 67.

12. Salpetersaures Quecksilberoxydul.

Bereitung. Man erwärmt in einem Kölbchen 9 Thle. Salpetersäure von 1,23 spec. Gew. mit 10 Thln. Quecksilber gelinde, bis sich keine rothen Dämpfe von salpetriger Säure mehr zeigen und kocht alsdann unter Ersetzung des verdampfenden Wassers die Lösung mit dem ungelösten metallischen Quecksilber längere Zeit, bis aus einer Probe durch überschüssige Kochsalzlösung alles Quecksilber als Chlorür gefällt wird, so dass in der davon abfiltrirten Flüssigkeit Zinnchlorür keine Fällung mehr hervorbringt. Man schüttelt alsdann die Lösung mit dem Quecksilber bis zum Erkalten, zerreibt die erhaltenen Krystalle, schüttelt sie mit 20 Thln. kaltem Wasser, dem etwas wenig Salpetersäure zugesetzt worden und bewahrt die nöthigenfalls filtrirte Lösung in einem Glase auf, dessen Boden mit Quecksilber bedeckt ist.

Anwendung. Das salpetersaure Quecksilberoxydul wirkt dem entsprechenden Silbersalze analog. Es schlägt erstens viele Säuren nieder, insbesondere die Wasserstoffsäuren, und es dient zweitens zur Erkennung mehrerer leicht oxydirbarer Körper, z. B. der Ameisensäure, da die Oxydation derselben auf Kosten des Sauerstoffs

des Quecksilberoxyduls von der sehr charakteristischen Ausscheidung metallischen Quecksilbers begleitet ist.

§. 68.

13. Quecksilberoxyd.

Man zerreibt das käufliche Quecksilberoxyd, nachdem man es, um das Stäuben zu verhüten, mit etwas Alkohol befeuchtet hat, zu einem möglichst feinen Pulver und bewahrt dieses zum Gebrauche auf. Das Quecksilberoxyd bietet, da es sich nur bei Gegenwart der Blausäure in einer alkalischen Flüssigkeit löst, zur Entdeckung dieser Säure ein sicheres Mittel (vergl. §. 100. d).

§. 69.

14. Quecksilberchlorid.

Es kommt im Handel hinlänglich rein vor. Zum Gebrauche löse man einen Theil in 16 Thln. Wasser.

Anwendung. Das Quecksilberchlorid bringt mit verschiedenen Säuren, z. B. mit der Jodwassertoffsäure, charakteristisch gefärbte Niederschläge hervor, ist aber nichtsdestoweniger zur Charakterisirung der Säuren eines der entbehrlicheren Reagentien. — Es wirkt außerdem als Oxydationsmittel und giebt uns die Anwesenheit leicht oxydirbarer Körper, z. B. des Zinnoxiduls, durch die Abscheidung von Quecksilberchlorür zu erkennen.

§. 70.

15. Salpetersaures Silberoxyd - Ammoniak.

Man hält dieses Reagens nicht vorrätbig, sondern bereitet es beim jedesmaligen Gebrauche, indem man zu salpetersaurer Silberoxydlösung so lange vorsichtig und tropfenweise Aetzammoniak setzt, bis der entstandene Niederschlag eben wieder gelöst ist. Es dient zur Erkennung der arsenigen und der Arsenik-Säure in Auflösungen, welche eine freie Säure enthalten.

§. 71.

16. Schweflige Säure.

Bereitung. Man erwärme in einem Kolben kleine Kohlenstückchen mit ihrem sechs- oder achtfachen Gewicht englischer Schwefelsäure und leite das sich entwickelnde Gas in abgekühltes Wasser bis keine schweflige Säure mehr absorhirt wird. Die erhaltene Lösung muss in wohl verschlossenen Gläsern aufbewahrt werden.

Anwendung. Die schweflige Säure hat ein großes Bestreben, durch Sauerstoffaufnahme in Schwefelsäure überzugehen. Sie ist daher eines unserer kräftigsten Reductionsmittel und scheidet aus Quecksilberlösungen das Quecksilber eben so gut ab, führt die Chromsäure eben so leicht in Chromoxyd über, wie das Zinnchlorür. Wir bedienen uns der schwefligen Säure hauptsächlich zur Ueberführung der Arseniksäure in arsenige Säure, um das Arsen alsdann schneller und vollständiger durch Schwefelwasserstoff fällen zu können (s. §. 93. e). Vor dem jedesmaligen Gebrauche überzeuge man sich durch den Geruch, ob das Reagens noch nicht zersetzt ist.

§. 72.

17. Chlor.

Bereitung. Man übergießt in einem Kölbchen 1 Thl. Brauneisenpulver mit 4 bis 5 Thln. roher Salzsäure, erwärmt gelinde und leitet das sich entwickelnde Chlorgas in ein Glas, welches etwa 30 bis 40 Thle. möglichst kaltes Wasser enthält. Das erhaltene Chlorwasser muss in einem wohl verschlossenen, gegen den Einfluss des Lichtes sorgfältig geschützten Glase aufbewahrt werden, da es sich ohne diese Vorsicht bald vollständig zersetzt, d. h. unter Sauerstoffentwicklung (von zersetztem Wasser herrührend) zu einer verdünnten Chlorwasserstoffsäure wird.

Anwendung. Das Chlor hat sowohl zu Metallen, als auch zu Wasserstoff größere Verwandtschaft als das Jod und Brom. Wir haben daher an dem Chlorwasser ein gutes Mittel, das Jod und Brom aus ihren Verbindungen auszutreiben. Da freies Chlor mit Brom Chlorbrom und mit Jod Chlorjod bildet und diese Verbindungen ein anderes Verhalten zeigen, als die ungebundenen Metalloide, so hat man sich in gewissen Fällen, z. B. bei der Prüfung auf Jod mit Stärkemehl (§. 100. c), vor einem Zusatz des Chlorwassers im Ueberschuss sehr zu hüten. — Das Chlor dient außerdem zur Zerstörung organischer Substanzen, indem es bei Gegenwart derselben vorhandenem Wasser seinen Wasserstoff entzieht, so dass der frei werdende Sauerstoff sich mit den Pflanzenstoffen verbinden und so eine Zersetzung derselben bewirken kann. Behufs dieser letztern Anwendung entwickelt man am zweckmässigsten das Chlor erst in der Flüssigkeit, welche die organischen Substanzen enthält, indem man ihr Salzsäure zusetzt, sie zum Kochen erhitzt und alsdann chlores Kalium hinzufügt. Es entsteht Chlorkalium und Wasser, chlorige Säure und Chlor werden frei.

§. 73.

18. Indigolösung.

Bereitung. Man erwärmt einen Theil gepulverten Indigo mit 7 Thln. rauchender Schwefelsäure. Die erhaltene Lösung verdünne man zum Gebrauche mit so viel Wasser, dass die Flüssigkeit eben noch deutlich blau erscheint.

Anwendung. Indigo wird beim Kochen mit Salpetersäure zersetzt, es bilden sich Oxydations-Producte von gelber Farbe. Er dient daher zur Entdeckung der Salpetersäure in freiem Zustande oder in ihren Salzen, in welchen letzteren jedoch die Salpetersäure durch Zusatz von Schwefelsäure erst frei gemacht werden muss.

§. 74.

19. Stärkekleister.

Man reibe gewöhnliche Stärke mit kaltem Wasser an und erhitze alsdann unter Umrühren zum Kochen. Der Kleister sei gleichförmig und so dünn, dass er fast fließt.

Anwendung. Stärke bildet beim Zusammenkommen mit freiem Jod eine eigenthümliche blauschwarze Verbindung, deren Farbe so intensiv ist, dass sie noch aufs deutlichste zu erkennen ist, auch wenn die Substanzen im höchst verdünnten Zustande mit einander in Berührung kommen. Es ist daher der Stärkekleister zur Entdeckung des freien Jods ein unübertreffliches Reagens. Weit weniger empfindlich ist er für Brom, da die feuergelbe Farbe des Bromamylums lange nicht so charakteristisch und intensiv ist, wie die des Jodstärkemehls.

B. Reagentien auf trockenem Wege.

I. Aufschliessungs- und Zersetzungsmittel.

§. 75.

1. Mischung von kohlensaurem Natron und kohlensaurem Kali.

Bereitung. Man reibt 10 Thle. zerfallenes kohlensaures Natron mit 13 Thln. trockenem kohlensaurem Kali zusammen und bewahrt das Gemenge in einem verschlossenen Gefäße auf.

Anwendung. Wird Kieselsäure oder eine kieselsaure Verbindung mit etwa 4 Thln., also mit einem Ueberschuss, von kohlen-

säurem Kali oder Natron geschmolzen, so bildet sich, indem Kohlensäure unter Aufbrausen entweicht, basisch kieselsaures Alkali, welches als eine in Wasser lösliche Verbindung von etwa ausgeschiedenen Metalloxyden getrennt werden kann und aus dem Salzsäure die Kieselsäure stets in ihrer löslichen Modification abscheidet. — Schmilzt man ein fixes kohlensaures Alkali mit schwefelsaurem Baryt, Strontian oder Kalk zusammen, so entstehen kohlensaure alkalische Erden und schwefelsaures Alkali, in welchen Verbindungen jetzt sowohl die Base als die Säure der früher unlöslichen Salze mit Leichtigkeit erkannt zu werden vermag. — Wir bedienen uns jedoch zum Aufschliessen der unlöslichen kieselsauren und schwefelsauren Verbindungen weder des kohlensauren Kalis, noch der Soda, sondern obengedachter Mischung beider, weil diese einen weit niederen Schmelzpunkt als ihre beiden Bestandtheile hat und so ein Aufschliessen der erwähnten Verbindungen über der Berzelius'schen Lampe leicht möglich macht. Das Aufschliessen mit den kohlensauren Alkalien wird, wenn keine leicht reducirbaren Metalloxyde zugegen sind, stets im Platintiegel vorgenommen.

§. 76.

2. Kohlensaurer Baryt.

Die Bereitung desselben ist schon oben §. 33. angegeben worden.

Anwendung. Glüht man kieselsaure Verbindungen mit etwa ihrem sechsfachen Gewichte kohlensauren Baryts bis zum Zusammensintern der Masse, so setzen sich jene mit dem Barytsalz eben so um, wie mit kohlensauren Alkalien, d. h. es bildet sich überbasisch kieselsaurer Baryt, welcher von Salzsäure mit Leichtigkeit zersetzt wird, die Kohlensäure entweicht und die Oxyde scheiden sich ab. Es ist jedoch auf diese Art weit schwieriger, eine vollständige Aufschliessung zu bewerkstelligen, als mit kohlensaurem Alkali, daher man sich des kohlensauren Baryts nur dann bedient, wenn man die kieselsauren Verbindungen auf Alkalien prüfen will. — Das Aufschliessen mit kohlensaurem Baryt geschieht im Platintiegel.

§. 77.

3. Salpetersaures Kali.

Bereitung. Man bringe Wasser zum Kochen und löse darin käuflichen Salpeter bis zur Sättigung. Alsdann verdünne man die

Lösung mit einer kleinen Menge Wasser, filtrire heiß in ein Becherglas, stelle dieses in kaltes Wasser und rühre die Lösung bis zum Erkalten. Das erhaltene Krystallpulver werfe man auf ein Filtrum und wasche es so lange mit kaltem Wasser, bis das Filtrat durch salpetersaures Silber nicht mehr getrübt wird. Alsdann trockne man es gut und bewahre es zum Gebrauche auf.

Prüfung. Eine Lösung des salpetersauren Kalis darf weder durch Silber-, noch durch Baryt-Lösung getrübt, noch durch kohlen-saures Kali gefällt werden.

Anwendung. Der Salpeter dient, indem er beim Erhitzen mit verbrennlichen Substanzen Sauerstoff an dieselben abgibt, als ein sehr kräftiges Oxydationsmittel. Wir bedienen uns desselben hauptsächlich zur Ueberführung mehrerer Schwefelmetalle, besonders des Schwefelzinns, Schwefelantimons und Schwefelarsens in Oxyde und Säuren. Ferner zur schnellen und vollständigen Verbrennung organischer Körper. Zur Erreichung des letztern Zweckes verdient das durch Sättigen von Salpetersäure mit kohlen-saurem Ammoniak zu erhaltende salpetersaure Ammoniak meistens den Vorzug.

II. Löthrohrreagentien.

§. 78.

1. Kohle.

Man kann zu Löthrohrversuchen jede vollständig durchgebrannte Holzkohle brauchen. Die Kohle des Fichten- oder Linden-Holzes ist jedoch andern Sorten bei Weitem vorzuziehen. Man wähle glatte Stücke aus, da die knorrigen beim Erhitzen spritzen und die Proben wegschleudern.

Anwendung. Die Kohle dient hauptsächlich als Unterlage bei Löthrohrproben (s. oben §. 12.). Folgende Eigenschaften sind es, welche sie in dieser Beziehung so werthvoll machen. Erstens ihre Unschmelzbarkeit. Zweitens ihr geringes Leitungsvermögen für Wärme, welches gestattet, dass eine Probe auf der Kohle stärker, als auf jeder andern Unterlage erhitzt werden kann. Drittens ihre Porosität, wodurch sie leicht schmelzbare Körper, z. B. Borax, Soda u. s. w., einsickern lässt, während unschmelzbare auf ihrer Oberfläche zurückbleiben. Viertens ihre Fähigkeit, oxydirte Körper zu reduciren, wodurch sie zur Reduction der Oxyde durch die innere Löthrohrflamme mitwirkt. — Die Kohle dient ferner zur

Reduction der arsenigen Säure und der Arseniksäure, indem sie denselben in der Glühhitze den Sauerstoff entzieht. Zu diesem Behuf wendet man die Kohle entweder in Form kleiner Splitter oder als Pulver an. Zuweilen muss man zur Ausscheidung des Arsens gleichzeitig ein kohlensaures Alkali anwenden, man bedient sich in solchen Fällen am besten einer Mischung von zerfallener Soda mit Kienruß, welches Gemenge in einem bedeckten Tiegel geglüht und in einem verstopften Gläschen aufbewahrt werden muss.

§. 79.

2. Kohlensaures Natron.

Bereitung. Man bringt ein inniges Gemenge von 1 Thl. krySTALLISIRTEM und 3 Thln. zerfallenem kohlensaurem Natron in einen abgesprengten Retortenhals, eine weite Glasröhre oder dergl., verschließt die eine Oeffnung mit einem durchbohrten Kork, die andere lässt man offen. In den Kork passt man eine Röhre ein, welche mit einer Gasentbindungsflasche in Verbindung steht, in der man, wenn der Apparat hergestellt ist, aus Kalkstein und Salzsäure Kohlensäure entwickelt. Man erhält auf diese Weise doppelt kohlensaures Natron. Die vollständige Sättigung des einfach kohlensauren Natrons mit Kohlensäure erkennt man daran, wenn die eingetretene Erwärmung des Gemenges abnimmt und ein vor die offene Mündung der Röhre gehaltener brennender Span sogleich gelöscht wird. Man bringt jetzt das Salz auf einen Trichter, wäscht es so lange mit kaltem Wasser, bis die ablaufende Flüssigkeit nach Uebersättigung mit Salpetersäure durch Chlorbaryum und salpetersaures Silber nicht mehr getrübt wird, trocknet dasselbe und glüht es in einem Platin-, Silber- oder Porzellan-Tiegel. Man erhält alsdann einfach kohlensaures Natron, indem 1 At. Kohlensäure ausgetrieben wird. Das kohlensaure Natron wird auf seine Reinheit wie das kohlensaure Kali geprüft. Schwefelammonium darf seine Lösung nicht verändern.

Anwendung. Die Soda dient uns erstens ihrer Schmelzbarkeit wegen zur Begünstigung der Reduction oxydirter Körper durch die innere Löthrohrflamme. Indem sie schmilzt, bringt sie die Oxyde mit der Kohlenunterlage in innigste Berührung und gestattet der Löthrohrflamme, mit allen Theilen der Probe zusammenzutreffen. Durch ihre Materie, durch Umsetzung ihrer Bestandtheile wirkt sie hierbei nicht mit. War die Probe sehr gering, so

befindet sich das reducirte Metall oft in den Poren der Kohle. Man gräbt alsdann die um das Grübchen befindlichen Theile derselben mit einem Messer heraus, zerreibt Alles in einem Mörserchen und schlämmt die Kohle von den Metalltheilen ab, welche alsdann, je nach ihrer Natur, als Pulver oder als ausgeplattete Flitterchen sichtbar werden.

In manchen Fällen, z. B. zur Reduction des Zinnoxys setzt man der Soda, um die Masse leichter schmelzbar zu machen, mit Vortheil etwas Borax zu. Die Soda wirkt zweitens als Auflösungsmittel. Zur Prüfung, ob Körper in Soda löslich sind, bedient man sich am liebsten des Platindrahts als Unterlage. Man macht zu diesem Ende die Probe mit etwas Soda und Wasser zu einem Teige, bringt diesen auf das Ohr des Platindrahts und erhitzt. Von den Basen lösen sich nur wenige in schmelzender Soda, die Säuren hingegen werden leicht gelöst. Die Kieselsäure unterscheidet sich von allen übrigen dadurch, dass das Glas, welches dieselbe mit Soda bildet, beim Erkalten klar bleibt, wenn nämlich die richtigen Verhältnisse beider Bestandtheile getroffen sind. — Die Soda dient ferner als Zersetzungs- und Aufschliessungsmittel, und zwar vorzüglich für unlösliche schwefelsaure Salze, mit welchen sie die Säure tauscht, wobei gleichzeitig eine Reduction des gebildeten schwefelsauren Natrons zu Schwefelnatrium stattfindet; für Schwefelarsen, mit dem sie sich beim Zusammenschmelzen zu Schwefelarsen-Schwefelnatrium und arsenig- oder arsensaurem Natron umsetzt und dasselbe also in eine Form bringt, in der es durch Wasserstoff reducirbar ist. — Zur Entdeckung des Mangans ist endlich die Soda das empfindlichste Reagens auf trockenem Wege, indem sie, mit einer Mangan enthaltenden Substanz in der äußeren Flamme zusammengeschmolzen, in Folge der Entstehung mangansauren Natrons eine grüne unklare Perle bildet.

§. 80.

3. Cyankalium.

Seine Bereitung siehe oben §. 40.

Anwendung. Das Cyankalium ist auf trockenem Wege ein so starkes Reductionsmittel, dass es in seiner Wirkung fast alle übrigen übertrifft, und zwar scheidet es nicht nur aus den meisten Sauerstoffverbindungen, sondern auch aus Schwefelverbindungen die Radikale ab, indem sich im erstern Falle

durch Sauerstoffaufnahme cyansaures Kali, im letztern Schwefelcyankalium bildet. Es lassen sich durch dieses Reagens aus Körpern, wie antimonige Säure, Schwefelantimon, Eisenoxyd etc., auf die leichteste Weise (gewöhnlich schon im Porzellantiegelchen über der Weingeistlampe) regulinische Metalle darstellen. Ihre Abscheidung wird durch die Leichtflüssigkeit des Cyankaliums sehr begünstigt. In der Analyse ist es uns von ganz besonderer Wichtigkeit zur Reduction arsenigsaurer und arseniksaurer Salze, besonders einiger, welche schwere Metalle zur Base haben und deren Reduction mit den gewöhnlichen Desoxydationsmitteln nur schwierig gelingt. — Da das Cyankalium in dieser Beziehung als Reagens noch nicht allgemein bekannt ist, so mache ich auf seine ausgezeichnete Brauchbarkeit zur Arsenreduction besonders aufmerksam. Man wählt bei Versuchen in größerem Maßstabe Röhrchen, welche unten rund geblasen sind, schüttet das zu reducirende Salz, beispielshalber arseniksaures Silberoxyd, hinein, wirft ein Stückchen Cyankalium darüber, entfernt durch gelindes Erwärmen von unten nach oben erst alle Feuchtigkeit aus dem Röhrchen, erhitzt alsdann das Cyankalium zum Schmelzen und lässt es auf die Probe einwirken. Die Desoxydation erfolgt lebhaft und unter Feuererscheinung, daher man von aussen jetzt nicht viel Wärme zuzuführen braucht. Bis zu diesem Zeitpunkte zeigt sich gewöhnlich noch kein Arsenanflug, erhitzt man aber jetzt die schmelzende Masse etwas stärker, so sublimirt das Arsen nach einiger Zeit vollständig, und da die Masse weder spritzt, noch die Röhre beim Einfüllen verunreinigt werden kann, so erhält man Spiegel von ausgezeichneter Schönheit. Um ganz kleine Mengen einer Arsenikverbindung zu reduciren, wendet man eine völlig trockene Mischung von gleichen Theilen Soda und Cyankalium an und überschüttet die Probe, welche in ein unten zu einer kleinen Kugel aufgeblasenes Röhrchen gebracht wird, mit etwa der 6fachen Quantität derselben. — Auch aus Schwefelarsen lässt sich durch Zusammenschmelzen mit Cyankalium der Arsengehalt vollständig sublimiren. Mehrere arsenigsaure und arseniksaure Metallsalze werden beim Zusammenschmelzen mit Cyankalium in der Art reducirt, dass sich feuerbeständige Arsenikmetalle bilden (z. B. arseniksaures Eisenoxyd). Man erhält aus diesen keine Arsenspiegel, was wohl zu beachten. — Als Löthrohrreagens ist das Cyankalium ebenfalls höchst brauchbar, seine Wirkung ist außerordentlich, Körper wie Zinnoxid, Schwefelzinn u. s. w., welche, um mit Soda reducirt

zu werden, schon einer guten Flamme bedürfen, reduciren sich mit Cyankalium mit größter Leichtigkeit. Man wendet bei Löthrohrversuchen immer das angeführte Gemenge von Soda mit Cyankalium an, da das Cyankalium allein zu leicht schmilzt. Dieses Gemenge hat außer dem Vorzug einer kräftigeren Wirkung vor der Soda noch den voraus, dass es sich äußerst leicht in die Kohle zieht, so dass die Metallkügelchen in größter Reinheit sichtbar werden.

§. 81.

4. Doppelt borsaures Natron (Borax).

Man prüfe käuflichen Borax, ob seine Lösung durch kohlen-saures Kali gefällt wird, oder ob in derselben nach Zusatz von Salpetersäure durch Baryt- und Silberlösung Niederschläge entstehen. Bewirken die angegebenen Reagentien keine Veränderung, so ist der Borax rein, entsteht durch eines oder das andere eine Trübung oder Fällung, so muss er umkrystallisirt werden. Den reinen krystallisirten Borax erhitze man in einem Platintiegel gelinde, bis er sich nicht mehr weiter aufbläht, zerreibe denselben und hebe ihn zum Gebrauche auf.

Anwendung. Die Borsäure zeigt, wenn sie schmelzend mit Oxyden in Berührung kommt, eine große Verwandtschaft zu denselben. Sie verbindet sich daher erstens direct mit Oxyden, zweitens treibt sie minder starke Säuren aus ihren Salzen aus und drittens disponirt sie Metalle, Schwefel- und Haloidverbindungen bei Mitwirkung der äußern Löthrohrflamme zur Oxydation, um sich mit den Oxyden verbinden zu können. — Die gebildeten borsauren Oxyde schmelzen meistens schon an und für sich, sie schmelzen aber weit leichter mit borsaurem Natron zusammen, indem dasselbe entweder nur als Flussmittel oder durch Bildung von Doppelsalzen wirkt. — Im sauren borsauren Natron haben wir erstlich freie Borsäure, zweitens borsaures Natron, wir haben demnach darin beide Bedingungen vereinigt, wodurch, wie angeführt, Oxyde, Sulphurete, Metalle u. s. w. zur Auflösung und Schmelzung gebracht werden, und es ist daher der Borax für uns als Löthrohrreagens von größter Wichtigkeit. Als Unterlage wählt man bei seinem Gebrauche meistens Platindraht, macht zu dem Ende das Oehr desselben glühend, taucht es in das Boraxpulver und bringt in die äußere Flamme, wodurch man eine farblose Perle erhält.

An diese befestigt man nun, indem man sie noch heiß, oder indem man sie befeuchtet mit der Probe in Berührung bringt, ein wenig derselben, setzt neuerdings erst der Flamme der Weingeistlampe, dann der Löthrohrflamme aus und beobachtet die Erscheinungen. Folgende Punkte sind dabei besonders ins Auge zu fassen. Erstens, ob sich der Körper zur klaren Probe löst, oder nicht, und ob eine klare Probe beim Erkalten ihre Durchsichtigkeit behält oder nicht. Zweitens, ob eine solche Probe eine bestimmte Farbe zeigt, was in vielen Fällen, z. B. beim Kobalt zur augenblicklichen, sicheren Erkennung führt, und drittens, ob die Perlen in äußerer und innerer Flamme gleiches oder verschiedenes Verhalten zeigen. Erscheinungen letzterer Art sind von dem Uebergang höherer Oxydationsstufen in niederere oder auch in Metall abhängig und für einzelne Körper besonders bezeichnend.

§. 82.

5. Phosphorsaures Natron-Ammoniak (Phosphorsalz).

Bereitung. Man löst 6 Thle. phosphorsaures Natron und 1 Thl. reinen Salmiak in 2 Thln. heißem Wasser und lässt erkalten. Die Krystalle des Doppelsalzes, welche man dadurch erhält, reinigt man durch Umkrystallisiren von dem ihnen anhängenden Chlornatrium. Man trocknet sie alsdann und bewahrt sie zerrieben auf.

Anwendung. Wird phosphorsaures Natron-Ammoniak erhitzt, so entweicht mit dem Krystallwasser das Ammoniak. Es bleibt also alsdann eine Verbindung, welche in Bezug auf Zusammensetzung (freie Säure und leichtschmelzbares Salz) dem Borax sehr nahe steht. Die Wirkung des Phosphorsalzes ist daher der des sauren borsauren Natrons ganz analog. Da jedoch die Erfahrung lehrt, dass die Gläser, welche es mit vielen Körpern bildet, schöner und deutlicher gefärbt sind, als die des Boraxes, so wird es diesem in vielen Fällen als Auflösungs- und Flussmittel vorgezogen. — Bei Anwendung des Phosphorsalzes bedient man sich ebenfalls des Platindrahtes als Unterlage, wobei zu berücksichtigen, dass man das Ohr desselben klein und schmal machen muss, widrigenfalls die Perle nicht daran haftet. Man verfährt im Uebrigen, wie beim Borax angegeben ist.

§. 83.

Salpetersaures Kobaltoxydul.

Bereitung. Man trägt ein inniges Gemenge von 2 Thln. sehr fein gepulvertem Glanzkobalt, 4 Thln. Salpeter, 1 Thl. zerfallener Soda und 1 Thl. trockenem kohlensaurem Kali portionenweise in einen rothglühenden Schmelztiegel und erhitzt nach dem Eintragen noch eine Zeit lang möglichst stark, bis die Masse, wenn auch nicht vollständig geschmolzen, doch stark zusammengesintert ist. Nach dem Erkalten pulvert man den Inhalt, kocht mit Wasser, wäscht das unreine Kobaltoxyd vollständig aus, digerirt und erhitzt es mit Salzsäure bis zur Lösung. Dieselbe erscheint dunkelgrün und ist gewöhnlich von ausgeschiedener Kieselsäure gallertartig. Man verdampft sie zur Trockne, kocht den Rückstand mit Wasser aus, filtrirt und setzt zu dem Filtrat, während man es im Kochen erhält, kohlensaures Ammoniak, bis die Flüssigkeit nicht mehr sauer reagirt. Die filtrirte Lösung fällt man mit kohlensaurem Kali, wäscht aus, löst den Niederschlag in Salpetersäure, verdampft bei gelinder Wärme zur Trockne und löst zum Gebrauche einen Theil des Rückstandes in 10 Thln. Wasser.

Anwendung. Das Kobaltoxydul geht beim Glühen mit einigen unschmelzbaren Körpern eigenthümlich gefärbte Verbindungen ein und kann daher zu ihrer Erkennung dienen. Um die Prüfungen vorzunehmen, glüht man die gepulverte Probe auf der Kohle, bringt alsdann ein möglichst kleines Tröpfchen Kobaltlösung darauf und glüht wiederum. Zinkoxyd wird dabei intensiv grün, Thonerde blau, Magnesia schwach röthlich gefärbt. Die Färbung, welche die letztere erleidet, ist so wenig intensiv, dass durch diese Reaction Anfänger sehr leicht irre geführt werden. Kieselerde wird, wenn man sie, mit Kobaltlösung befeuchtet, glüht, ebenfalls etwas blau, worauf bei Prüfungen auf Thonerde Rücksicht zu nehmen ist. Die blaue Verbindung der letzteren ist jedoch weit schöner und intensiver gefärbt, als die der Kieselerde.

Dritter Abschnitt.

Verhalten der Körper zu Reagentien.

§. 84.

Die qualitative Analyse beruht, wie oben erwähnt worden, im Allgemeinen darauf, dass man Versuche macht, die unbekannten Bestandtheile eines Körpers in neue, ihrem Verhalten und ihren Eigenschaften nach bekannte Formen überzuführen, um aus diesen alsdann auf die Bestandtheile schliessen zu können. — Mit solchen Versuchen verhält es sich wie überhaupt mit allen Fragen. Sie sind um so besser, je gewisser sie zu einem bestimmten Resultate, gleichgültig, ob dasselbe positiver oder negativer Natur ist, führen müssen. Wie uns aber eine Frage nicht klüger macht, wenn wir die Sprache, in der uns die Gegenrede wird, nicht verstehen, so kann uns auch ein Versuch nichts nützen, wenn wir die Ausdrucksweise nicht kennen, in welcher die Beantwortung erfolgt, wenn wir also nicht wissen, welcher Schluss daraus zu ziehen ist, im Falle ein Reagens einen Körper unverändert lässt, oder im Falle es in Folge einer Form- oder Zustands-Aenderung des Körpers irgend eine Erscheinung hervorruft.

Bevor daher zur Analyse selbst geschritten werden kann, ist es unerlässliche Bedingung, dass man die Formen und Verbindungen der Körper, welche dann als bekannt angenommen werden sollen, auch wirklich völlig kenne. Eine solche völlige Bekanntschaft beruht aber erstens auf einem Wissen und Verstehen der Bedingungen, die zum Entstehen der neuen Verbindungen, überhaupt zum Eintreten der verschiedenen Reactionen nothwendig sind, und zweitens auf einer sinnlichen Einprägung der Farbe, Form, überhaupt der physikalischen Eigenschaften, welche die neuen Verbindungen charakterisiren. Es ist daher dieser Abschnitt nicht bloß durchzustudiren, sondern vor Allem auch durchzuexperimentiren.

Um das Verhalten der Körper zu Reagentien kennen zu lernen, werden gewöhnlich die Körper einzeln nach einander vorgenommen und ihre charakteristischen Reactionen angegeben. Zweckmäßiger für den Anfänger dürfte aber die folgende Darstellung erscheinen, welche diejenigen Körper, die in vieler Beziehung Ana-

logieen zeigen, in Gruppen zusammenfasst und so durch ein Gegenüberstellen der Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten die letzteren so viel wie möglich ins Licht setzt.

A. Verhalten der Metalloxyde.

§. 85.

Erste Gruppe.

Kali, Natron, Ammoniak.

Eigenschaften der Gruppe. Die Alkalien sind im reinen (kautischen) Zustande, als Schwefelverbindungen und als kohlen-saure Salze in Wasser leicht löslich. Es schlagen sich daher dieselben weder im reinen, noch im kohlen-sauren Zustande gegenseitig nieder, noch werden sie durch Schwefelwasserstoff unter irgend einer Bedingung gefällt. — Die Lösungen der reinen Alkalien sowohl, als die ihrer Schwefelverbindungen und kohlen-sauren Salze bläuen geröthetes Lackmuspapier und bräunen Curcumapapier im höchsten Grade.

Besondere Reactionen.

a. K a l i.

1) Die Kalisalze sind bei der Hitze einer Weingeistlampe nicht flüchtig. Sie lösen sich fast alle leicht im Wasser. Die Lösungen sind farblos, wenn die Säure nicht gefärbt ist. Die neutralen Kalisalze mit starken Säuren verändern Pflanzenfarben nicht. Kohlen-saures Kali zerfließt an der Luft.

2) *Platinchlorid* erzeugt in den neutralen und sauren Lösungen der Kalisalze einen gelben, krystallinischen, schweren Niederschlag (Kaliumplatinchlorid), und zwar in concentrirten Lösungen sogleich, in verdünnten nach einiger, oft erst nach längerer Zeit. Anwesenheit freier Salzsäure begünstigt seine Bildung. In Wasser ist er schwer löslich, in Alkohol unlöslich. Es zeigt daher das Platinchlorid Kalisalze mit ganz besonderer Empfindlichkeit an, wenn dieselben in Weingeist gelöst sind. Man hüte sich vor der Verwechselung des Kaliumplatinchlorids mit Ammoniumplatinchlorid.

3) *Weinsteinsäure* erzeugt in neutralen oder alkalischen Auflösungen der Kalisalze (in welch' letzterm Falle das Reagens bis zur stark sauren Reaction zuzusetzen ist) einen weissen, sich schnell zu Boden setzenden, körnig krystallinischen Niederschlag

von saurem weinsteinsaurem Kali, und zwar in concentrirten Lösungen sogleich, in verdünnten oft erst nach längerer Zeit. Heftiges Umschütteln der Flüssigkeit befördert das Entstehen des Niederschlags bedeutend, freie Alkalien und freie Mineral-säuren lösen denselben auf, in kaltem Wasser ist er schwer löslich, ziemlich leicht löslich in heissem.

4) Werden Kalisalze mittelst eines Platindrahts in die Spitze der innern *Löthrohrflamme* gehalten, so färbt sich die äussere Flamme, in Folge einer Reduction und Wiederoxydation des gebildeten Kaliums violett. Bei phosphorsaurem und borsaurem Kali ist die Reaction kaum bemerkbar. Gegenwart von Natron verdeckt sie gänzlich.

5) Erhitzt man ein Kalisalz mit wenig Wasser, setzt *Alkohol* zu und zündet diesen an, so erscheint die Flamme violett. Anwesenheit von Natron lässt auch diese Reaction nicht bemerken.

b. N a t r o n.

1) Die Natronsalze zeigen dasselbe allgemeine Verhalten, wie die Kalisalze. Kohlensaures Natron verwittert an der Luft.

2) Natronsalze auf einem Platindraht der innern *Löthrohrflamme* ausgesetzt, färben die äussere in Folge einer Reduction und einer Wiederoxydation des entstandenen Natriums intensiv gelb. Diese Reaction ist sichtbar, wenn dem Natron auch eine grosse Menge Kali beigemischt ist.

3) Behandelt man Natronsalze wie bei Kali sub. 5. angeführt worden, so färbt sich die *Alkoholflamme* stark gelb. Auch diese Reaction wird durch anwesendes Kalisalz nicht verdeckt.

4) *Platinchlorid* erzeugt in Natronlösungen keinen Niederschlag, *Weinsteinsäure* nur dann, wenn sie höchst concentrirt sind. Das saure weinsteinsaure Natron, welches in solchem Falle herauskrystallisirt, erscheint immer in Form kleiner Nadeln und Säulen und nicht, wie das Kalisalz, in Gestalt eines körnig krystallinischen Niederschlages.

c. A m m o n i a k.

Alle Ammoniaksalze sind in der Hitze flüchtig und zwar entweder unter Zersetzung oder unzerlegt. Die meisten sind in Wasser leicht löslich. Die Lösungen sind farblos. Die neutralen Verbindungen des Ammoniaks mit starken Säuren verändern Pflanzenfarben nicht.

2) Werden Ammoniaksalze mit *Kalkhydrat* am besten unter

Zusatz einiger Tropfen Wasser zusammengerieben, oder werden dieselben in fester Form oder gelöst mit *Kalilauge* erwärmt, so wird das Ammoniak gasförmig frei und giebt sich erstens durch seinen eigenthümlichen Geruch, zweitens durch seine Reaction auf feuchte Reagenspapiere, und drittens dadurch zu erkennen, dass es die Bildung weißer Nebel veranlasst, wenn mit Salzsäure, Salpetersäure, Essigsäure, überhaupt mit flüchtigen Säuren befeuchtete Gegenstände (Glasstäbchen) damit in Berührung kommen. Diese Nebel sind durch die beim Zusammentreffen der Gase in der Luft entstehenden festen Salze bedingt. Salzsäure giebt dabei die empfindlichste Reaction ab, Essigsäure aber gestattet weniger leicht eine Täuschung.

3) *Platinchlorid* verhält sich gegen Ammoniaksalze wie gegen Kalisalze, der entstehende gelbe Niederschlag von Ammonium-Platinchlorid (Platinsalmiak) hat eine etwas hellere Farbe, als das Kaliumplatinchlorid.

4) *Weinsteinsäure* bringt in Ammoniaksalzlösungen einen Niederschlag von saurem weinsteinsaurem Ammoniak hervor, welcher unter denselben Umständen wie die entsprechende Kaliverbindung entsteht und nur etwas wenig leichter löslich ist, als diese.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Kali- und Natron-Salze sind in gewöhnlicher Glühhitze nicht flüchtig, Ammoniaksalze verflüchtigen sich leicht. Es können daher diese durch Glühen leicht von jenen getrennt werden. Die sicherste Erkennung des Ammoniaks beruht auf seiner Austreibung durch Kali oder Kalk. — Kalisalze können nur erkannt werden, wenn die Ammoniaksalze entfernt sind, weil beide zu Platinchlorid und Weinsteinsäure gleiches oder ähnliches Verhalten zeigen. Ist das Ammoniak entfernt, so ist das Kali durch die beiden genannten Reagentien bestimmt charakterisirt. Das Natron ist positiv nur an der Krystallform und Beschaffenheit einiger seiner Salze und an der Färbung, welche dieselben der Löthrohr- und Weingeist-Flamme mittheilen, zu erkennen.

§. 86.

Zweite Gruppe.

Baryt, Strontian, Kalk, Magnesia.

Eigenschaften der Gruppe. Die alkalischen Erden sind im kautischen Zustande und als Schwefelverbindungen in Wasser löslich,

(die Magnesia freilich sehr schwer löslich). Diese Lösungen zeigen alkalische Reactionen. Die neutralen kohlensauren und phosphorsauren Verbindungen der alkalischen Erden sind in Wasser unlöslich. — Es werden daher die Lösungen der alkalisch erdigen Salze durch Schwefelwasserstoff unter keiner Bedingung gefällt, kohlensaure und phosphorsaure Alkalien aber schlagen sie nieder. Dieses Verhalten unterscheidet die Oxyde der zweiten Gruppe von denen der ersten. — Die Salze der alkalischen Erden sind nicht flüchtig, farblos, theils löslich, theils unlöslich.

Besondere Reactionen.

a. B a r y t.

1) *Ammoniak* bewirkt in den Lösungen der Barytsalze keine Fällung, *Kali* nur dann, wenn dieselben concentrirt sind. Wasser löst den entstandenen voluminösen Niederschlag von Baryterdehydrat wieder auf.

2) *Kohlensaure Alkalien* fällen aus Barytlösungen kohlensauren Baryt in Gestalt eines weissen Niederschlags. Bei der Anwendung von kohlensaurem Ammoniak, oder wenn die Flüssigkeit sauer war, tritt erst beim Kochen vollständige Fällung ein. Die Anwesenheit von Ammoniaksalzen hat auf die Fällung keinen hindernden Einfluss.

3) *Schwefelsäure* und alle löslichen *schwefelsauren Salze* bewirken auch in den verdünntesten Barytlösungen sogleich einen feinen weissen Niederschlag (*schwefelsauren Baryt*), der in Säuren und Alkalien unlöslich ist.

4) *Kieselfluorwasserstoffsäure* fällt aus Barytlösungen *Kieselfluorbarium* in Gestalt eines farblosen, krystallinischen, schnell zu Boden sinkenden Niederschlags. In verdünnten Auflösungen entsteht er erst nach einiger Zeit, Salzsäure und Salpetersäure lösen ihn kaum merklich auf.

5) *Phosphorsaures Natron* bewirkt in neutralen oder alkalischen Lösungen einen weissen, in freien Säuren löslichen Niederschlag von phosphorsaurem Baryt. Zusatz von Ammoniak vermehrt weder die Menge des Niederschlags, noch befördert es sein Entstehen.

6) *Oxalsäure* bewirkt nur in concentrirten Lösungen einen weissen, in Säuren löslichen Niederschlag von oxalsaurem Baryt. Wird aber Ammoniak zugesetzt, so ist die Reaction weit

empfindlicher und es entsteht alsdann nur in sehr verdünnten Lösungen kein Niederschlag.

7) Barytsalze ertheilen mit verdünntem *Weingeist* erhitzt der Flamme desselben eine wenig charakteristische gelbliche Farbe.

b. S t r o n t i a n.

Die Strontiansalze zeigen zu *Ammoniak* und *Kali*, wie auch zu den *kohlensauren Alkalien* und dem *phosphorsauren Natron* völlig dasselbe Verhalten, wie die Barytsalze.

2) *Schwefelsäure* und *schwefelsaure Salze* fallen aus Strontianlösungen *schwefelsauren Strontian* in Gestalt eines weissen, in Säuren und Alkalien unlöslichen Pulvers. Der schwefelsaure Strontian ist in Wasser weit löslicher als die entsprechende Barytverbindung, daher entsteht der Niederschlag in verdünnteren Lösungen meist erst nach einiger Zeit, er entsteht jedenfalls (auch in concentrirten Lösungen) erst nach einiger Zeit, wenn man zur Fällung *Gypssolution* anwendet.

3) *Kieselfluorwasserstoffsäure* bewirkt selbst in concentrirten Strontianlösungen keinen Niederschlag.

4) *Oxalsäure* schlägt auch aus ziemlich verdünnten Lösungen nach einiger Zeit *oxalsauren Strontian* als weisses Pulver nieder. Zusatz von *Ammoniak* befördert die Abscheidung und vermehrt die Menge des Niederschlags bedeutend.

5) Werden in Wasser oder Alkohol lösliche Strontiansalze mit wässrigem *Weingeist* erhitzt und dieser angezündet, so ertheilen sie der Flamme, besonders beim Umrühren, eine sehr intensive carminrothe Färbung. Man verwechsle die Farbe nicht mit der, welche der Weingeistflamme durch Kalksalze mitgetheilt wird.

c. K a l k.

1) *Ammoniak*, *Kali*, *kohlensaure Alkalien* und *phosphorsaures Natron* zeigen gegen Kalksalze dasselbe Verhalten, wie gegen Barytsalze.

2) *Schwefelsäure* und *schwefelsaures Natron* bewirken in ganz concentrirten Kalklösungen sogleich weisse Niederschläge von schwefelsaurem Kalk, welche von viel Wasser vollständig aufgenommen werden, und in Säuren noch weit löslicher sind, als in Wasser. In weniger concentrirten Lösungen entstehen die Niederschläge erst nach längerem Stehen, verdünntere werden nicht gefällt. Gypslösung kann natürlicher Weise keinen Niederschlag bewirken, aber

auch eine mit gleichviel Wasser vermischte, kalt gesättigte Lösung von schwefelsaurem Kali bringt in Kalklösungen keinen Niederschlag hervor, wenigstens nie sogleich. Sind Kalklösungen so verdünnt, dass Schwefelsäure keine Fällung bewirkt, so entsteht sie sogleich, wenn der Lösung Alkohol zugesetzt wird.

3) *Kieselfluorwasserstoffsäure* fällt Kalksalze nicht.

4) *Oxalsäure* bringt selbst in sehr verdünnten neutralen Kalklösungen einen weissen Niederschlag von oxalsaurem Kalk hervor. Zusatz von Ammoniak beschleunigt die Ausscheidung und vermehrt die Menge des Niederschlags. Der oxalsaure Kalk löst sich leicht in Salzsäure und Salpetersäure, nicht aber in Essigsäure und Oxalsäure.

Lösliche Kalksalze ertheilen, mit wässerigem *Weingeist* erhitzt, der Flamme eine gelbrothe Farbe, welche mit der durch Strontian gefärbten oft verwechselt wird.

d. M a g n e s i a .

1) *Ammoniak* fällt aus den Lösungen neutraler Magnesiasalze einen Theil der Bittererde als Bittererdehydrat in Gestalt eines weissen voluminösen Niederschlags. Der andere Theil der Magnesia bleibt, mit dem bei der Zersetzung entstandenen Ammoniaksalz zu einem durch Ammoniak nicht zerlegbaren Doppelsalze verbunden, in Auflösung. Diese Neigung der Magnesiasalze, mit Ammoniakverbindungen solche Doppelsalze zu bilden, bedingt es, dass bei Gegenwart von Ammoniaksalzen Magnesiasalze durch Ammoniak nicht gefällt werden, oder was dasselbe ist, dass Ammoniak in sauren Magnesialösungen keinen Niederschlag erzeugt, und dass eine durch Ammoniak in neutraler Lösung erzeugte Fällung durch Zusatz eines Ammoniaksalzes wieder verschwindet.

2) *Kali* und *kaustischer Baryt* fällen aus Magnesialösungen Bittererdehydrat. Seine Ausscheidung wird durch Aufkochen sehr begünstigt. Ammoniaksalze lösen das gefällte Hydrat wieder auf. Werden sie der Magnesialösung vor dem Zusatz des Fällungsmittels in genügender Menge zugemischt, so entsteht gar kein Niederschlag. Wird aber die Lösung alsdann mit Kaliüberschuss gekocht, so muss er natürlich zum Vorschein kommen, weil ja dadurch die Bedingung seines gelöst Bleibens, das Ammoniaksalz, zersetzt und entfernt wird.

3) *Kohlensaures Kali* bewirkt in neutralen Magnesialösungen einen weissen Niederschlag, eine Verbindung von einem Aeq.

Magnesiahhydrat mit drei Aeq. kohlensaurer Magnesia. Der vierte Theil der Kohlensäure des zersetzten kohlensauren Natrons wird herbei ausgeschieden und erhält einen Theil der kohlensauren Magnesia als doppeltkohlensaures Salz in Lösung. Durch Kochen wird diese Kohlensäure ausgetrieben, Erhitzen der Flüssigkeit beschleunigt daher die Ausscheidung und vermehrt die Menge des Niederschlags. Ammoniaksalze verhindern auch diese Fällung und lösen einen schon gebildeten Niederschlag wieder auf.

4) *Kohlensaures Ammoniak* schlägt in der Kälte Magnesialösungen nicht, beim Kochen aber unvollständig nieder. Ammoniaksalze verhindern die Entstehung eines Niederschlages gänzlich.

5) *Phosphorsaures Natron* schlägt aus Magnesialösungen, wenn sie nicht zu verdünnt sind, phosphorsaure Bittererde als weißes Pulver nieder. Ihre Ausscheidung wird durch Aufkochen der Flüssigkeit sehr begünstigt. Setzt man aber der Magnesialösung vor oder nach dem Zufügen des phosphorsauren Natrons Ammoniak zu, so entsteht, auch wenn dieselbe sehr verdünnt ist, ein weißer krystallinischer Niederschlag von basisch phosphorsaurer Ammoniak-Magnesia. Seine Abscheidung aus verdünnten Flüssigkeiten wird durch heftiges Umrühren derselben (mit einem Glasstabe) beschleunigt. Ist die Verdünnung so groß, dass kein Niederschlag mehr entsteht, so werden doch nach einiger Zeit die Bahnen, die man an der Wandung des Gefäßes beim Umrühren genommen hat, als weiße Striche sichtbar. Chlorammonium, überhaupt Ammoniaksalze lösen die basisch phosphorsaure Ammoniak-Talkerde nicht auf, wohl aber freie Säuren, selbst Essigsäure.

6) *Oxalsaures Ammoniak*, nicht aber freie Oxalsäure, bewirkt einen weißen Niederschlag von oxalsaurer Magnesia. Ammoniaksalze verhindern seine Entstehung.

7) *Schwefelsäure* und *Kieselfluorwasserstoffsäure* fällen die Magnesiasalze nicht.

8) Wird Talkerde oder ein Talkerdesalz mit salpetersaurer Kobaltoxydullösung befeuchtet und längere Zeit auf Kohle einer guten Löthrohrflamme ausgesetzt, so bekommt man eine schwach fleischrothe Masse, deren Farbe erst nach dem Erkalten deutlich hervortritt, aber niemals sehr intensiv ist.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Die Schwerlöslichkeit des Magnesiahhydrats, die Leichtlöslichkeit der schwefelsauren Magnesia und die Neigung der Magnesiasalze mit Ammoniakverbindun-

gen Doppelsalze zu bilden, sind die 3 Hauptpunkte, in denen sich die Bittererde von den anderen alkalischen Erden unterscheidet. Um dieselbe zu erkennen, entfernen wir immer zuerst die Baryt-, Strontian- und Kalkerde, im Falle sie zugegen sind, und zwar entweder durch Kochen mit kohlensaurem Ammoniak unter Salmiakzusatz, oder durch schwefelsaures Kali und oxalsaures Ammoniak unter Salmiakzusatz, und wählen zu dieser Erkennung stets die Reaction mit phosphorsaurem Natron und Ammoniak. — Die Ermittlung des Baryts ist unter allen Umständen leicht, der sogleich entstehende Niederschlag mit Gypslösung, die Reaction mit Kieselfluorwasserstoffsäure lassen dabei keinen Zweifel. — Strontianerde ist durch ihr Verhalten zu Gypslösung nur dann leicht zu erkennen, wenn kein Baryt zugegen ist. Sie muss daher, im Falle sie mit Baryt in einer Lösung ist, zuvor davon geschieden werden. Man bewerkstelligt diese Trennung am besten, indem man beide Erden in trockne Chlormetalle verwandelt und diese mit absolutem Alkohol digerirt. Das Chlorstrontium löst sich auf, das Chlorbarium bleibt zurück. Bei der Prüfung auf Strontian mittelst der Weingeistflamme hat man sich vor Verwechslung mit der durch Kalksalze bewirkten Färbung zu hüten. — Zur Erkennung der Kalkerde wählt man stets die Oxalsäure. Zuvor müssen jedoch die Baryt- und Strontianerde durch schwefelsaures Kali entfernt worden sein, da sie ja zu Oxalsäure eine von der des Kalks nur in Betreff der Empfindlichkeit verschiedene Reaction zeigen. Bei der Abscheidung des Baryts und Strontians mit schwefelsaurem Kali kann möglicherweise auch ein Theil des Kalks gefällt werden. Es ist dies gleichgültig, da jedenfalls in der Flüssigkeit so viel gelöst bleibt, dass er darin durch Oxalsäure mit zweifelloser Sicherheit nachgewiesen werden kann.

§. 87.

Dritte Gruppe.

Thonerde, Chromoxyd.

Eigenschaften der Gruppe. Thonerde und Chromoxyd sind im reinen Zustande und als Hydrate in Wasser unlöslich. Sie bilden mit Kohlensäure keine neutralen Salze. Ihre Schwefelverbindungen können auf nassem Wege nicht dargestellt werden. Schwefelwasserstoff fällt daher Thonerde- und Chromoxydlösungen nicht, Schwefelammonium fällt aus denselben die Oxydhydrate. Dieses Verhalten zu Schwefelammonium unterscheidet die Oxyde der dritten Gruppe von den vorhergehenden.

*Besondere Reactionen.*a. *Thonerde.*

1) Die Thonerdesalze sind farblos, meist nicht flüchtig, theils löslich, theils unlöslich. Die löslichen röthen Lackmus, und verlieren beim Glühen ihre Säuren.

2) *Kali* fällt aus den Auflösungen der Thonerde einen voluminösen Niederschlag von kalihaltigem Thonerdehydrat, welcher sich in einem Ueberschuss des Fällungsmittels leicht und vollständig löst, aus dieser Lösung aber durch Zusatz von Chlorammonium schon in der Kälte, vollständiger beim Erwärmen wieder niedergeschlagen wird. Ammoniaksalze verhindern die Fällung durch *Kali* nicht.

3) *Ammoniak* bewirkt gleichfalls einen Niederschlag von Thonerdehydrat. Er wird von einem sehr bedeutenden Ueberschuss des Fällungsmittels ebenfalls gelöst, aber nur dann, wenn die Thonerdelösung keine *Kali*- oder Natronsalze enthält. Ist jedoch dies der Fall und sind die genannten Salze in einiger Menge zugegen, so vermag *Ammoniak* den entstandenen Niederschlag von Thonerdehydrat nicht zu lösen.

Auf diesem Verhalten beruht die vollständige Fällung des Thonerdehydrats aus kalischer Lösung durch Chlorammonium. *Kali* und Chlorammonium zersetzen sich nemlich, es entsteht Chlorkalium und *Ammoniak*; das *Ammoniak* aber kann bei Gegenwart des Kalisalzes das Thonerdehydrat nicht gelöst erhalten, es fällt also nieder.

4) Wird Thonerde oder eine Verbindung derselben auf Kohle vor dem Löthrohre geglüht, alsdann mit etwas *salpetersaurer Kobaltoxyd*lösung befeuchtet und von Neuem stark geglüht, so erhält man eine ungeschmolzene tief himmelblaue Masse, eine Verbindung der beiden Oxyde. Die Farbe tritt erst beim Erkalten deutlich hervor. Bei Kerzenlicht erscheint sie violett.

b. *Chromoxyd.*

1) Die Auflösungen der Chromoxydverbindungen haben immer, auch bei bedeutender Verdünnung, entweder eine smaragdgrüne oder eine schwärzlich violette Farbe. Die löslichen neutralen Chromoxydsalze röthen Lackmus und werden beim Erhitzen zersetzt.

2) *Kali* bewirkt in Chromoxydlösungen einen bläulich grü-

nen Niederschlag von Chromoxydhydrat, der sich in einem Ueberschuss des Fällungsmittels leicht und vollständig zu einer smaragdgrünen Flüssigkeit löst. Wird diese Lösung anhaltend gekocht, so scheidet sich der Niederschlag wieder vollständig ab, so dass die überstehende Flüssigkeit vollkommen farblos erscheint. Wird die kalische Lösung mit Chlorammonium versetzt und erhitzt, so wird alles gelöste Chromoxydhydrat ebenfalls wieder gefällt.

3) *Ammoniak* bewirkt denselben Niederschlag von Chromoxydhydrat. Ein Ueberschuss des Fällungsmittels löst ihn in der Kälte in geringer Menge auf, wird aber die Lösung nach dem Zusatz von überschüssigem Ammoniak gekocht, so ist die Fällung vollständig.

4) Wird Chromoxyd oder eine Verbindung desselben mit *Salpeter* zusammengeschmolzen, so erhält man unter allen Umständen chromsaures Kali, indem ein Theil des Sauerstoffs der Salpetersäure aus seiner Verbindung austritt und mit dem Chromoxyd Chromsäure bildet, welche sich mit dem Kali des zersetzten Salpeters vereinigt. Die Reactionen der Chromsäure siehe unten §. 95. b.

5) *Phosphorsalz* löst Chromoxyd und seine Salze, sowohl in der Oxydations- als auch in der Reductionsflamme zu klaren, schwach gelbgrünen Gläsern auf, deren Farbe beim Erkalten ins Smaragdgrüne übergeht. Borax verhält sich ähnlich.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Die Löslichkeit der Hydrate des Chroms und der Thonerde in Kali und die Fällung derselben aus der kalischen Lösung durch Chlorammonium gestattet erstlich eine Trennung derselben von den Oxyden anderer Gruppen, sie bietet zweitens ein sicheres Erkennungsmittel der Thonerde, wenn kein Chromoxyd zugegen ist. Ist dieses daher vorhanden, was entweder schon die Farbe der Lösung oder unter allen Umständen die Reaction mit Phosphorsalz zu erkennen giebt, so muss es abgeschieden werden, bevor man auf Thonerde prüfen kann. Diese Abscheidung geschieht am vollständigsten, wenn die gemengten Oxyde mit Salpeter geschmolzen werden. Die Ausscheidung des Chromoxyds durch Kochen seiner kalischen Lösung ist ebenfalls, wenn das Kochen lange genug fortgesetzt wird, hinlänglich genau, sie giebt aber nichtsdestoweniger häufig zu Täuschungen Anlass.

§. 88.

Vierte Gruppe.

Zinkoxyd, Manganoxydul, Nickeloxyd, Kobaltoxydul, Eisenoxydul, Eisenoxyd.

Eigenschaften der Gruppe. Die den genannten Oxyden entsprechenden Schwefelverbindungen sind in verdünnten Säuren mehr oder weniger löslich, in Wasser, in Alkalien und alkalischen Schwefelmetallen aber unlöslich. Es werden daher die Lösungen der Salze dieser Oxyde durch Schwefelwasserstoff, wenn sie freie Säure enthalten, gar nicht, wenn sie neutral sind, entweder ebenfalls nicht oder nur unvollständig, wenn sie aber alkalisch sind oder wenn statt des Schwefelwasserstoffs ein alkalisches Schwefelmetall angewendet wird, vollständig gefällt.

Besondere Reactionen.

a. Z i n k o x y d.

1) Die Verbindungen des Zinkoxyds sind farblos. Die löslichen neutralen Salze röthen Lackmus und werden mit Ausnahme des Zinkvitriols, der schwache Glühhitze verträgt, beim Erhitzen leicht zersetzt.

2) *Schwefelwasserstoff* fällt aus neutralen Zinklösungen einen Theil des Zinks als weißes Schwefelzink. In sauren Auflösungen entsteht kein Niederschlag, wenn die anwesende freie Säure eine der stärkeren ist.

3) *Schwefelammonium* fällt aus neutralen, ebenso wie Schwefelwasserstoff aus alkalischen Lösungen alles Zink als Schwefelzink in Gestalt eines weißen Niederschlags. Derselbe wird weder von überschüssigem Schwefelammonium, noch von Kali oder Ammoniak gelöst, Salzsäure nimmt ihn etwas schwierig, Königswasser aber leicht auf.

4) *Kali* und *Ammoniak* fallen aus Zinklösungen Zinkoxydhydrat in Form eines weißen gallertartigen Niederschlags, der von einem Ueberschuss der Fällungsmittel leicht und vollständig gelöst wird.

5) *Kohlensaures Kali* bewirkt einen im Ueberschuss des Fällungsmittels unlöslichen Niederschlag von basisch kohlensaurem Zinkoxyd. Ammoniaksalze verhindern seine Entstehung

oder lösen den schon gebildeten Niederschlag wieder auf, indem sich Zinkoxyd-Ammoniak-Doppelsalze bilden.

6) *Kohlensaures Ammoniak* bewirkt denselben Niederschlag wie kohlensaures Kali, mehr zugesetztes kohlensaures Ammoniak löst ihn wieder auf.

7) Zinkoxyd oder ein Zinkoxydsalz mit *kohlensaurem Natron* gemengt und der *Reductionsflamme* ausgesetzt, beschlägt die Kohle mit einem, so lange er heiß ist, gelben, beim Erkalten weiß werdenden Anflug von Zinkoxyd. Derselbe wird erzeugt, indem sich das reducirte metallische Zink im Entstehungsmoment verflüchtigt und bei seinem Durchgange durch die äußere Flamme wieder oxydirt.

8) Wird Zinkoxyd oder ein Zinksalz mit *salpetersaurer Kobaltoxydullösung* befeuchtet und in der Löthrohrflamme erhitzt, so erhält man eine ungeschmolzene, schön grün gefärbte Verbindung von Zinkoxyd mit Kobaltoxydul.

b. M a n g a n o x y d u l.

1) Die Manganoxydulsalze sind farblos oder blassroth, theils löslich, theils unlöslich. Die löslichen zersetzen sich, mit Ausnahme des schwefelsauren Manganoxyduls, beim Glühen. Ihre Lösungen verändern Pflanzenfarben nicht.

2) *Schwefelwasserstoff* schlägt saure oder neutrale Manganoxydullösungen nicht nieder.

3) *Schwefelammonium* fällt aus neutralen Lösungen, ebenso wie Schwefelwasserstoff aus alkalischen, alles Mangan als Schwefelmangan in Form eines hellfleischrothen, an der Luft dunkelbraun werdenden, in Schwefelammonium und Alkalien unlöslichen, in Salzsäure und Salpetersäure leicht löslichen Niederschlags.

4) *Kali* und *Ammoniak* bewirken weißliche Niederschläge von Manganoxydulhydrat, welche in Berührung mit der Luft bald bräunlich, endlich dunkel schwarzbraun werden, indem das Oxydulhydrat durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Atmosphäre in Oxydhydrat übergeht. Ammoniak und kohlensaures Ammoniak lösen den Niederschlag nicht auf, Salmiak aber verhindert die Fällung durch Ammoniak gänzlich, die durch Kali theilweise. Von schon gebildeten Niederschlägen werden von Salmiaksolution nur diejenigen Theile aufgelöst, welche sich noch nicht höher oxydirt haben. Die Lösung des Oxydulhydrats in Salmiak beruht auf der Neigung der Manganoxydulsalze mit Ammoniaksalzen Doppel-

salze zu bilden. Die klaren Lösungen dieser Doppelsalze werden an der Luft braun und setzen dunkelbraunes Manganoxyd ab.

5) Wird irgend eine Manganverbindung mit *Soda* auf Platin in der äusseren Flamme geschmolzen, so entsteht mangansaures Natron, welches die Probe, so lange sie heiss ist, grün, nach dem Erkalten aber, wobei sie zugleich unklar wird, blaugrün erscheinen lässt. Diese Reaction giebt die kleinsten Mengen Mangan zu erkennen. Ihre Empfindlichkeit wird noch gesteigert, wenn man der Soda eine Spur Salpeter zusetzt.

6) *Borax* und *Phosphorsalz* lösen in der äussern Flamme Manganverbindungen zu klaren, violettrothen Gläsern auf, welche beim Erkalten amethystroth erscheinen und in der innern Flamme, in Folge einer Reduction des Oxyds zu Oxydul ihre Farbe verlieren. Das Boraxglas erscheint bei grossem Gehalt an Manganoxyd schwarz, das Phosphorsalzglas aber verliert seine Durchsichtigkeit niemals. Letzteres wird in der innern Flamme weit leichter farblos als ersteres.

c. N i c k e l o x y d.

1) Die Salze des Nickeloxyds sind gelb oder grün, die Lösungen derselben sind hellgrün. Die löslichen neutralen Salze röthen Lackmus und zersetzen sich beim Glühen.

2) *Schwefelwasserstoff* schlägt saure Nickellösungen nicht, neutrale ebenfalls nicht oder nur sehr unvollständig nieder.

3) *Schwefelammonium* bewirkt in neutralen, ebenso wie Schwefelwasserstoff in alkalischen, Lösungen einen schwarzen Niederschlag von Schwefelnickel, der in Schwefelammonium nicht ganz unlöslich ist, daher die Flüssigkeit, aus welcher er sich abgesetzt hat, stets eine bräunliche Farbe zeigt. Salzsäure nimmt das Schwefelnickel schwierig, Königswasser aber leicht auf.

4) *Kali* bewirkt einen hellgrünen, in Kali unlöslichen, an der Luft unveränderlichen Niederschlag von Nickeloxydhydrat. Kohlensaures Ammoniak löst denselben zu einer grünlich blauen Flüssigkeit auf, aus der Kali den Nickelgehalt als gelbgrünes Nickeloxydhydrat fällt.

5) *Ammoniak* schlägt ebenfalls Oxydhydrat nieder, ein Ueberschuss des Fällungsmittels aber löst es leicht als Nickeloxyd-Ammoniak-Doppelsalz zu einer blauen Flüssigkeit auf. Kali fällt aus dieser Lösung Nickeloxydhydrat.

6) *Cyankalium* bewirkt einen gelblichgrünen Niederschlag von

Cyannickel, der von einem Ueberschuss des Fällungsmittels leicht zu einer bräunlichgelben Lösung von Cyannickel-Cyankalium aufgenommen wird. Schwefelsäure und Salzsäure fallen aus dieser Lösung wiederum Cyannickel, welches in einem Ueberschusse dieser Säuren in der Kälte sehr schwer löslich ist.

7) *Borax* und *Phosphorsalz* lösen Nickeloxydverbindungen in der äußern Flamme zu klaren Gläsern von dunkelgelber Farbe mit einem Stich ins Rothbraune, welche beim Erkalten heller, fast farblos werden. Ein Zusatz von Salpeter oder kohlensaurem Kali verändert die Farbe ins Blau- oder Dunkel-Purpurfarbene. In der innern Flamme bleibt das Phosphorsalzglas unverändert, das Boraxglas aber wird von reducirtem Nickel grau und trübe.

d. K o b a l t o x y d u l.

1) Die Kobaltoxydulsalze sind im wasserfreien Zustande blau, im wasserhaltigen eigenthümlich hellroth. Die Lösungen derselben zeigen diese Farbe bis zu bedeutender Verdünnung. Die löslichen neutralen Salze röthen Lackmus und zersetzen sich in der Glühhitze.

2) *Schwefelwasserstoff* schlägt saure Kobaltlösungen (nicht, neutrale, wenn sie schwache Säuren enthalten, höchstens unvollständig mit schwarzer Farbe nieder.

3) *Schwefelammonium* fällt aus neutralen, eben so wie Schwefelwasserstoff aus alkalischen, Lösungen alles Kobalt als schwarzes Schwefelkobalt. Dasselbe ist in Alkalien und Schwefelammonium unlöslich, in Salzsäure schwerlöslich, in Königswasser leichtlöslich.

4) *Kali* bewirkt in Kobaltlösungen blaue, an der Luft durch Sauerstoffaufnahme grün werdende, beim Kochen in blassrothes Hydrat übergehende Niederschläge von basischen Kobaltsalzen. Dieselben sind in Kali unlöslich. Neutrales kohlensaures Ammoniak aber löst sie vollständig zu intensiv gefärbten violettrothen Flüssigkeiten, in denen Kali keinen oder nur einen sehr geringen Niederschlag bewirkt.

5) *Ammoniak* bewirkt denselben Niederschlag, wie Kali, ein Ueberschuss des Fällungsmittels löst ihn jedoch zu einer röthlich-braunen Flüssigkeit, in der Kali keinen oder nur einen geringen Niederschlag hervorbringt, auf.

6) Setzt man zu einer mit etwas Salzsäure angesäuerten Kobaltlösung *Cyankalium*, so entsteht ein bräunlichweißer Niederschlag

von Kobaltcyanür, der sich im Ueberschuss des Fällungsmittels bei Anwesenheit freier Blausäure leicht zu Kobaltcyanidkalium löst. Säuren bewirken in der Lösung dieses Salzes keinen Niederschlag.

7) *Borax* löst Kobaltverbindungen in innerer und äußerer Flamme zu klaren, prächtig blauen, bei grossem Kobaltgehalt fast schwarz erscheinenden Gläsern auf. Diese Reaction ist eben so charakteristisch als empfindlich. Phosphorsalz verhält sich eben so, ist aber minder empfindlich.

e. Eisenoxydul.

1) Die Eisenoxydulsalze haben eine grünliche Farbe, die Lösungen derselben erscheinen nur im ganz concentrirten Zustande gefärbt. Die löslichen neutralen Salze röthen Lackmus und werden beim Glühen zerlegt.

2) *Schwefelwasserstoff* schlägt saure Auflösungen nicht, neutrale, wenn sie schwache Säuren enthalten, höchstens unvollständig mit schwarzer Farbe nieder.

3) *Schwefelammonium* fällt aus neutralen, eben so wie Schwefelwasserstoff aus alkalischen Lösungen, alles Eisen als schwarzes, in Alkalien und alkalischen Schwefelmetallen unlösliches, in Salzsäure und Salpetersäure leicht lösliches Eisensulfür.

4) *Kali* und *Ammoniak* bewirken einen Niederschlag von Eisenoxydulhydrat, der im ersten Augenblick fast weiss erscheint, durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft aber nach sehr kurzer Zeit schmutzig grün, zuletzt rothbraun wird. Ammoniaksalze verhindern die Fällung durch Kali theilweise, die durch Ammoniak ganz.

5) *Ferrocyankalium* bewirkt in Eisenoxydullösungen einen bläulich weissen Niederschlag von Ferrocyankaliumeisen ($2 \text{Cfy} + \text{K} + 3 \text{Fe}$), der durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft bald blau wird, indem von 3 Aeq. der Verbindung alles Kalium und 1 Aeq. Eisen oxydirt wird und Berlinerblau ($3 \text{Cfy} + 2 \text{Fe}_2$) zurückbleibt. Salpetersäure oder Chlor bewirken diese Oxydation sogleich.

6) *Ferridcyankalium* erzeugt einen prächtig blauen Niederschlag von Ferridcyaneisen ($2 \text{Cfy} + 3 \text{Fe}$). Derselbe ist vom eigentlichen Berlinerblau in der Farbe nicht verschieden. Er ist in Salzsäure unlöslich, Kali aber zersetzt ihn mit Leichtigkeit. Bei

sehr großer Verdünnung der Eisenlösung bewirkt das Reagens nur eine dunkelblaugrüne Färbung.

7) *Borax* löst Eisenoxydulverbindungen in der Oxydationsflamme zu dunkelrothen Gläsern auf, deren Farbe in der innern Flamme durch Reduction des gebildeten Oxyds zu Oxyduloxyd in's Bouteillengrüne übergeht. Beide Färbungen verschwinden beim Erkalten der Gläser größtentheils oder gänzlich. Phosphorsalz verhält sich ähnlich, die Farbe seines Glases nimmt beim Erkalten noch stärker ab.

f. E i s e n o x y d.

1) Die Eisenoxydsalze sind mehr oder weniger rothgelb. Ihre Lösungen zeigen diese Färbung bis zu ziemlicher Verdünnung. Die löslichen neutralen Salze röthen Lackmus und zersetzen sich beim Erhitzen.

2) *Schwefelwasserstoff* bewirkt in neutralen und sauren Lösungen eine milchig weiße Trübung von ausgeschiedenem Schwefel. Eisenoxyd und Schwefelwasserstoff zersetzen sich nämlich gegenseitig. Der Wasserstoff entzieht dem Oxyd ein Drittel seines Sauerstoffs, damit Wasser bildend. Das Oxydsalz geht dadurch in Oxydulsalz über, der Schwefel des zersetzten Schwefelwasserstoffs scheidet sich aus.

3) *Schwefelammonium* fällt aus neutralen, eben so wie Schwefelwasserstoff aus alkalischen Lösungen, alles Eisenoxyd als schwarzes Eisensulfür, indem der Fällung eine Reduction zu Oxydulsalz vorausgeht. Bei großer Verdünnung bewirkt das Reagens nur eine schwärzlich grüne Färbung der Flüssigkeit. Das fein zertheilte Eisensulfür setzt sich alsdann erst nach längerem Stehen ab. Die Löslichkeitsverhältnisse des Eisensulfürs sind beim Eisenoxydul angeführt worden.

4) *Kali* und *Ammoniak* bewirken rothbraune voluminöse, im Ueberschuss der Fällungsmittel, wie auch in Ammoniaksalzen unlösliche Niederschläge von Eisenoxydhydrat.

5) *Ferrocyankalium* erzeugt auch bei sehr bedeutender Verdünnung einen prächtig blauen, in Salzsäure unlöslichen, durch Kali unter Abscheidung von Eisenoxyd leicht zersetzbaren Niederschlag von Eisen-Ferrocyanid (Berlinerblau).

6) *Ferridcyankalium* färbt Eisenoxydlösungen etwas dunkler rothbraun, bewirkt aber keinen Niederschlag.

7) Vor dem *Löthrohre* zeigen die Eisenoxydsalze dasselbe Verhalten, wie die Oxydulverbindungen.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Von den Metalloxyden der vierten Gruppe ist das Zinkoxyd allein in Kali löslich. Es unterscheidet sich durch dieses Verhalten von den übrigen Oxyden der Gruppe und schließt sich an die dritte Gruppe an. Darin, dass es aus der kalischen Lösung durch Schwefelwasserstoff gefällt wird, weicht es jedoch vom Chromoxyd und der Thonerde ab. Es wird durch dieses Verhalten stets am sichersten erkannt. — Manganoxydul, Nickeloxyd, Kobaltoxydul und Eisenoxydul bilden mit Ammoniaksalzen Doppelsalze, aus denen die Metalloxyde durch freies Ammoniak nicht gefällt werden, Eisenoxyd aber wird, eben so wie die Oxyde der dritten Gruppe, von Ammoniak auch bei Gegenwart von Ammoniaksalzen vollständig niedergeschlagen. Es ergiebt sich hieraus erstens, dass Mangan, Nickel und Kobalt durch dieses Verhalten sowohl vom Eisenoxyd, als auch vom Chromoxyd und der Thonerde geschieden werden können, und zweitens, dass zur Trennung des Eisenoxyduls von jenen Metallen, dasselbe erst in Oxyd übergeführt werden muss, was am einfachsten durch Kochen der Lösung mit Salpetersäure geschieht. — Durch seine Unauflöslichkeit in Kali weicht das Eisenoxyd vom Verhalten des Chromoxyds und der Thonerde ab, durch Ferrocyankalium aber unterscheidet man das Eisenoxyd vom Oxydul. — Nickeloxydhydrat und Kobaltoxydulhydrat lösen sich in kohlensaurem Ammoniak, Manganoxydulhydrat ist darin unlöslich. Durch dieses Lösungsmittel können wir also das Manganoxydul von den beiden anderen Oxyden trennen. Das Braunwerden des weissen Oxydulhydrats an der Luft, so wie die Löthrohrreactionen, besonders die mit Soda, lassen es am sichersten erkennen. — Cyannickel und Cyankobalt lösen sich in Cyankalium auf. Das Cyannickel wird aber aus dieser Lösung durch Säuren abgeschieden, das Cyankobalt nicht. Dieses Verhalten, das heisst das Entstehen eines Niederschlages in der Auflösung der beiden Cyanmetalle in Cyankalium beim Zusatz von Salzsäure, giebt uns unter allen Umständen völlige Gewissheit von der Anwesenheit des Nickels. Was der Niederschlag sei, ob Cyannickel oder Kobaltcyanidnickel ist zum Zweck der Nickelerkennung ganz gleichgültig, wir haben nur fest zu halten, dass kein Niederschlag entsteht, wenn Kobalt allein in der Lösung ist, da Kobaltcyanidkalium von Salzsäure nicht zersetzt wird. Um uns die Zusammen-

setzung der entstehenden Niederschläge und überhaupt den Vorgang zu erklären, sind drei besondere Fälle ins Auge zu fassen, deren Verschiedenheit durch die ungleiche relative Menge des Nickels und Kobalts bedingt wird.

$$1) \text{ Ni : Co} = 3 \text{ Aeq. : } 2 \text{ Aeq.}$$

$$2) \text{ Ni : Co} = 3 \text{ Aeq. : } 2 \text{ Aeq.} + x$$

$$3) \text{ Ni : Co} = 3 \text{ Aeq.} + x : 2 \text{ Aeq.}$$

Wir bekommen demnach im ersten Falle in die Lösung 1 Aeq. Kobaltcyanidkalium ($\text{Cy}_{12}, \text{Co}_2 + 3 \text{ K}$) und 3 Aeq. Cyannickel-Cyankalium ($\text{Cy}_6\text{Ni}_3 + \text{Cy}_6\text{K}_3$), und wenn wir dieser Lösung Salzsäure im Ueberschuss zusetzen, so erhalten wir, indem das Cyannickel-Cyankalium zersetzt wird und das Kalium im Kobaltcyanidkalium mit dem Nickel im Cyannickel seine Stelle tauscht, einen schmutzig grünen Niederschlag von Kobaltcyanidnickel ($\text{Cy}_{12} \text{Co}_2 + 3 \text{ Ni}$), der alles Nickel und alles Kobalt enthält; außerdem bildet sich Chlorkalium und Cyanwasserstoffsäure. — Im zweiten Falle bekommen wir ebenfalls einen Niederschlag von Kobaltcyanidnickel, dieser enthält aber jetzt wohl alles Nickel, nicht aber alles Kobalt, denn der Ueberschuss des Kobaltcyanidkaliums wird ja nicht zersetzt. — Im dritten endlich entsteht ein Niederschlag von Kobaltcyanidnickel, der alles Kobalt und einen Theil des Nickels enthält, gemengt mit unlöslichem Cyannickel, welches den Rest des Nickels enthält. Der erstere ist entstanden wie im Falle 1., das Cyannickel aber durch Zersetzung des überschüssigen Cyannickel-Cyankaliums. Es ergiebt sich hieraus aufs deutlichste, dass Nickel immer eine nothwendige Bedingung zum Entstehen des Niederschlages ist und dass daher ein solcher über seine Anwesenheit keinen Zweifel lassen kann. — Da Kobalt durch sein ausgezeichnetes Löthrohrverhalten unter allen Umständen sicher und leicht zu entdecken ist, so bedürfte es eigentlich zur bloßen Erkennung der beiden Metalle keiner weiteren Angaben mehr, aber weil die völlige Scheidung derselben uns jetzt sehr nahe liegt, so soll sie noch kurz mit einigen Worten berührt werden. Im ersten und zweiten der oben erwähnten Fälle dürfen wir nämlich nach dem Zusatz der Salzsäure die Flüssigkeit sammt dem darin suspendirten Niederschlag von Kobaltcyanidnickel nur erhitzen, bis die freie Blausäure vertrieben ist (wobei sowohl das Kobaltcyanidnickel, als auch das im Falle 2. vorhandene Kobaltcyanidkalium unverändert bleibt), um alsdann das Kobaltcyanidnickel durch Zusatz von kaustischem Kali ganz

einfach in Kobaltcyanidkalium, welches gelöst bleibt, und in Nickeloxyd, welches sich als Hydrat ausscheidet, zu zerlegen. — Im Falle 3. aber müssen wir mehr Salzsäure zusetzen und damit so lange kochen, bis das in dem Niederschlag enthaltene Cyannickel (welches durch Kali nur unvollständig zerlegt werden würde) in Chlornickel umgewandelt und bis die dabei entstehende Blausäure völlig vertrieben ist, um alsdann durch Kochen mit kaustischem Kali alles Nickel als unlösliches Oxydhydrat und alles Kobalt als lösliches Kobaltcyanidkalium zu erhalten. — Endlich muss noch erwähnt werden, dass die Oxyde der vierten Gruppe durch Alkalien nicht gefällt werden können, wenn in den Lösungen nicht flüchtige organische Substanzen (z. B. Zucker, Weinsteinsäure) enthalten sind. Ein Gleiches gilt von der Thonerde und dem Chromoxyd.

§. 89.

Fünfte Gruppe.

Silberoxyd, Quecksilberoxydul, Quecksilberoxyd, Bleioxyd, Wismuthoxyd, Kupferoxyd, Cadmiumoxyd.

Eigenschaften der Gruppe. Die den angeführten Oxyden entsprechenden Schwefelmetalle sind sowohl in verdünnten Säuren, als auch in alkalischen Schwefelmetallen unlöslich, es werden daher die Lösungen dieser Oxyde durch Schwefelwasserstoff unter allen Umständen, d. h. bei neutraler, alkalischer und saurer Reaction vollständig niedergeschlagen.

Zu besserer Uebersicht bringen wir die Oxyde dieser Gruppe in zwei Abtheilungen und unterscheiden:

- 1) Durch Salzsäure fällbare Oxyde, nämlich Silberoxyd, Quecksilberoxydul, Bleioxyd;
- 2) Durch Salzsäure nicht fällbare Oxyde, als Quecksilberoxyd, Kupferoxyd, Wismuthoxyd, Cadmiumoxyd.

Auf das Blei muss bei beiden Abtheilungen Rücksicht genommen werden, da die Schwerlöslichkeit seiner Chlorverbindung Verwechslung mit Quecksilberoxydul und Silberoxyd möglich macht, aber kein Mittel zu vollständiger Abscheidung von den Oxyden der zweiten Abtheilung an die Hand giebt.

§. 90.

Erste Abtheilung, durch Salzsäure fällbare Oxyde.

Besondere Reactionen.

a. Silberoxyd.

1) Die Salze des Silberoxyds sind nicht flüchtig, farblos; am Licht werden die meisten schwarz. Die löslichen verändern im neutralen Zustande Pflanzenfarben nicht und werden beim Glühen zersetzt.

2) *Schwefelwasserstoff* und *Schwefelammonium* schlagen schwarzes, in verdünnten Säuren, in Alkalien, alkalischen Schwefelmetallen und Cyankalium unlösliches *Schwefelsilber* nieder, welches von kochender concentrirter Salpetersäure leicht zersetzt und unter Abscheidung von Schwefel gelöst wird.

3) *Kali* und *Ammoniak* fallen Silberoxyd in Form eines hellbraunen Pulvers, welches in Kali nicht, in Ammoniak aber leicht löslich ist. Ammoniaksalze verhindern die Reaction ganz oder theilweise.

4) *Salzsäure* und lösliche *Chlormetalle* erzeugen einen weissen, käsigen Niederschlag von *Chlorsilber*. Bei sehr grosser Verdünnung lässt er die Flüssigkeit nur bläulich weiss opalisirend erscheinen. Das weisse Chlorsilber wird unter Einfluss des Lichtes ohne seine Zusammensetzung zu ändern erst violett, endlich schwarz; es löst sich nicht in Salpetersäure, leicht in Ammoniak zu *Chlorsilber - Ammoniak*. Aus dieser Verbindung wird es durch Säuren wieder ausgeschieden. Beim Erhitzen schmilzt das Chlorsilber ohne Zersetzung zu einer durchscheinenden hornartigen Masse.

5) Werden Silberverbindungen mit *Soda* gemengt und im Kohlengrübchen der innern *Löthrohr-Flamme* ausgesetzt, so erhält man weisse, glänzende, dehnbare Metallkügelchen ohne gleichzeitigen Beschlag.

b. Quecksilberoxydul.

1) Die Quecksilberoxydulsalze verflüchtigen sich beim Glühen entweder unzersetzt, oder sie werden zersetzt und das ausgeschiedene Quecksilber verflüchtigt sich als solches. Sie sind farblos. Die löslichen röthen im neutralen Zustande Lackmus; sie zerfallen beim Vermischen mit viel Wasser in unlösliche basische und in lösliche saure Salze.

2) *Schwefelwasserstoff* und *Schwefelammonium* bewirken schwarze, in verdünnten Säuren, wie auch in alkalischen Schwefelmetallen und in Cyankalium unlösliche Niederschläge von Quecksilbersulfür. Kali löst daraus unter Abscheidung von metallischem Quecksilber doppelt Schwefelquecksilber auf; von kochender concentrirter Salpetersäure wird das Quecksilbersulfür nicht, von Königswasser leicht zersetzt und gelöst.

3) *Kali* und *Ammoniak* bewirken schwarze, im Ueberschuss der Fällungsmittel unlösliche Niederschläge, ersteres von Quecksilberoxydul, letzteres von einem basischen Quecksilberoxydul-Ammoniaksalz.

4) *Salzsäure* und lösliche *Chlormetalle* schlagen Quecksilberchlorür als blendend weißes feines Pulver nieder. Kalte Salzsäure und kalte Salpetersäure nehmen dasselbe nicht auf; wird es aber mit diesen Säuren lange gekocht, so löst es sich, wenn auch sehr schwierig und langsam, indem es von Salzsäure in Quecksilberchlorid umgewandelt wird, von Salpetersäure aber in Quecksilberchlorid und salpetersaures Oxyd. Ammoniak und Kali zersetzen das Quecksilberchlorür und scheiden schwarzes Oxydul daraus ab.

5) Bringt man auf *blankes Kupfer* einen Tropfen einer neutralen oder schwach sauren Quecksilberoxydullösung, wäscht nach einiger Zeit ab und reibt den Fleck mit Wolle, Papier u. dgl., so erscheint er silberweiß, metallglänzend. Bei dem Erhitzen verschwindet die scheinbare Versilberung, indem sich das ausgeschiedene Quecksilber verflüchtigt.

6) *Zinnchlorür* bewirkt in Quecksilberoxydullösungen einen grauen Niederschlag von metallischem Quecksilber, der sich durch Erwärmen und Schütteln, am leichtesten durch Kochen mit Salzsäure zu Kügelchen vereinigen lässt.

7) Werden Quecksilberverbindungen mit zerfallener *Soda* innig gemengt und mit einer Sodaschicht überdeckt in einer ausgezogenen Glasröhre vor dem Löthrohr erhitzt, so tritt stets eine Zersetzung in der Art ein, dass metallisches Quecksilber frei wird. Es legt sich oberhalb der erhitzten Stelle als grauer Sublimat an. Reibt man denselben mit einem Glasstäbchen, so vereinigen sich die feinen Quecksilbertheilchen zu größeren Kügelchen.

c. Bleioxyd.

1) Die Bleioxydsalze sind nicht flüchtig, farblos; die lös-

lichen röthen im neutralen Zustande Lackmus und zersetzen sich beim Glühen.

2) *Schwefelwasserstoff* und *Schwefelammonium* bewirken schwarze, in verdünnten Säuren, in Alkalien, alkalischen Schwefelmetallen und Cyankalium unlösliche Niederschläge von Schwefelblei. Von kochender concentrirter Salpetersäure wird dasselbe zerlegt; alles Blei geht zuerst in salpetersaures Bleioxyd über, der größte Theil des Schwefels scheidet sich ab, ein anderer wird in Schwefelsäure verwandelt. Diese zerlegt wiederum einen Theil des gebildeten salpetersauren Oxyds und bewirkt daher, dass bei der Lösung auſser dem abgeschiedenen Schwefel ein weißes Pulver, das gebildete schwefelsaure Bleioxyd, zurückbleibt.

3) *Kali* und *Ammoniak* fällen basische Salze in Form weißer Niederschläge, welche in Ammoniak unlöslich, in Kali schwerlöslich sind.

4) *Salzsäure* und lösliche *Chlormetalle* erzeugen in concentrirten Lösungen schwere, weiſse, in vielem Wasser besonders beim Erhitzen lösliche Niederschläge von Chlorblei. Dasselbe erleidet von Ammoniak keine Veränderung, in Salpetersäure und Salzsäure ist es schwieriger löslich, als in Wasser.

5) *Schwefelsäure* und *schwefelsaure Salze* bewirken weiſse, in Wasser und verdünnten Säuren fast unlösliche Niederschläge von schwefelsaurem Bleioxyd. Von concentrirter Salpetersäure wird dasselbe in etwas aufgenommen, kochende concentrirte Salzsäure löst es schwierig, Kalilauge leichter auf. Ammoniaksalze, namentlich schwefelsaures Ammoniak, verhindern die Fällung theilweise oder ganz.

6) *Chromsaures Kali* erzeugt einen gelben, in Kali leicht löslichen, in verdünnter Salpetersäure unlöslichen Niederschlag von chromsaurem Bleioxyd.

7) Bleiverbindungen geben mit *Soda* gemengt und im Kohlengrübchen der *Reductionsflamme* ausgesetzt, sehr leicht weiche, dehnbare Metallkugeln. Gleichzeitig beschlägt sich die Kohle mit einem gelben Anflug von Bleioxyd.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Die Metalloxyde der ersten Abtheilung der fünften Gruppe sind in den entsprechenden Chlorverbindungen am deutlichsten charakterisirt, indem uns das verschiedene Verhalten dieser Chlormetalle zu Ammoniak sowohl Erkennung als auch Scheidung derselben gestattet. Das Chlorsilber wird nämlich wie

angeführt worden, von Ammoniak gelöst, Quecksilberchlorür und Chlorblei bleiben zurück. Aus der Lösung des Chlorsilberammoniaks können wir durch Zusatz von Salpetersäure das Chlorsilber wieder fällen, und da diese Reaction keine Verwechslung möglich macht, bedürfen wir zur Entdeckung des Silbers eigentlich keines weitem Mittels. — Von den beiden anderen Chlormetallen wird das Quecksilberchlorür durch Ammoniak in schwarzes Oxydul verwandelt, das Chlorblei bleibt unverändert. Das entstandene Quecksilberoxydul kann von dem Chlorblei sowohl durch Kochen mit Wasser, wobei das Chlorblei, als auch durch Behandeln mit Salpetersäure, wodurch das Quecksilberoxydul gelöst wird, geschieden werden. Das Quecksilberoxydul ist durch das angegebene Verhalten hinlänglich charakterisirt, zur weiteren Prüfung auf Blei wählt man die Reactionen mit Schwefelsäure oder mit chromsaurem Kali.

§. 91.

Zweite Abtheilung der fünften Gruppe. Durch Salzsäure nicht fällbare Oxyde.

Besondere Reactionen.

a. Q u e c k s i l b e r o x y d.

1) Die Salze des Quecksilberoxyds verflüchtigen sich beim Glühen theils unzersetzt, theils unter Zersetzung. Sie sind meistens farblos. Die löslichen röthen im neutralen Zustande Lackmus. Das salpetersaure und das schwefelsaure Quecksilberoxyd werden durch viel Wasser in saure lösliche und basische unlösliche Salze zersetzt.

2) Wird *Schwefelwasserstoffwasser* oder *Schwefelammonium* in sehr geringer Menge zu Quecksilberoxydlösungen gesetzt, so erhält man nach dem Umschütteln einen völlig weissen Niederschlag; ein etwas gröfserer Zusatz bewirkt, dass der Niederschlag gelb, orange bis braunroth wird; ein Ueberschuss der Fällungsmittel aber erzeugt einen rein schwarzen Präcipitat von Quecksilbersulfid. Diese je nach der Menge des Schwefelwasserstoffs eintretende Farbenveränderung des Niederschlags unterscheidet das Quecksilberoxyd von allen anderen Körpern. Sie hat ihre Begründung darin, dass zuerst eine weisse Doppelverbindung von Quecksilbersulfid mit unzersetztem Quecksilberoxydsalz entsteht, welche dann, je nachdem sie mehr und mehr mit schwarzem Sulfid gemengt wird, den Niederschlag in den angeführten Nüancen erscheinen lässt. Das Quecksilbersulfid wird weder von Schwefelammonium, noch von Cyanka-

lium aufgenommen, in Salzsäure und in Salpetersäure ist es selbst beim Kochen ganz unlöslich. Kalilauge nimmt es vollständig auf, Königswasser zersetzt und löst es mit Leichtigkeit.

3) *Kali* bewirkt, in unzureichender Menge zu neutralen oder schwach sauren Quecksilberoxydlösungen gesetzt, einen rothbraunen, im Ueberschuss zugefügt, einen gelben Niederschlag. Der erstere ist ein basisches Salz, der gelbe hingegen reines Quecksilberoxydhydrat. Ein Ueberschuss des Fällungsmittels löst die Niederschläge nicht auf. In sehr sauren Auflösungen tritt die Reaction entweder nicht, oder nur unvollständig ein; bei Gegenwart von Ammoniaksalzen entstehen weder rothbraune, noch gelbe, sondern weisse Niederschläge, basische Quecksilberoxyd-Ammoniakverbindungen.

4) *Ammoniak* bewirkt denselben weissen Niederschlag, welchen *Kali* bei Gegenwart von Ammoniaksalzen erzeugt.

5) *Zinnchlorür* bewirkt, in geringer Menge zu Quecksilberoxydsalzen gesetzt, eine Reduction zu Oxydul, in Folge welcher ein weisser Niederschlag von Quecksilberchlorür entsteht; im Ueberschuss zugefügt, entzieht es aber dem Quecksilber Sauerstoff und Säure oder den Salzbildner vollständig, es tritt wie bei dem Quecksilberoxydul eine Ausscheidung des Quecksilbers in metallischer Form ein. Der zuerst weisse Niederschlag wird daher grau und lässt sich durch Kochen mit Salzsäure zu Kügelchen vereinigen.

5) Zu metallischem *Kupfer* und mit *Soda* gemengt beim Erhitzen in einer Glasröhre verhalten sich die Quecksilberoxydsalze wie die des Oxyduls.

b. K u p f e r o x y d.

1) Die Kupferoxydsalze erleiden, mit Ausnahme des Kupfervitriols, welcher eine etwas höhere Temperatur verträgt, schon in gelinder Glühhitze eine Zersetzung. Sie haben im wasserfreien Zustande eine weisse, im wasserhaltigen eine blaue oder grüne Farbe, welche ihre Lösungen noch bei ziemlicher Verdünnung zeigen. Die neutralen Kupferoxydsalze sind meistens in Wasser löslich, die löslichen röthen Lackmus.

2) *Schwefelwasserstoff* und *Schwefelammonium* erzeugen unter allen Umständen braunschwarze Niederschläge von Kupfersulfid. Dasselbe löst sich weder in verdünnten Säuren, noch in kaustischen Alkalien. Heisse Lösungen von Schwefelkalium und Schwefelnatrium nehmen es ebenfalls nicht auf, in Schwefelammonium aber ist es kei-

neswegs ganz unlöslich, daher dieses Reagens zur vollkommenen Trennung des Kupfersulfids von anderen Schwefelmetallen nicht anwendbar ist. Von kochender concentrirter Salpetersäure wird das Schwefelkupfer leicht zersetzt und gelöst. Cyankaliumlösung nimmt es vollständig auf.

3) *Kali* bewirkt einen hellblauen voluminösen Niederschlag von Kupferoxydhydrat. Derselbe wird bei Kaliüberschuss, wenn die Lösungen sehr concentrirt sind, nach einiger Zeit schon in der Kälte, unter allen Umständen aber beim Kochen mit der Flüssigkeit, in der er suspendirt ist, schwarz und verliert seine voluminöse Beschaffenheit. Das Oxydhydrat geht dabei in Oxyd über.

4) *Ammoniak* bewirkt, in geringer Menge zugesetzt, einen grünlich blauen Niederschlag eines basischen Kupfersalzes. Derselbe löst sich in mehr zugesetztem Ammoniak sehr leicht zu einer vollkommen klaren, prächtig lasurblauen Flüssigkeit, welche ihre Farbe dem entstandenen basischen Kupferoxydammonialsalz verdankt. Diese Färbung ist nur bei grosser Verdünnung nicht mehr sichtbar. Kali bewirkt in einer solchen blauen Lösung in der Kälte erst nach längerem Stehen einen Niederschlag von blauem Oxydhydrat, beim Kochen aber wird dadurch der gesammte Kupfergehalt als schwarzes Oxyd gefällt. Kohlensaures Ammoniak zeigt zu Kupfersalzen dasselbe Verhalten, wie reines Ammoniak.

5) *Ferrocyankalium* erzeugt auch bei sehr grosser Verdünnung einen rothbraunen Niederschlag von Ferrocyankupfer. Derselbe ist in verdünnten Säuren unlöslich, von Kali aber wird er zersetzt.

6) *Metallisches Eisen* überzieht sich in Berührung mit Kupferlösungen, wenn diese concentrirt sind, fast augenblicklich, bei grosser Verdünnung aber erst nach einiger Zeit mit einem kupferrothen Ueberzug von metallischem Kupfer. Die Reaction ist höchst empfindlich, sie tritt am schnellsten ein, wenn die Lösung etwas freie Säure (Salzsäure) enthält.

7) Werden Kupferverbindungen mit *Soda* gemengt und im Kohlengrübchen der innern *Löthrohrflamme* ausgesetzt, so erhält man ohne gleichzeitigen Beschlag regulinisches Kupfer, das man stets am besten erkennt, wenn man die Masse sammt den sie umgebenden Kohlentheilchen in einem Mörserchen mit Wasser zerreibt und das Kohlenpulver abschlemmt. Die kupferrothen Metallflitterchen bleiben alsdann zurück.

c. W i s m u t h o x y d.

1) Die Wismuthsalze sind mit Ausnahme weniger (Chlorwismuth) nicht flüchtig, die meisten werden beim Glühen zersetzt. Sie sind farblos, in Wasser theils löslich, theils unlöslich. Die löslichen röthen im neutralen Zustande Lackmus und werden durch viel Wasser in lösliche saure und unlösliche basische Salze zerlegt.

2) *Schwefelwasserstoff* und *Schwefelammonium* bewirken unter allen Umständen schwarze, in verdünnten Säuren, in Alkalien, alkalischen Schwefelmetallen und Cyankalium unlösliche Niederschläge von Schwefelwismuth. Kochende concentrirte Salpetersäure zersetzt und löst es leicht.

3) *Kali* und *Ammoniak* fällen Wismuthoxydhydrat als weissen, im Ueberschuss der Fällungsmittel unlöslichen Niederschlag.

4) *Chromsaures Kali* schlägt chromsaures Wismuthoxyd als gelbes Pulver nieder. Dasselbe unterscheidet sich von chromsaurem Bleioxyd dadurch, dass es in verdünnter Salpetersäure löslich, in Kali unlöslich ist.

5) Die Reaction, welche das Wismuthoxyd besonders characterisirt, ist die Zerlegbarkeit seiner neutralen Salze durch *Wasser* in saure lösliche und basische unlösliche Salze. Wird nämlich eine Wismuthlösung mit vielem Wasser verdünnt, so entsteht, wenn keine zu grosse Menge freier Säure zugegen ist, sogleich ein blendend weisser Niederschlag. Bei Chlorwismuth ist die Reaction am empfindlichsten, indem das basische Chlorwismuth in Wasser fast absolut unlöslich ist. Entsteht in salpetersauren Lösungen, in Folge der Anwesenheit einer zu grossen Menge freier Säure, durch Wasser kein Niederschlag, so kann man ihn sogleich bewirken, wenn man durch Zusatz von überschüssigem Bleiessig die Säure abstumpft. Ehe man zu diesem Hilfsmittel greift, muss man sich natürlich von der Abwesenheit der Schwefelsäure u. s. w. überzeugen haben. Von den unter gleichen Umständen entstehenden basischen Antimonsalzen sind die Wismuthniederschläge durch ihre Unlöslichkeit in Weinsteinsäure leicht zu unterscheiden.

6) Werden Wismuthverbindungen mit *Soda* gemengt im Kohlengrübchen der *Reductionsflamme* ausgesetzt, so erhält man spröde, unter dem Hammer zerspringende Wismuthkörner. Gleichzeitig beschlägt sich die Kohle mit einem geringen gelben Anflug von Oxyd.

d. Cadmiumoxyd.

1) Die Cadmiumoxydsalze sind farblos oder weiß, meist in Wasser löslich. Die löslichen röthen im neutralen Zustande Lackmus und werden beim Glühen zersetzt.

2) *Schwefelwasserstoff* und *Schwefelammonium* bewirken unter allen Umständen lebhaft gelbe, in verdünnten Säuren, in Alkalien, alkalischen Schwefelmetallen und Cyankalium unlösliche Niederschläge von Schwefelcadmium. Kochende concentrirte Salpetersäure zersetzt es und löst es mit Leichtigkeit.

3) *Kali* bewirkt einen weißen, im Ueberschuss des Fällungsmittels unlöslichen Niederschlag von Cadmiumoxydhydrat.

4) *Ammoniak* schlägt ebenfalls weißes Oxydhydrat nieder, überschüssiges Ammoniak aber löst den Niederschlag wieder leicht und vollständig zur farblosen Flüssigkeit auf.

5) *Kohlensaures Kali* und *kohlensaures Ammoniak* bewirken weißse, im Ueberschuss der Fällungsmittel unlösliche Niederschläge von kohlensaurem Cadmiumoxyd. Ammoniaksalze verhindern die Fällung nicht.

6) Werden Cadmiumverbindungen mit *Soda* gemengt und im Kohlengrübchen der *Reductionsflamme* ausgesetzt, so beschlägt sich die Kohle, indem das reducirte Metall sogleich wieder verflüchtigt und beim Durchgang durch die äußere Flamme oxydirt wird, mit einem rothgelben Anflug von Cadmiumoxyd.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Die Metalloxyde der zweiten Abtheilung der fünften Gruppe können, wie angeführt, vom Quecksilberoxydul und Silberoxyd durch Salzsäure vollständig, vom Bleioxyd aber nur unvollständig geschieden werden. — Das Quecksilberoxyd ist von den anderen durch die Unlöslichkeit der ihm entsprechenden Schwefelungsstufe in kochender Salpetersäure unterschieden. Dieses Verhalten bietet ein bequemes Mittel zu seiner Trennung dar. Die Reactionen mit Zinnoxidul oder metallischem Kupfer, wie auch die auf trockenem Wege lassen es außerdem, wenn das Oxydul entfernt ist, mit Leichtigkeit erkennen.

Von den noch übrigen Oxyden unterscheiden sich die des Kupfers und Cadmiums dadurch, dass die in ihren Lösungen durch Ammoniak erzeugten Niederschläge im Uebermaße des Ammoniaks löslich sind, während die durch dieses Reagens in Blei- und Wismuthlösungen bewirkten Niederschläge sich im Ueberschuss des Fällungsmittels nicht lösen. Das Wismuthoxyd kann vom Bleioxyd

durch Schwefelsäure getrennt, an der Zersetzbarkeit seiner Salze durch Wasser aber am sichersten erkannt werden. Die weiteren Erkennungsmittel des Bleis sind bereits angeführt worden. Kupferoxyd und Cadmiumoxyd lassen sich durch kohlensaures Ammoniak trennen, ersteres ist besonders durch die Reactionen mit Ferrocyankalium und Eisen, wie auch durch das Löthrohrverhalten charakterisirt; das Cadmiumoxyd aber erkennt man stets an seiner gelben, in Schwefelammonium unlöslichen Schwefelverbindung und seinem eigenthümlichen Beschlag bei der Reduction auf Kohle. — Wegen einer Trennung der Oxyde der fünften Gruppe von einander mittelst Cyankalium siehe der zweiten Abtheilung zweiten Abschnitt.

§. 92.

Sechste Gruppe.

Goldoxyd, Platinoxid, Antimonoxyd, Zinnoxid, Zinnoxidul, Arsenige und Arseniksäure*).

Eigenschaften der Gruppe. Die den genannten Oxyden entsprechenden Schwefelungsstufen sind in verdünnten Säuren unlöslich. Mit alkalischen Schwefelmetallen verbinden sie sich zu löslichen Schwefelsalzen, in welchen sie die Rolle der Säure spielen. Es werden daher obgenannte Oxyde durch Schwefelwasserstoff aus angesäuerten Lösungen vollständig, aus alkalischen Lösungen aber nicht gefällt. Die niedergeschlagenen Schwefelmetalle lösen sich in Schwefelammonium, Schwefelkalium u. s. w. und werden durch Zusatz von Säuren aus diesen Lösungen wieder gefällt.

Wir bringen die Oxyde dieser Gruppe in zwei Abtheilungen und unterscheiden:

- 1) Solche, deren entsprechende Schwefelungsstufen in Salzsäure und in Salpetersäure unlöslich sind, nämlich Goldoxyd und Platinoxid;
- 2) Solche, deren entsprechende Schwefelverbindungen in Salzsäure oder Salpetersäure löslich sind. Die angeführten Oxyde des Antimons, Zinns und Arseniks.

*) Die beiden Arseniksäuren werden bei den Säuren noch einmal aufgeführt. Sie wurden den Metalloxyden deswegen angereiht, weil das Verhalten des Schwefelarsens sie leicht mit einigen Oxyden der sechsten Gruppe verwechseln lässt und weil man beim Gang der Analyse das Schwefelarsen stets mit Schwefelantimon, Schwefelzinn u. s. w. in einem Niederschlag erhält.

§. 93.

Erste Abtheilung.

Besondere Reactionen.

a. G o l d o x y d.

1) Sauerstoffsalze des Goldes sind noch so gut wie nicht bekannt. Die Haloidsalze sind gelb, ihre Lösungen zeigen diese Färbung bis zu grosser Verdünnung. Alle werden beim Glühen mit Leichtigkeit zerlegt, die löslichen röthen im neutralen Zustande Lackmus.

2) *Schwefelwasserstoff* fällt aus neutralen und sauren Lösungen alles Gold als schwarzes, in Kali und einfachen Säuren unlösliches, in alkalischen Schwefelmetallen und in Königswasser lösliches *Schwefelgold*.

3) *Schwefelammonium* bewirkt denselben Niederschlag. Ein ziemlich grosses Uebermaass des Fällungsmittels löst ihn wieder auf.

4) *Kali* im Ueberschuss bewirkt keine Fällung, wenig Kali aber erzeugt, besonders beim Erhitzen, in concentrirteren Lösungen einen röthlichgelben Niederschlag von *Goldoxyd*, dem immer *Goldoxydsalz* oder *Chlorgold*, sowie auch Kali beigemengt ist.

5) *Ammoniak* bewirkt ebenfalls nur in concentrirteren Lösungen röthlich gelbe Niederschläge von *Goldoxydammoniak* (*Knallgold*).

6) *Zinnchlorid* enthaltendes *Zinnchlorür* erzeugt auch in höchst verdünnten Goldlösungen einen purpurrothen, zuweilen mehr violetten oder ins Braunrothe neigenden Niederschlag oder eine solche Färbung von sogenanntem *Goldpurpur*, einer Verbindung von *Zinnoxid* mit metallischem Gold. Der Niederschlag ist in Salzsäure unlöslich.

7) *Eisenoxydulsalze* reduciren das *Goldoxyd* in seinen Lösungen und scheiden metallisches Gold in Gestalt eines höchst feinen braunen Pulvers, welches beim Drücken mit einer Messerklinge oder dgl. Metallglanz zeigt, daraus ab. Die Flüssigkeit, in welcher der Niederschlag suspendirt ist, erscheint bei durchfallendem Lichte schwärzlich blau.

b. P l a t i n o x y d.

1) Die *Platinoxydsalze* werden beim Glühen zerlegt. Sie haben eine rothbraune Farbe, welche ihre Lösungen bis zu bedeu-

tender Verdünnung zeigen. Die löslichen röthen im neutralen Zustande Lackmus.

2) *Schwefelwasserstoff* schlägt aus sauren und neutralen, nicht aber aus alkalischen Lösungen nach einiger Zeit schwarzbraunes Schwefel-Platin nieder. Kali und alkalische Schwefelmetalle lösen es, wenn sie in grossem Ueberschuss angewendet werden. In Salzsäure wie auch in Salpetersäure ist das Schwefelplatin unlöslich, Königswasser nimmt es leicht auf.

3) *Schwefelammonium* bewirkt denselben Niederschlag, von einem grossen Uebermase des Fällungsmittels wird er vollständig aufgenommen. Säuren fällen ihn aus dieser Lösung unverändert.

4) *Kali* und *Ammoniak* bewirken in nicht allzu verdünnten Platinlösungen gelbe, krystallinische, in Säuren unlösliche, im Ueberschusse der Fällungsmittel beim Erhitzen lösliche Niederschläge von Kalium- und Ammonium-Platinchlorid. Gegenwart von freier Salzsäure begünstigt, indem sie die Verwandlung der freien Alkalien in Chlormetalle bewirkt, die Fällung in hohem Grade.

5) *Zinnchlorür* bewirkt, in Folge einer Reduction des Oxyds oder Chlorids zu Oxydul oder Chlorür, eine intensive dunkelbraunrothe Färbung der Flüssigkeit, aber keinen Niederschlag.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Die Reactionen des Golds und Platins gestatten, wenigstens theilweise, sowohl eine Erkennung dieser Metalle bei Gegenwart vieler anderer Oxyde, als auch namentlich dann, wenn Platin und Gold sich in einer Lösung befinden. Als besonders charakteristische Reagentien für das Gold verdienen Zinnchlorür und Eisenoxydul, für das Platin aber Kali und Ammoniak bei Gegenwart von freier Salzsäure, oder was dasselbe ist, Chlorkalium und Chlorammonium genannt zu werden.

§. 94.

Zweite Abtheilung der sechsten Gruppe.

Besondere Reactionen.

a. A n t i m o n o x y d.

1) Die Salze des Antimonoxyds werden beim Glühen zum Theil zersetzt, die Haloidsalze verflüchtigen sich leicht und ohne Zerlegung. Die löslichen neutralen Antimonsalze röthen Lackmus. Die Lösung des Antimonoxyds in Salzsäure ist dadurch ausgezeich-

net, dass sie beim Verdünnen mit Wasser in der Art zersetzt wird, dass ein saures Salz gelöst bleibt, ein basisches aber als weißer voluminöser, nach einiger Zeit jedoch schwer und krystallinisch werdender Niederschlag sich abscheidet. Weinsteinsäure löst den Niederschlag mit Leichtigkeit, sie verhindert daher auch die Fällung, wenn sie vor dem Verdünnen mit Wasser zugesetzt wird. Durch dieses Verhalten unterscheidet sich das basische Antimonchlorür von den unter gleichen Umständen gebildeten basischen Wismuthsalzen. Das Antimonoxyd wird, auf welche Weise es auch bereitet sein mag, von heißer Weinsteinlösung vollständig aufgenommen.

2) *Schwefelwasserstoff* schlägt das Antimonoxyd aus neutralen Lösungen sehr unvollkommen, aus alkalischen nicht, aus sauren aber vollständig als orangerotes Antimonsulfür nieder. Der Niederschlag wird von Kali, und von alkalischen Schwefelmetallen, besonders wenn diese einen Ueberschuss an Schwefel enthalten, leicht, von Ammoniak fast nicht, von doppeltkohlensaurem Ammoniak aber, wenn er frei von eingemengtem Schwefel, sowie von antimonigem oder Antimon-Sulfid ist, gar nicht aufgenommen. In verdünnten Säuren ist er unlöslich. Concentrirte kochende Salzsäure löst denselben unter Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas. Beim Erhitzen an der Luft geht er in ein Gemenge von antimoniger Säure mit Schwefelantimon über. Wird er mit Salpeter verpufft, so erhält man schwefelsaures und antimonsaures Kali. Kocht man die kalische Auflösung des Antimonsulfürs mit Kupferoxyd, so entsteht Schwefelkupfer und in der Lösung bleibt Antimonoxyd in Kali gelöst.

3) *Schwefelammonium* bewirkt einen orangerothern Niederschlag von Antimonsulfür. Ein Uebermaß des Fällungsmittels nimmt ihn leicht auf. Säuren schlagen aus dieser Lösung das Schwefelantimon unverändert nieder. Seine Farbe erscheint jedoch alsdann gewöhnlich durch beigemengten Schwefel heller.

4) *Kali, Ammoniak, kohlensaures Kali und kohlensaures Ammoniak* schlagen aus den Lösungen einfacher Antimonoxydsalze, nicht aber, wenigstens nicht sogleich, aus der Lösung des Brechweinsteins oder analoger Verbindungen, weißes voluminöses Antimonoxydhydrat nieder, welches in einem Uebermaße von Kali leicht, im Ueberschusse der anderen Fällungsmittel aber sehr schwierig löslich ist.

5) *Metallisches Zink* scheidet aus allen Antimonoxydlösungen

wenn sie nicht freie Salpetersäure enthalten, metallisches Antimon als schwarzes Pulver ab. Enthalten sie aber freie Salpetersäure, so schlägt sich gleichzeitig mit dem Metall Antimonoxyd nieder.

6) Bringt man eine Auflösung von Antimonoxyd mit Zink und Schwefelsäure zusammen, so oxydirt sich das Zink nicht nur auf Kosten des Sauerstoffs aus dem Wasser, sondern auch auf Kosten dessen im Antimonoxyd. Antimon scheidet sich also metallisch ab, ein Theil desselben verbindet sich aber im Moment der Abscheidung mit Wasserstoff zu Antimonwasserstoffgas. Nimmt man diese Operation in einer Gasentbindungsflasche vor, verschließt die Oeffnung derselben mit einem Kork, in welchen der eine Schenkel einer Glasröhre gepasst ist, deren anderer in eine fein ausgezogene, am Ende abgekneipte Spitze ausgeht¹⁾ und entzündet, nachdem alle atmosphärische Luft ausgetrieben ist, das aus der feinen Oeffnung strömende Wasserstoffgas, so erscheint die Flamme durch das beim Verbrennen des Antimonwasserstoffs sich ausscheidende, in derselben glühende Antimon bläulichgrün; es erhebt sich daraus ein weißer Rauch von Antimonoxyd, der sich leicht an kalte Körper anlegt und von Wasser nicht gelöst wird. — Hält man aber einen kalten Körper, am besten eine Porzellanschale, in die Flamme, so setzt sich darauf das metallische Antimon höchst fein zertheilt, mit tielschwarzer Farbe, als fast glanzloser Fleck ab. — Erhitzt man die Glasröhre, durch welche das Gas strömt, in der Mitte zum Glühen, so verschwindet die bläulichgrüne Färbung der Flamme und man erhält gleichzeitig zu beiden Seiten der erhitzten Stelle in der Glasröhre einen silberglänzenden Metallspiegel von Antimon. Leitet man jetzt durch dieselbe Glasröhre einen ganz langsamen Strom trocknes Schwefelwasserstoffgas, und erhitzt den Spiegel mit einer einfachen Spirituslampe am besten von außen nach innen zu, also gegen die Richtung des Gasstroms, so verwandelt sich der Antimonspiegel in mehr oder weniger rothgelbes, in dicken Schichten fast schwarz erscheinendes Schwefelantimon. Führt man nun durch die nämliche Glasröhre einen schwachen Strom trocknen salzsauren Gases,

¹⁾ Bei genauen Prüfungen muss das Gas, um das Mitreißen von Feuchtigkeit in die Röhre, aus welcher es ausströmt, zu verhüten, durch eine weitere mit Baumwolle locker angefüllte Röhre geleitet werden. Vergleiche die zur Marsh'schen Arsenprüfung gehörige Abbildung. pag. 103.

so verschwindet das Schwefelantimon, wenn es in dünnen Schichten war, augenblicklich, wenn der Anflug dicker war, in wenigen Sekunden. Das Schwefelantimon setzt sich nämlich leicht mit dem Chlorwasserstoff um, und das entstehende Antimonchlorid ist in dem Strom des salzsauren Gases außerordentlich flüchtig. Leitet man denselben in etwas Wasser, so lässt sich in diesem die Gegenwart des Antimons mit Leichtigkeit durch Schwefelwasserstoff nachweisen. Durch diese Vereinigung von Reactionen ist das Antimon von allen anderen Metallen mit Sicherheit zu unterscheiden.

7) Setzt man mit *Soda* gemengte Antimonverbindungen im Kohlengrübchen der inneren *Löthrohrflamme* aus, so erhält man spröde Kügelchen von metallischem Antimon. Zugleich findet eine, selbst nach dem Entfernen der Probe aus der Flamme noch längere Zeit fortdauernde Verflüchtigung des reducirten und wieder oxydirten Metalles Statt, welche besonders hervortritt, wenn man mit dem Löthrohr einen Luftstrom auf die erkaltende Probe führt. Das gebildete Oxyd setzt sich theils an der Kohle als weißer Beschlag ab, theils umgiebt es das Metallkörnchen in Gestalt feiner Krystallnadeln.

b. Z i n n o x y d u l.

1) Die Zinnoxydulsalze werden beim Erhitzen zerlegt und sind farblos. Die löslichen röthen im neutralen Zustande Lackmus. Beim Behandeln derselben mit Wasser entsteht eine milchige Trübung, indem sich das neutrale Salz in saures lösliches und basisches unlösliches zersetzt. Zusatz von Salzsäure macht die entstandene Trübung verschwinden.

2) *Schwefelwasserstoff* fällt aus neutralen und sauren, nicht aber aus alkalischen, Lösungen dunkelbraunes Zinnsulfür. Dasselbe ist sowohl in Kali und alkalischen Schwefelmetallen, besonders höher geschwefelten, als auch in concentrirter kochender Salzsäure löslich. Kochende Salpetersäure verwandelt es in unlösliches Zinnoxyd.

3) *Schwefelammonium* bewirkt denselben Niederschlag von Zinnsulfür. Dasselbe löst sich im Ueberschuss des Fällungsmittels sehr schwierig auf. Ist das Schwefelammonium schon gelb geworden, enthält es also einen Ueberschuss von Schwefel, oder setzt man etwas fein gepulverten Schwefel zu, so erfolgt die Lösung weit leichter. Aus einer Lösung in solchem Schwefelammonium fallen Säuren alsdann gelbes Zinnsulfid gemengt mit Schwefel.

4) *Kali*, *Ammoniak*, *kohlensaures Kali* und *kohlensaures Ammoniak* fällen weißes voluminöses Zinnoxhydhydrat, welches von überschüssigem Kali leicht aufgenommen wird, im Uebermaße der anderen Fällungsmittel aber unlöslich ist.

5) *Goldchlorid* bewirkt in Zinnchlorür- oder Zinnoxhydullösungen, wenn denselben ohne zu erwärmen etwas Salpetersäure zugesetzt wird, einen Niederschlag oder eine Färbung von Goldpurpur, vergleiche §. 93. a. 6.

6) Wird zu Zinnchlorür- oder Zinnoxhydullösung *Quecksilberchloridsolution* im Ueberschuss gesetzt, so entsteht, indem das Zinnsalz dem Quecksilberchlorid die Hälfte seines Chlors entzieht, ein weißer Niederschlag von Quecksilberchlorür.

7) Werden Zinnoxhydverbindungen mit *Soda* und etwas *Borax* oder besser mit einem Gemenge von gleichen Theilen *Soda* und *Cyankalium* gemengt und im Kohlengrübchen der innern Löthrohrflamme ausgesetzt, so erhält man ohne gleichzeitigen Beschlag dehnbare Körnchen von metallischem Zinn. Man erkennt dieselben am besten, wenn man die Probe nebst den umgebenden Kohletheilen in einem Mörserchen mit Wasser heftig drückend reibt und die Kohle alsdann abschlemmt.

c. Z i n n o x y d.

1) Das Zinnoxyd erscheint in zwei in Bezug auf ihr Verhalten zu Lösungsmitteln verschiedenen Modificationen. Wird es nämlich aus seinen Salzen durch Alkalien niedergeschlagen, so löst es sich sowohl in Kali als auch in Säuren mit Leichtigkeit, wird es aber durch Oxydation des Metalls mit Salpetersäure dargestellt, so kann es ebensowenig wie das niedergeschlagene nach dem Glühen, durch die genannten Mittel aufgelöst werden. Durch Schmelzen mit Soda geht die unlösliche Modification in die lösliche über.

2) Die Zinnoxysalze werden beim Glühen zersetzt und sind farblos. Die löslichen röthen im neutralen Zustande Lackmus.

3) *Schwefelwasserstoff* fällt aus sauren und neutralen Lösungen, besonders beim Erhitzen, einen gelben Niederschlag von Zinnsulfid. Alkalische Lösungen werden nicht niedergeschlagen. Das Zinnsulfid löst sich in reinen, in einfach und doppelt kohlensauren Alkalien, in alkalischen Schwefelmetallen und in concentrirter kochender Salzsäure. Salpetersäure verwandelt es in unlösliches Zinnoxyd. Beim Verpuffen des Zinnsulfids mit

Salpeter erhält man schwefelsaures Kali und Zinnoxid-Kali. Kocht man die Lösung des Zinnsulfids in Kali mit Kupferoxyd, so bildet sich Schwefelkupfer und Zinnoxid, welches letztere in der kalischen Flüssigkeit gelöst bleibt.

4) *Schwefelammonium* bewirkt denselben Niederschlag von Zinnsulfid, ein Ueberschuss des Fällungsmittels nimmt ihn mit Leichtigkeit auf. Säuren scheiden aus dieser Lösung das Zinnsulfid wieder unverändert ab.

5) *Kali* und *Ammoniak*, *kohlensaures Kali* und *kohlensaures Ammoniak* schlagen weißes Zinnoxidhydrat nieder, welches von Kali und kohlensaurem Kali leicht, von Ammoniak schwieriger, von kohlensaurem Ammoniak nicht aufgenommen wird.

6) *Metallisches Zink* fällt aus Zinnchlorid oder Zinnoxidsalzlösungen, wenn dieselben keine freie Salpetersäure enthalten, metallisches Zinn in Gestalt grauer Blättchen oder als schwammartige Masse. Bei Gegenwart von Salpetersäure scheidet sich hingegen entweder nur weißes Oxyd oder ein Gemenge von Metall und Oxyd ab.


7) Vor dem Löthrohr verhalten sich die Zinnoxidverbindungen, wie die des Zinnoxids.

d. A r s e n i g e S ä u r e.

1) Die arsenige Säure verflüchtigt sich beim Erhitzen in weißen geruchlosen Dämpfen. Ihre Salze zerfallen beim Glühen meist in feuerbeständige arsensaure Salze und in Arsenik, der sich verflüchtigt. Von den arsenigsauren Salzen sind nur die mit alkalischer Base in Wasser löslich.

2) *Schwefelwasserstoff* schlägt die Lösung der arsenigen Säure und die ihrer neutralen Salze langsam und unvollständig, bei Gegenwart einer freien Säure augenblicklich und vollständig mit lebhaft gelber Farbe nieder. Alkalische Lösungen werden nicht gefällt. Der gelbe Niederschlag von arsenigem Sulfid (AsS_3) wird von reinen, von einfach und doppelt kohlensauren Alkalien, sowie von alkalischen Schwefelmetallen schnell und vollständig, von Salzsäure fast nicht aufgenommen. Kochende Salpetersäure zersetzt und löst ihn leicht. Beim Verpuffen desselben mit Soda und Salpeter erhält man arseniksaures und schwefelsaures Alkali. Beim Kochen einer kalischen Lösung des arsenigen Sulfids mit Kupferoxyd bildet sich Schwefelkupfer und arseniksaures Kali. Beim Kochen der gleichen Lösung mit reinem, kohlensaurem oder

basisch salpetersaurem Wismuthoxyd entsteht Schwefelwismuth und arsenige Säure. Mengt man Schwefelarsen mit drei bis vier Theilen Soda unter Zusatz von etwas Wasser, streicht die breiartige Masse auf kleine Glassplitterchen und erhitzt diese nach gutem Austrocknen in einer Glasröhre, durch welche trocknes Wasserstoffgas geleitet wird, rasch zum Glühen, so erhält man die Hälfte des ganzen Arsengehalts in Form eines Metallspiegels in der Glasröhre. Beim Zusammenschmelzen von 2 Aeq. arsenigem Sulfid und 4 Aeq. Natron entsteht nämlich Schwefelarsen-Schwefelnatrium und arsenigsaures Natron. Beim Erhitzen dieser Produkte in Wasserstoffgas aber wird die arsenige Säure des letzteren in Wasser und Arsenik zerlegt. Diese Methode giebt, obgleich man nur die Hälfte des Arsens als Metallspiegel bekommt, dennoch sehr genaue Resultate. Dem Apparat giebt man folgende Einrichtung:



a ist die Entwicklungsflasche, *b* eine Röhre mit Chlorcalcium, *c* die Röhre, in welcher bei *d* das Glassplitterchen mit dem Gemenge liegt. Man erwärmt dieses, wenn der Apparat vollständig mit reinem Wasserstoffgas erfüllt ist, erst ganz gelinde, um etwa noch vorhandene Feuchtigkeit zu entfernen, dann plötzlich sehr stark, am besten mit der Löthrohrflamme, um das Sublimiren unzersetzten Schwefelarsens zu verhüten. Bei *e* legt sich alsdann der Metallspiegel an.

3) *Schwefelammonium* bewirkt ebenfalls die Bildung von arsenigem Sulfid. Es scheidet sich dasselbe jedoch, wenn die Lösungen neutral oder alkalisch sind, nicht aus, sondern bleibt als Schwefelarsen-Schwefelammonium gelöst. Bei Zusatz freier Säure wird es aus dieser Lösung sogleich gefällt.

4) *Salpetersaures Silberoxyd* erzeugt in neutralen Lösungen


arsenigsaurer Salze, eben so wie *salpetersaures Silberoxyd-Ammoniak* in den Lösungen der arsenigen Säure, oder ihrer Salze, wenn sie eine freie Säure enthalten, einen gelben Niederschlag von arsenigsaurem Silberoxyd, welcher sowohl in verdünnter Salpetersäure, als auch in Ammoniak auflöslich ist.

5) *Schwefelsaures Kupferoxyd* und *schwefelsaures Kupferoxyd-Ammoniak* bewirken, unter denselben Umständen wie die Silber-salze, gelbgrüne Niederschläge von arsenigsaurem Kupferoxyd.

6) Löst man arsenige Säure in überschüssiger kaustischer Kalilauge, oder versetzt man die Lösung eines arsenigsauren Alkalis mit ätzendem Kali, fügt alsdann etwas weniges einer verdünnten Kupfervitriollösung hinzu und kocht, so bekommt man einen rothen Niederschlag von Kupferoxydul, in der Lösung hat man arsensaures Kali. Diese Reaction ist, wenn man nicht zu viel Kupferlösung nimmt, in hohem Grade empfindlich. Ist der rothe Niederschlag des Kupferoxyduls bei durchfallendem Lichte nicht mehr deutlich, so wird er doch, auch wenn er in geringster Menge zugegen ist, noch mit großer Deutlichkeit wahrgenommen, wenn man von oben in das Proberöhrchen sieht. Dass diese Reaction, so wichtig sie in einzelnen Fällen zur bestätigenden Prüfung auf arsenige Säure, vor allem aber zur Unterscheidung der arsenigen Säure von der Arsensäure ist, nicht als Mittel dienen kann, die Anwesenheit des Arsens geradezu zu erforschen, versteht sich von selbst, da ja Traubenzucker und andere organische Substanzen aus Kupfersalzen auf die nämliche Art Kupferoxydul abscheiden.

7) Bringt man eine saure oder neutrale Auflösung der arsenigen Säure oder irgend einer Verbindung derselben mit Zink, Wasser und Schwefelsäure zusammen, so bildet sich auf dieselbe Weise gasförmiges Arsenwasserstoff, auf welche sich bei Anwesenheit einer Antimonverbindung Antimonwasserstoffgas bildet. Vergleiche §. 94. a. 6. Dieses Verhalten des Arsens bietet uns ein zu seiner Ausmittlung äußerst empfindliches und zu seiner Abscheidung in hohem Grade wichtiges Mittel. Welchen dieser beiden Zwecke man nun auch erreichen will, man nimmt unter allen Umständen den Versuch in dem beim Antimon pag. 97 angegebenen und hier zu besserer Versinnlichung abgebildeten Apparate vor.

a ist das Entwicklungsgefäß, in welchem sich Zinkstück-



chen und Wasser befinden, *b* eine Trichterröhre, durch welche erst die Schwefelsäure und später die auf Arsen zu prüfende Flüssigkeit in die Flasche gebracht wird, *c* ist eine mit gestrichener Baumwolle locker angefüllte Glasröhre, in welche die zwischenkliche, an ihrem Ende *e* in eine Spitze ausgezogene und

vorn abgekneipte Glasröhre *d* mittelst eines durchbohrten Korkes gepasst ist. Wenn die Wasserstoffgasentwicklung eine geraume Zeit im Gange ist, so dass man sicher sein kann, dass aus dem Apparate alle atmosphärische Luft entfernt ist, entzündet man das Gas bei *e*, wobei die Vorsichtsmaßregel, zuvor ein Tuch um die Flasche zu schlagen, wodurch man sich bei etwaigen Explosionen vor Verletzung schützt, keineswegs zu verachten ist. Man muss sich jetzt zuerst mit Sicherheit überzeugen, dass weder das Zink noch die Schwefelsäure Arsen enthält, und dieses geschieht erstens, indem man eine Porzellanschale in der Art in die Flamme hält, dass sich diese auf der Fläche ausbreiten muss, und zweitens, indem man die Röhre *d e*, deren in der Figur nach oben gerichteter Schenkel bei diesem Versuche in wagerechte Lage gedreht wird, in der Mitte zum Glühen erhitzt. Zeigt sich weder an der Schale noch in der Röhre ein Anflug, so waren die angewandten Reagentien arsenfrei. Man gießt jetzt die zu prüfende Flüssigkeit durch die Trichterröhre in die Entwicklungsflasche. Enthält sie Arsen, so entwickelt sich alsbald gleichzeitig mit dem Wasserstoff Arsenwasserstoff, welcher die Flamme, in Folge des ausgeschiedenen, in der Flamme glühenden Arsens sogleich bläulich erscheinen lässt. Zu gleicher Zeit erhebt sich aus der Flamme ein weißer Rauch von arseniger Säure, welcher sich an kalte Körper anlegt. Hält man jetzt eine Porzellanschale in die Flamme, so setzt

sich das ausgeschiedene noch nicht wieder oxydirte Arsen, gerade so wie das Antimon (vergl. pag. 97) in Gestalt schwarzer Flecken ab. Die des Arsens sind jedoch mehr braunschwarz, stark glänzend, die des Antimons, wie angeführt, matt und tief schwarz. Erhitzt man die Röhre *d*, durch welche das Gas ausströmt, etwa in der Mitte ihres längeren Schenkels zum Glühen, so erhält man in dem kälteren Theil der Röhre einen besonders schönen und deutlichen Metallspiegel, welcher dunkler und weniger silberweiß ist, als der des Antimons, auch an dem eigenthümlichen, unten näher zu besprechenden knoblauchartigen Geruch erkannt werden kann, welcher sich verbreitet, wenn man die Röhre neben dem Anflug abschneidet und denselben sodann durch Erhitzen in die Luft verflüchtigt. Sicherer als an diesem Geruch prüft man den Anflug an dem Alkarsingeruch, den man auf die sub 9. zu erwähnende Art erzeugt. — Hat man durch einen an der Porzellanschale entstehenden Metallanflug Grund auf Arsen zu schliessen, so muss man sich auf jeden Fall noch näher überzeugen, ob der Anflug wirklich Arsen und nicht vielleicht Antimon sei, denn auch die auf den genannten Gerüchen beruhenden bestätigenden Prüfungen sind nicht hinreichend, um alle Zweifel zu beseitigen. Man wählt zu dieser Ueberzeugung am besten folgende Mittel.

1. Man erhitzt die Röhre, durch welche das Arsenwasserstoffgas streicht, in der Mitte zum Glühen und verschafft sich auf diese Art einen möglichst starken Metallspiegel. Man leitet alsdann einen ganz schwachen Strom trocknes Schwefelwasserstoffgas durch die Röhre und erhitzt den Metallspiegel mit einer einfachen Weingeistlampe von aussen nach innen zu. Man erhält dadurch, im Falle nur Arsen zugegen war, gelbes Schwefelarsen in der Röhre, im Falle nur Antimon anwesend ist, orangerotheres oder schwarzes Schwefelantimon, im Falle aber der Metallspiegel aus Arsen und Antimon bestanden hat, beide Schwefelmetalle neben einander in der Art, dass das Schwefelarsen als das flüchtigere sich immer vor dem minder flüchtigen Schwefelantimon befindet. Vor nicht langer Zeit wurde diese Umwandlung des Antimons und Arsens in Schwefelmetalle als sicherstes Mittel beide Metalle zu unterscheiden in Vorschlag gebracht. Die angegebenen Verschiedenheiten der genannten Schwefelverbindungen in Farbe und Flüchtigkeit sind jedoch nicht hervorstechend genug, um Irrungen ganz vorzubeugen, wie die Erfahrung gezeigt hat. Leitet man aber durch die Röhre mit dem Schwefelarsen, Schwefelantimon oder

mit der Mischung beider trocknes Chlorwasserstoffgas ohne zu erwärmen, so bleibt, wenn nur Schwefelarsen zugegen ist, Alles unverändert, auch wenn das Gas lange Zeit über das Schwefelarsen streicht. War nur Antimon zugegen, so verschwindet wie schon oben erwähnt, Alles aus der Röhre, war endlich Arsen und Antimon gleichzeitig vorhanden, so verflüchtigt sich das Schwefelantimon alsobald, das gelbe Schwefelarsen bleibt zurück. Zieht man jetzt etwas Ammoniak in das Köhrchen hinauf, so wird das Schwefelarsen gelöst und kann so leicht von etwa ausgeschiedenem Schwefel unterschieden werden. — Diese verschiedenen Reactionen in ihrer Vereinigung lassen eignen Versuchen zufolge über die Anwesenheit des Arsens nie in Zweifel.

2. Man richtet den Schenkel *e* wagrecht, entzündet das Gas und lässt die Flamme in einem etwa 12 Unzen fassenden Glaskölbchen brennen. Das Kölbchen legt man in ein Becherglas mit kaltem Wasser und dreht es fortwährend, so dass es sich nicht erhitzt. Nach einiger Zeit, wenn der Sauerstoff verzehrt ist, wenn demnach die Flamme nur noch schwach brennt, setzt man ein anderes Kölbchen an die Stelle des erstern und füllt auf diese Art mehrere. Dieselben enthalten jetzt entweder nur arsenige Säure, oder nur Antimonoxyd oder beides. Im ersteren Fall muss sich der erhaltene weißse Anflug vollständig in heißem Wasser lösen. Die Lösung kann mit Reagentien weiter geprüft werden. Im zweiten wird sich Nichts lösen, im dritten bleibt, wenn hinreichend Antimonoxyd zugegen ist, ebenfalls Alles ungelöst, indem sich arsenigsaures Antimonoxyd bildet. Man findet in einem solchen Rückstande alsdann das Arsen, indem man ihn in etwas verdünnter Kalilauge löst, Schwefelwasserstoff zusetzt und alsdann doppelt kohlensaures Ammoniak im Ueberschuss zufügt. Alles Antimon wird hierdurch als Schwefelantimon gefällt, das Schwefelarsen bleibt im Ueberschuss des doppelt kohlensauren Ammoniaks gelöst und fällt bei Zusatz von Salzsäure bis zur sauren Reaction nieder. —

Die Methode, das Arsen durch Erzeugung von Arsenwasserstoff zu entdecken, wurde von Marsh zuerst angegeben.

7) Wird arsenige Säure oder eine Verbindung derselben mit *kohlehaltiger Soda* gemengt und das völlig trockene Gemenge in einer am einen Ende verschlossenen, ausgezogenen, gut getrockneten Glasröhre über der Weingeistlampe von oben nach der ausgezogenen Spitze hin zum Glühen erhitzt, so oxydirt sich die Kohle auf Kosten des Sauerstoffs der arsenigen Säure, Arsen wird frei,

verflüchtigt sich und legt sich oberhalb der erhitzten Stelle als mehr oder weniger braunschwarzer, stark glänzender, Metallspiegel, der durch Hitze weiter getrieben und durch den Geruch beim Verflüchtigen an der Luft näher geprüft werden kann, an. Zur Reduction der freien arsenigen Säure wendet man statt der kohlehaltigen Soda einen bloßen Kohlensplitter an, in der Art, dass man die arsenige Säure in die ausgezogene Spitze wirft, das Splitterchen darüber schiebt, dieses zum Glühen bringt und dann die Spitze erhitzt. Der Vorzug dieses Verfahrens besteht darin, dass dabei die Glasröhre weniger leicht, als durch die kohlehaltige Soda, beschmutzt wird. Bevor man aus dem Nichterscheinen eines Metallspiegels beim Behandeln eines vermeintlichen arsenigsauren Salzes mit kohlehaltiger Soda auf die Abwesenheit des Arsens schließt, muss man sich immer durch einen Gegenversuch überzeugen, ob das vorliegende arsenigsaure Salz auch wirklich, auf die angegebene Art behandelt, einen Spiegel liefern kann; denn nicht aus allen Verbindungen (besonders aus einigen mit gewissen schweren Metalloxyden, z. B. Eisenoxyd) ist man im Stande, deutliche Spiegel zu bekommen.

8) Werden arsenigsaure Salze, arsenige Säure oder Schwefelarsen mit einem Gemenge von trockner Soda und Cyankalium zusammengeschmolzen, so wird unter allen Umständen alles Arsen und je nach der Natur der Basen auch diese reducirt, indem der Sauerstoff derselben einen Theil des Cyankaliums in cyansaures Kali verwandelt. — Man bringt die völlig trockne Arsenverbindung, wie schon oben erwähnt, in ein am einen Ende zu einer kleinen Kugel aufgeblasenes Glasröhrchen und überschüttet sie mit der sechsfachen Quantität des ebenfalls völlig trockenen Gemenges. Die Kugel darf dadurch nur etwas mehr als halb angefüllt werden, widrigenfalls das schmelzende Cyankalium sich leicht in der Röhre hinaufzieht. Die Reductionen erfolgen beim Erhitzen mit der Spirituslampe, wobei man nicht zu früh aufhören muss, indem es oft eine kleine Weile dauert, bis sich das Arsen vollständig sublimirt hat. Die Spiegel, welche man erhält, sind von ausgezeichneter Reinheit. Man bekommt sie aus allen den arsenigsauren Salzen, deren Basen entweder gar nicht oder zu solchen Arsenmetallen reducirt werden, die in der Hitze ihr Arsen theilweise oder ganz verlieren. Diese Methode, Arsenverbindungen mit Cyankalium zu reduciren, verdient wegen ihrer Einfachheit, wegen der Sicherheit ihres Resultats auch bei Gegenwart sehr kleiner Mengen

Arsenik und wegen der Reinlichkeit, mit welcher sie ausgeführt werden kann, ganz besonders hervorgehoben zu werden. — Vorzüglich geeignet ist sie zur directen Darstellung metallischen Arsens aus Schwefelarsen, in welcher Beziehung sie zweifelsohne alle bisher angegebenen Methoden an Einfachheit und Genauigkeit übertrifft.

9) Setzt man zu arseniger Säure in fester Form oder in Lösung etwas Essigsäure und dann Kali im Ueberschuss, verdampft zur Trockne und erhitzt den Rückstand in einem Röhrchen zum Glühen, so bildet sich Alkarsin (Kakodyloxyd, $C_4 H_6 As + O$), das sich durch seinen ebenso charakteristischen als furchtbaren Geruch sogleich zu erkennen giebt. Derselbe ändert sich alsbald in den nicht minder charakteristischen des Chlorkakodyls um, wenn man den geglühten Inhalt des Röhrchens mit einigen Tropfen Zinnchlorür erwärmt. Dieses Verhalten bietet uns, wie schon oben erwähnt, ebenfalls ein Mittel, mit dem Marsh'schen Apparat erhaltene Metallspiegel näher zu prüfen. Man kocht dieselben zu dem Ende mit lufthaltigem Wasser bis zur Auflösung, versetzt die Lösung mit Essigsäure und überschüssigem Kali, verdampft zur Trockne, glüht den Rückstand in einem Röhrchen und verfährt überhaupt wie eben angegeben. Diese Methode, Arsen Spiegel zu prüfen, ist von Bunsen vor Kurzem angegeben worden. Die Lösung von Arsenikspiegeln durch Kochen mit lufthaltigem Wasser erfolgt jedoch sehr langsam.

10) Wird arsenige Säure oder eine ihrer Verbindungen auf *Kohle* der innern *Löthrohrflamme* ausgesetzt, so verbreitet sich, besonders wenn der Probe noch etwas Soda zugesetzt wird, ein sehr charakteristischer, an den des Knoblauchs erinnernder Geruch, welcher in der Reduction und Wiederoxydation des Arsens seinen Grund hat und selbst sehr kleine Spuren desselben erkennen lässt. Diese Reaction kann nichts destoweniger wie alle, welche sich auf den Geruch gründen, zu Irrungen führen. Der knoblauchartige Geruch gehört weder den Dämpfen der arsenigen Säure, noch denen des Arsens, sondern wahrscheinlich einer niederen Oxydationsstufe des letzteren an. Er entsteht immer, wenn Arsenik bei Luftzutritt erhitzt wird.

e. A r s e n i k s ä u r e.

1) Die Arsensäure und ihre Salze sind bei nicht allzu heftigem Erhitzen nicht flüchtig. Die Salze sind farblos und mit Ausnahme der alkalischen in Wasser unlöslich.

2) *Schwefelwasserstoff* fällt alkalische und neutrale Lösungen nicht, in angesäuerten aber bringt es einen gelben Niederschlag von Arseniksulfid (AsS_5) hervor. Derselbe entsteht, wenn die Auflösungen irgend verdünnt sind, oft erst nach sehr langem Stehen, z. B. nach 24 Stunden. Seine Abscheidung wird durch Erwärmen begünstigt. Das Arseniksulfid verhält sich zu den beim arsenigen Sulfid angegebenen Lösungs- und Zersetzungs-Mitteln wie dieses. Fügt man zur Auflösung der freien oder gebundenen Arsensäure schweflige Säure, so setzt sich diese mit der Arsensäure um, es entsteht arsenige Säure und Schwefelsäure. Fügt man jetzt Schwefelwasserstoff und, wenn es nöthig ist, eine Säure zu, so wird augenblicklich aller Arsenik als arseniges Sulfid gefällt.

3) *Schwefelammonium* verwandelt in neutralen und alkalischen Lösungen die Arsensäure in Arsensulfid, welches als Arsensulfid-Schwefelammonium in Lösung bleibt. Durch Zusatz von Säure wird diese Verbindung zersetzt, das Arsensulfid scheidet sich ab. Die Abscheidung geht schneller vor sich, als aus sauren Lösungen durch Schwefelwasserstoff. Durch Erwärmen wird sie begünstigt.

4) *Salpetersaures Silberoxyd* und *salpetersaures Silberoxydammoniak* bewirken unter den bei der arsenigen Säure angegebenen Umständen sehr charakteristische rothbraune Niederschläge von arsensaurem Silberoxyd, welche in verdünnter Salpetersäure und in Ammoniak löslich sind.

5) *Schwefelsaures Kupferoxyd* und *schwefelsaures Kupferoxydammoniak* bewirken unter den bei der arsenigen Säure angeführten Umständen blaugrünliche Niederschläge von arsensaurem Kupferoxyd.

6) Zu *Wasserstoff*, zu *kohlehaltiger Soda*, zu *Cyankalium* und vor dem *Löthrohr* verhalten sich die arseniksauren Verbindungen wie die der arsenigen Säure.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Die Trennung und sichere Erkennung der in die zweite Abtheilung der sechsten Gruppe gehörenden Oxyde ist unter Umständen, besonders was das Zinn betrifft, mit Schwierigkeiten verbunden. Ist das Zinn als Oxydul vorhanden, so ist seine Erkennung leicht, die Reaction mit Goldchlorid lässt es auch bei Gegenwart anderer Oxyde mit Sicherheit erkennen. Eine Trennung des Zinnoxys vom Antimonoxyd ge-

lingt auf nassem Wege ziemlich vollständig durch heisse Weinsteinlösung oder auch durch eine Lösung von freier Weinsäure; sie gelingt aber nur dann, wenn sich das Zinnoxid in der Modification befindet, wie es durch Einwirkung von Salpetersäure auf Metall erhalten wird. Um es in dieselbe zu bringen ist also, im Falle man keine Legirung hat, eine Reduction mit Zink nöthig, wobei die Gegenwart von Salpetersäure sorgfältig zu vermeiden ist. Die Methode, die Schwefelverbindungen durch Ammoniak zu trennen, giebt stets zu Täuschungen Veranlassung, da die höheren Schwefelungsstufen des Antimons in Ammoniak löslich sind, und da auch das einfache Schwefelantimon darin nicht absolut unlöslich ist, wenn es mit einer Spur freiem Schwefel gemengt ist, welchem Umstande nicht leicht vorgebeugt werden kann. Die Gegenwart des Zinnoxids darf nur dann als gewiss angenommen werden, wenn man in der Reductionsflamme ein durch seine Fähigkeit, sich ausplatten zu lassen, vom Antimon zu unterscheidendes Zinnkorn erhalten hat. Diese Reduction gelingt mit Hülfe einer Mischung von gleichen Theilen Cyankalium und Soda überaus leicht; man hat jedoch dabei Sorge zu tragen, dass das Zinnoxid nicht etwa mit Salpeter, wodurch eine Verpuffung entsteht u. d. m. gemengt ist. — Vor dem Löthrohre lassen sich Zinnoxid und Antimonoxid auch neben einander erkennen, indem das Antimon durch seinen charakteristischen Oxydbeschlag, das Zinnoxid aber nach der Verflüchtigung des Antimons, wie erwähnt, durch seine Dehnbarkeit ausgezeichnet ist. Anfängern misslingt jedoch, wie die Erfahrung gelehrt hat, dieses Nebeneinandererkennen oft. Das Antimon ist außerdem an der Zersetzung des Chlorantimons durch Wasser und an der Farbe seiner Schwefelverbindung zu erkennen. Ist dem Schwefelantimon sehr viel Schwefelarsen beigemischt, so wird das letztere Kennzeichen unsicher. In solchem Falle kann man die gemengten Schwefelmetalle glühen, wobei das Schwefelarsen verflüchtigt wird, den Rückstand in Salzsäure lösen und diese Lösung neuerdings mit Schwefelwasserstoff prüfen. —

Die Auffindung des Arsens ist gewiss im Ganzen keineswegs schwierig zu nennen, nichtsdestoweniger kann man dabei häufige Täuschungen beobachten, besonders wenn bloß aus einzelnen Reactionen, z. B. dem Geruch beim Erhitzen auf Kohle, ohne Weiteres sichere Schlüsse gezogen werden. Beim Arsen muss daher als Regel aufgestellt werden, dass seine Gegenwart nur durch

das Zusammentreffen der verschiedenen Reactionen, besonders aber durch seine Darstellung in metallischer Form bewiesen wird. — Vom Zinn kann es durch Verpuffen der Schwefelverbindungen mit Soda und Salpeter ziemlich vollständig geschieden werden. Die Anwesenheit des Zinns ist im Uebrigen der Auffindung des Arsens nicht hinderlich. Anders verhält es sich mit dem Antimon, besonders in Bezug auf die jetzt so allgemein in Gebrauch gekommene Marsch'sche Methode. Ein durch dieselbe erhaltener Metallspiegel kann und darf daher nie einen Beweis für die Anwesenheit des Arsens abgeben, wenn man sich nicht durch nähere Prüfung auf gewisseste überzeugt hat, dass der Anflug wirklich von Arsen herühre. Diese Ueberzeugung ist bei ganz kleinen Mengen oft sehr schwierig zu erlangen, so dass die früher üblichen Reductionsmethoden in Bezug auf Sicherheit der Marsch'schen weit voranstehen, wenn gleich sie, wie nicht in Abrede zu stellen, ihr an Empfindlichkeit nicht gleichkommen und nicht so schnell und bequem zum Resultate führen.

Eine vollständige Trennung, also auch eine genaue Unterscheidung des Arsens und Antimons lässt sich durch doppelt kohlen-saures Ammoniak bewerkstelligen. Einfach Schwefelantimon ist nämlich darin absolut unlöslich, Schwefelarsen wird davon mit Leichtigkeit aufgenommen. Diese Methode der Unterscheidung giebt aber nur in wenigen Fällen positive Gewissheit, nämlich nur in denen, in welchen man bestimmt weiß, dass dem einfach Schwefelantimon weder eine höhere Schwefelungsstufe des Antimons, noch auch freier Schwefel beigemengt sein kann, in allen anderen Fällen giebt sie sehr leicht zu Irrungen Veranlassung. Sie ist also trefflich geeignet zur näheren Prüfung der mit dem Marsch'schen Apparate erhaltenen Verbrennungsproducte, siehe pag. 105.; zur Trennung der unter gewöhnlichen Umständen erhaltenen Schwefelmetalle lässt sie sich hingegen nicht anwenden. Noch weit weniger vollständig sind die Trennungen des Antimons vom Arsen, welche sich auf das Verhalten der Schwefelmetalle zu concentrirter Salzsäure oder kaustischem Ammoniak gründen. Auch durch Auflösen der Schwefelmetalle in Kali und Kochen der Lösung mit Kupferoxyd gelingt die Trennung beider Metalle nicht. Zu weit besserem Resultate führt das Verpuffen der Schwefelmetalle mit Soda und Salpeter, Behandeln der Masse mit Wasser und Zersetzen des im Filtrat in geringer Menge gelösten basisch antimonsauren Al-

kalis mit Salpetersäure. Man bekommt dadurch so ziemlich alles Antimon in unlöslicher, alles Arsen in löslicher Verbindung.

Bei den Reductionen arsenig- oder arsensaurer Salze mit kohlehaltiger Soda oder mit Cyankalium und Soda kann die Anwesenheit des Antimons nicht leicht einen Irrthum veranlassen. —

Die Unterscheidung der arsenigen Säure und der Arsensäure gelingt in wässrigen Lösungen am besten durch salpetersaures Silberoxyd. Lassen zugleich in der Lösung befindliche Substanzen die direkte Prüfung nicht zu, so fällt man mit Schwefelwasserstoff vollständig, löst die Schwefelmetalle in Kalilauge, kocht die Lösung mit reinem, kohlensaurem oder basisch salpetersaurem Wismuthoxyd, filtrirt von dem gebildeten Schwefelwismuth ab und prüft einen Theil des Filtrats nach der §. 94. d. 6. angegebenen Methode mittelst Kupfervitriol auf arsenige Säure, einen andern neutralisirt man mit Salpetersäure und prüft mit salpetersaurem Silber auf Arsensäure.

B. Verhalten der Säuren zu Reagentien.

§. 95.

Die Reagentien, welche zur Ausmittlung der Säuren dienen, zerfallen wie die, welche wir zur Auffindung der Basen benutzen, in allgemeine oder auf die Gruppe hindeutende und in specielle, das heisst solche, welche die einzelnen Säuren erkennen lassen. Die Bestimmung und Abgränzung der Gruppen lässt sich bei den Säuren kaum mit der Schärfe vornehmen, mit welcher dies bei den Basen möglich war.

Die zwei Hauptabtheilungen, in welche die Säuren zerfallen, sind die der unorganischen und die der organischen Säuren. Die Charakterisirung dieser Abtheilungen ist nicht leicht mit Bestimmtheit durchzuführen, denn wir können weder die ternäre Zusammensetzung als Kennzeichen organischer Säuren aufstellen, ohne z. B. die Kleesäure davon auszuschliessen, noch auch als Merkmal angeben, dass zur Bildung organischer Säuren die Lebenskraft mitwirken müsse, da diese Definition nicht allein über sehr viele Säuren, z. B. die Ameisensäure, Harnsäure u. s. w., keine bestimmte Entscheidung abgibt, sondern auch aller Wissenschaftlichkeit entbehrt, indem ja die Lebensprocesse im Pflanzen- und Thier-Körper nur modificirte chemische Processe sind. Das Kennzeichen, an das wir uns daher halten wollen, sei ein auf das

Verhalten der Säuren in höherer Temperatur gegründetes, demzufolge wir diejenigen Säuren zu den organischen rechnen, deren Salze (insbesondere die mit alkalischer und alkalisch erdiger Basis) beim Glühen unter Kohleabscheidung zersetzt werden. Es hat dieses Merkmal den Vorzug, dass es leicht in die Augen fällt und durch einen höchst einfachen vorläufigen Versuch sogleich über die Hauptabtheilung, in welche die Säure zu rechnen ist, Gewissheit gibt.

I. Unorganische Säuren.

Erste Gruppe.

Säuren, welche durch Chlorbarium aus neutralen Lösungen gefällt werden: Arsenige Säure, Arseniksäure, Chromsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Borsäure, Oxalsäure, Fluorwasserstoffsäure, Kohlensäure, Kieselsäure.

Wir bringen diese Gruppe der Uebersichtlichkeit wegen in vier Abtheilungen und unterscheiden:

- 1) Säuren, welche durch Schwefelwasserstoff in saurer Auflösung zerlegt werden, auf die man desswegen schon bei der Prüfung auf Basen hingewiesen wird, nämlich arsenige Säure, Arseniksäure und Chromsäure.
- 2) Säuren, welche durch Schwefelwasserstoff in saurer Auflösung nicht zersetzt werden und deren Barytverbindungen in Salzsäure unlöslich sind. Von den hier in Betracht kommenden Säuren gehört in diese Abtheilung nur die Schwefelsäure.
- 3) Säuren, welche von Schwefelwasserstoff in saurer Lösung nicht zerlegt werden und deren Barytverbindungen in Salzsäure ohne Zersetzung löslich sind: Phosphorsäure, Borsäure, Oxalsäure und Fluorwasserstoffsäure. (Die Oxalsäure wird, wenn gleich sie auch bei den organischen Säuren betrachtet werden soll, hier angeführt, weil das Verhalten ihrer Salze, beim Glühen ohne eigentliche Verkohlung zerlegt zu werden, sie leicht als organische Säure übersehen lässt.)
- 4) Säuren, welche von Schwefelwasserstoff in saurer Lösung nicht zerlegt werden und deren Barytsalze in Chlorwasserstoffsäure unter Zersetzung löslich sind: Kohlensäure, Kieselsäure.

Erste Abtheilung der ersten Gruppe der unorganischen Säuren.

§. 96.

a. Die arsenige Säure und die Arseniksäure werden, wie wir oben gesehen haben, durch Schwefelwasserstoff in der Art zersetzt, dass die denselben entsprechenden Schwefelungsstufen abgeschieden werden. Sie sind dieses Verhaltens wegen, welches eher eine Verwechslung derselben mit Metalloxyden als mit anderen Säuren veranlasst, bei den Basen aufgeführt worden, siehe §. 93.

b. Chromsäure.

1) Die chromsauren Salze sind alle roth oder gelb, größtentheils in Wasser unlöslich. Sie werden zum Theil beim Glühen zersetzt, die mit alkalischer Base sind feuerbeständig, in Wasser löslich; die Lösungen der neutralen chromsauren Alkalien sind gelb, die der sauren roth. Die Färbungen sind bis zu großer Verdünnung sichtbar. Die gelbe Farbe der Lösung eines neutralen Salzes geht bei Zusatz einer Mineralsäure in Folge der Bildung sauren Salzes in eine rothe über.

2) Schwefelwasserstoff reducirt die Chromsäure, sowohl wenn sie frei, als auch wenn sie gebunden in Lösung ist, in der Art, dass Chromoxyd, Wasser und Schwefelsäure gebildet werden und Schwefel sich abscheidet. Durch Erwärmen wird die Zersetzung begünstigt. Ist keine freie Säure vorhanden, so bleibt nur ein Theil des gebildeten Chromoxyds durch die gleichzeitig entstandene Schwefelsäure gelöst und man erhält einen grünlichgrauen Niederschlag, ein Gemenge von Chromoxydhydrat und Schwefel. Bei Anwesenheit von freier Säure aber erhält man einen weit geringeren Niederschlag von reinem Schwefel. In beiden Fällen färbt sich die Flüssigkeit durch das entstandene Chromoxydsalz grün.

3) Die Chromsäure kann auch durch Anwendung vieler anderer Mittel zu Oxyd reducirt werden, namentlich durch schweflige Säure, durch Erhitzen mit Chlorwasserstoffsäure, besonders bei Zusatz von Alkohol (wobei Chlorwasserstoffäther und Aldehyd entweichen), durch metallisches Zink, durch Erhitzen mit Weinsäure, Kleesäure u. s. w. Alle diese Reactionen sind durch den Uebergang der rothen oder gelben Farbe der Lösung in die grüne des Oxydsalzes sehr deutlich charakterisirt.

4) *Chlorbarium* erzeugt einen gelblichweissen, in Salzsäure und Salpetersäure löslichen Niederschlag von chromsaurem Baryt.

5) *Salpetersaures Silberoxyd* bringt einen dunkelpurpurrothen, in Salpetersäure und in Ammoniak löslichen Niederschlag von chromsaurem Silberoxyd hervor.

6) *Essigsaures Bleioxyd* fällt chromsaures Bleioxyd als gelben, in Kali löslichen, in verdünnter Salpetersäure schwer löslichen Niederschlag, dessen gelbe Farbe durch Ammoniak in eine rothe verwandelt wird.

7) Werden unlösliche chromsaure Salze mit kohlensaurem Natron und Salpeter geschmolzen und die Masse mit Wasser behandelt, so erhält man eine von dem darin gelösten chromsauren Alkali gelb gefärbte Lösung, welche bei Zusatz einer Säure roth wird. Die Oxyde bleiben rein oder als kohlensaure Salze zurück.

Bemerkungen. Die Chromsäure wird stets bei der Prüfung auf Basen als Chromoxyd gefunden, da sie ja durch Schwefelwasserstoff in dasselbe verwandelt wird. Eine weitere Untersuchung darauf ist häufig der charakteristischen Farbe der Lösung wegen kaum mehr nöthig. Hat man Grund auf Chromsäure zu schliessen und sind gleichzeitig Metalloxyde in Lösung, so zieht man die Reduction der Chromsäure mit Salzsäure und Alkohol der mit Schwefelwasserstoff vor. Die Reactionen mit Silber- und Bleisalzen geben in wässrigen Lösungen sichere Bestätigung.

Zweite Abtheilung der ersten Gruppe der unorganischen Säuren.

§. 97.

S c h w e f e l s ä u r e.

1) Die schwefelsauren Salze sind grossentheils in Wasser löslich, die unlöslichen sind meistens weiss, die löslichen im krystallisirten Zustande farblos. Die schwefelsauren Alkalien und alkalischen Erden werden beim Glühen nicht zersetzt.

2) *Chlorbarium* erzeugt in den Lösungen der Schwefelsäure und der schwefelsauren Salze bis zu ausserordentlicher Verdünnung einen feinpulverigen, schweren, weissen, in Salzsäure und Salpetersäure unlöslichen Niederschlag von schwefelsaurem Baryt.

3) *Essigsaures Bleioxyd* fällt schwefelsaures Bleioxyd

als schweren, weissen, in verdünnter Salpetersäure schwer löslichen, in heisser concentrirter Salzsäure vollständig löslichen Niederschlag.

4) Die in Wasser und Säuren unlöslichen Verbindungen der Schwefelsäure werden beim Schmelzen mit *kohlensauren Alkalien* in *kohlensaure Salze* verwandelt, während gleichzeitig schwefelsaures Alkali entsteht.

5) Die schwefelsauren Alkalien und alkalischen Erden werden schon für sich, leichter aber wenn sie mit kohlenhaltiger Soda gemengt sind, beim Glühen auf Kohle in der *innern Löthrohrflamme* zu Schwefelmetallen reducirt, welche an dem Geruch nach Schwefelwasserstoff erkannt werden, wenn man sie mit etwas Säure befeuchtet. Nimmt man dieses Befeuchten auf einem mit Bleisolution getränkten Papiere oder auf einem blanken Silberbleche (einer gescheuerten Münze) vor, so entsteht alsobald ein schwarzer Fleck von Schwefelblei oder Schwefelsilber.

Bemerkungen. Die Schwefelsäure ist durch die charakteristische und äusserst empfindliche Reaction mit Barytsalzen fast von allen Säuren am leichtesten zu erkennen. Man hat sich nur zu hüten, dass man nicht Niederschläge von Chlorbarium, besonders aber von salpetersaurem Baryt, welche entstehen, wenn wässrige Lösungen dieser Salze mit Flüssigkeiten, welche viel freie Salzsäure oder Salpetersäure enthalten, vermischt werden, für schwefelsauren Baryt hält. Diese Niederschläge verschwinden sogleich beim Verdünnen der sauren Flüssigkeit mit Wasser und sind daher vom schwefelsauren Baryt überaus leicht zu unterscheiden. — Durch ihr Verhalten zu Baryt könnte die Schwefelsäure möglicherweise mit Kieselfluorwasserstoffsäure verwechselt werden. Obgleich wir diese Säure nicht in den Kreis unserer Betrachtung aufgenommen haben, machen wir doch darauf aufmerksam, dass bei etwa entstehendem Zweifel über die Natur des Barytniederschlags das Behandeln desselben vor dem Löthrohr mit Soda und Kohle (vergleiche §. 97. 5.) sogleich zur Gewissheit führt.

Dritte Abtheilung der ersten Gruppe der unorganischen Säuren.

§. 98.

a. P h o s p h o r s ä u r e.

Wir handeln hier nur die dreibasische Phosphorsäure ab,

da sie und ihre Salze allein in der Pharmacie u. s. w. häufiger vorkommen; die einbasische und die zweibasische bleiben unberücksichtigt.

1) Die phosphorsauren Salze mit fixer Basis werden beim Erhitzen nicht vollständig zersetzt, sie können aber je nach dem Hitzgrade in pyro- oder meta-phosphorsaure Salze verwandelt werden. Von den phosphorsauren Salzen sind nur die mit alkalischer Base im neutralen Zustande in Wasser löslich. Die Lösungen reagiren alkalisch.

2) *Chlorbarium* bewirkt in den wässrigen Lösungen der neutralen oder basischen phosphorsauren Salze einen weissen, in Salzsäure und Salpetersäure löslichen, in Chlorammonium schwer löslichen Niederschlag von phosphorsaurem Baryt.

3) *Gypssolution* bringt in neutralen oder alkalischen Lösungen einen weissen Niederschlag von phosphorsaurem Kalk hervor, der von Säuren, selbst von Essigsäure leicht gelöst wird.

4) *Chlormagnesium* oder *schwefelsaure Magnesia* bewirken in neutralen oder alkalischen Lösungen weisse Niederschläge von *phosphorsaurer Magnesia*, die jedoch nur bei concentrirteren Lösungen, besonders nach dem Erhitzen sichtbar werden. Setzt man aber zu der Lösung freies oder kohlensaures *Ammoniak*, so bildet sich auch bei sehr bedeutender Verdünnung ein weisser, krystallinischer, leicht zu Boden sinkender Niederschlag von basisch phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde, der weder in Ammoniak noch in Chlorammonium löslich ist, von Säuren aber, selbst von Essigsäure leicht aufgenommen wird. Der Niederschlag wird öfters erst nach einiger Zeit sichtbar, Umrühren begünstigt seine Abscheidung, siehe oben §. 86. d. 5.

5) *Salpetersaures Silberoxyd* fällt aus den Lösungen der neutralen und basischen phosphorsauren Alkalien phosphorsaures Silberoxyd ($\text{PO}_5, 3\text{AgO}$) als hellgelben Niederschlag. War in der Lösung ein basisch phosphorsaures Salz enthalten, so reagirt die Flüssigkeit, in der der Niederschlag suspendirt ist, neutral, war ein neutrales Salz aufgelöst, so reagirt sie sauer, weil die Salpetersäure für die 3 Aequivalente Silberoxyd, welche sie an die Phosphorsäure abgiebt, nur 2 Aeq. Alkali und 1 Aeq. Wasser (welches letztere ihre sauren Eigenschaften nicht aufhebt) erhält.

6) *Essigsaures Bleioxyd* bewirkt in neutralen oder alkalischen Lösungen einen weissen, in Salpetersäure leicht, in Essigsäure fast nicht löslichen Niederschlag von phosphorsaurem Bleioxyd

welcher durch sein Verhalten vor dem Löthrohre ein treffliches Erkennungsmittel für die Phosphorsäure abgiebt. Er wird nemlich erstens beim Erhitzen auf der Kohle auch in der innern Flamme nicht oder doch nur mit größter Schwierigkeit reducirt und ist zweitens dadurch ausgezeichnet, dass die in der Oxydationsflamme farblose, durchsichtige Perle beim Erkalten durch Krystallisation unklar wird und meistens ganz deutliche dodekaëdrische Flächen zeigt.

7) Fügt man zu der salzsauren Lösung einer phosphorsauren alkalischen Erde *Eisenchlorid* im Ueberschuss und dann *Ammoniak* bis zu beginnender alkalischer Reaction, so erhält man einen voluminösen, mehr oder weniger dunkelen, rothbraunen Niederschlag, der ein Gemenge von Eisenoxydhydrat und basisch phosphorsaurem Eisenoxyd ist. Ammoniak entzieht demselben nur etwas Phosphorsäure, Schwefelammonium aber zerlegt ihn vollständig zu Schwefeleisen und phosphorsaurem Ammoniak. — Bei Anwendung von einer unzulänglichen Menge Eisenchlorid erhält man einen weissen Niederschlag von neutralem phosphorsaurem Eisenoxyd, der sich in Ammoniaküberschuss löst.

b. B o r s ä u r e.

1) Die wässrige Lösung der Borsäure röthet Lackmus, bräunt aber Curcunapapier. Die borsaurigen Salze werden beim Glühen nicht zersetzt, in Wasser leicht löslich sind nur die mit alkalischer Basis. Die Lösungen sind farblos und zeigen alle, selbst die der sauren Salze, alkalische Reaction.

2) *Chlorbarium* giebt in nicht zu verdünnten Lösungen borsauriger Salze einen weissen, in Säuren und Ammoniaksalzen löslichen Niederschlag von borsaurem Baryt.

3) *Salpetersaures Silberoxyd* bringt in concentrirteren Lösungen borsauriger Salze einen weissen, in Salpetersäure und Ammoniak löslichen Niederschlag von borsaurem Silberoxyd hervor.

4) Setzt man zu sehr concentrirten, warm bereiteten Lösungen borsauriger Salze *Schwefelsäure* oder *Salzsäure*, so scheidet sich beim Erkalten die *Borsäure* in glänzenden Krystallblättchen aus.

5) Uebergießt man freie Borsäure oder borsaurige Salze mit *Alkohol* und setzt im letzteren Falle *Schwefelsäure* zu, um die Borsäure frei zu machen, so erscheint die Flamme des angezündeten Alkohols, besonders beim Umrühren, durch die mit dem Alkohol verdampfende, in der Flamme glühende Borsäure sehr deutlich

gelbgrün gefärbt. Am empfindlichsten wird die Reaction, wenn man das Schälchen, welches die Mischung enthält, erwärmt, den Alkohol anzündet, kurze Zeit brennen lässt, ausbläst und wieder entzündet. Beim ersten Aufflackern der Flamme erscheinen alsdann ihre Ränder grün, auch wenn die Menge der Borsäure so gering ist, dass sich auf die gewöhnliche Weise keine Färbung der Flamme bemerken lässt.

c. Oxalsäure.

1. Die oxalsauren Salze werden sämmtlich beim Glühen zer-
setzt, indem die Säure in Kohlensäure und Kohlenoxyd zerfällt. Die mit alkalischer und alkalisch erdiger Basis verwandeln sich dabei (wenn sie rein sind ohne Abscheidung von Kohle) in kohlen-
saure Salze; die mit metallischer Base lassen, je nach der Reducir-
barkeit des Metalloxyds, reines Metall oder Oxyd zurück. Von den
Salzen der Oxalsäure sind die alkalischen, auch einige mit metalli-
scher Base in Wasser löslich.

2) *Chlorbarium* bewirkt in den neutralen Lösungen oxal-
saurer Salze einen weissen, in Salpetersäure und Salzsäure lösli-
chen Niederschlag von oxalsaurem Baryt, der in Ammoniak-
salzen weniger löslich ist, als der borsaure Baryt.

3) *Salpetersaures Silberoxyd* bringt in gleichbeschaffenen Lö-
sungen einen weissen, in Salpetersäure und Ammoniak löslichen
Niederschlag von oxalsaurem Silberoxyd hervor.

4) *Kalkwasser* und alle löslichen *Kalksalze*, also auch *Gyps-
solution*, erzeugen in den Lösungen der freien und gebundenen
Oxalsäure, auch wenn dieselben in hohem Grade verdünnt sind,
weisse, feinpulverige Niederschläge von oxalsaurem Kalk, die
in Salzsäure und Salpetersäure leicht, in Oxalsäure und Essigsäure
fast nicht löslich sind. Ammoniaksalze verhindern ihre Entstehung
in keiner Weise. Zusatz von Ammoniak begünstigt die Fällung
der freien Oxalsäure durch Kalksalze bedeutend.

5) Wird Oxalsäure oder ein oxalsaures Salz in trockenem
Zustande mit überschüssiger *concentrirter Schwefelsäure* erwärmt,
so entzieht diese der Oxalsäure das zu ihrem Bestehen nothwen-
dige Wasser, die Oxalsäure zerfällt in Kohlensäure und Koh-
lenoxyd, welche Gase unter Aufbrausen entweichen. War der
Versuch nicht in zu kleinem Mafsstabe angestellt worden, so lässt
sich das entweichende Kohlenoxydgas anzünden; es brennt mit
blauer Flamme. Färbt sich die Schwefelsäure bei dieser Reaction

dunkel, so enthielt die Oxalsäure eine organische Substanz beigemischt.

d. Fluorwasserstoffsäure.

1) Die Fluorwasserstoffsäure unterscheidet sich von allen übrigen Säuren durch ihre Fähigkeit die unlösliche Modification der Kieselsäure, sowie die in Salzsäure unlöslichen kieselsauren Salze aufzulösen. Bei der Auflösung entsteht Fluorsilicium, während gleichzeitig Wasser gebildet wird. In gleicher Art setzt sich die Fluorwasserstoffsäure mit Metalloxyden um, es entstehen Fluormetalle und Wasser. Von den Fluormetallen sind die, welche ein Alkalimetall enthalten, in Wasser löslich; die den alkalischen Erden entsprechenden lösen sich nicht oder sehr schwierig in Wasser. Fluoraluminium ist leicht löslich. Von den Oxyden der schweren Metalle entsprechenden Fluoriden sind die meisten in Wasser sehr schwer löslich, z. B. Kupferfluorid, Fluorblei, Fluorzink; viele andere lösen sich in Wasser ohne Schwierigkeit, als Eisenfluorid, Zinnfluorür, Quecksilberfluorid u. a. m. — Von den in Wasser unlöslichen oder schwer löslichen Verbindungen sind manche in freier Flusssäure löslich, andere nicht. — Beim Glühen im Tiegel erleiden die meisten Fluormetalle keine Zersetzung.

2) Setzt man der wässrigen Auflösung der Fluorwasserstoffsäure oder eines Fluormetalles Chlorcalcium zu, so erhält man Fluorcalcium in Gestalt eines gelatinösen Niederschlags, der so durchscheinend ist, dass man von Anfang oft glaubt, die Flüssigkeit sei klar geblieben. Zusatz von Ammoniak trägt zur vollkommenen Abscheidung des Niederschlags bei. Derselbe ist in Chlorwasserstoffsäure und Salpetersäure, eben so in alkalischen Flüssigkeiten in der Kälte unlöslich, beim Kochen mit Salzsäure löst sich eine Spur auf. In freier Fluorwasserstoffsäure ist er kaum löslicher, als in Wasser.

3) Mengt man irgend ein feingepulvertes Fluorid mit gestossenem Glas oder zerriebenem Sand und übergießt das Gemenge in einem Proberöhrchen mit concentrirter Schwefelsäure, so entwickelt sich beim Erwärmen Kieselfluorgas, welches an der Luft (wenn sie feucht ist) starke weiße Nebel bildet. Leitet man das Gas mittelst einer auf das Proberöhrchen aufgesetzten Schenkelföhre in Wasser, so scheidet sich Kieselsäure in Form einer Gallerte aus, während die Flüssigkeit von entstandener Kieselfluorwasserstoffsäure stark sauer wird. Vergl. §. 43.

4. Vermischt man die Lösung eines Fluormetalles mit Schwefelsäure, übergießt mit der sauren Flüssigkeit eine mit einer dünnen Wachsschicht überzogene Glasplatte (man bereitet eine solche, indem man etwas Wachs auf der Platte schmilzt und gleichförmig darauf herumfließen lässt), auf der man an einzelnen Stellen das Glas durch Einzeichnen mit einem nicht zu harten Körper, am besten einer Holzspitze, bloßgelegt hat und lässt die Flüssigkeit eintrocknen, so erscheinen die Zeichnungen nach Wegnahme des Wachses (man erwärmt die Platte bis zum Schmelzen des Ueberzugs, wischt mit einem Tuche ab und entfernt den Rest des Wachses mit Terpen- tinöl) mehr oder weniger geätzt. — Hat man sehr kleine Mengen, so verdampft man die genannte saure Lösung in einem Uhrglase bei gelinder Wärme zur Trockne; nach Wegnahme der Salzmasse mit Wasser erscheint alsdann die innere Fläche matt.

5) Uebergießt man ein fein zerriebenes Fluormetall, gleichgültig ob es löslich oder unlöslich ist, in einem Platintiegel mit concentrirter Schwefelsäure, bedeckt denselben mit einer mit Wachs überzogenen, überhaupt wie oben zugerichteten Glasplatte, erwärmt den Tiegel mit der Vorsicht, dass das Wachs auf der Platte nicht schmilzt und lässt dieselbe eine viertel oder halbe Stunde mit den Dämpfen in Berührung, so erscheinen nach Wegnahme des Wachses die Zeichnungen geätzt. War die Menge der durch die Schwefelsäure entbundenen Flusssäure sehr gering, so sieht man oft, wenn das Wachs entfernt ist, die Zeichnung nicht mehr, haucht man jedoch alsdann das Glas an, so werden dadurch, in Folge einer ungleichen Fähigkeit der geätzten und der nicht angegriffenen Stellen das Wasser zu verdichten, die Zeichnungen wieder sichtbar.

Bemerkungen. Die dritte Abtheilung umfasst, wie angegeben worden, die Phosphorsäure, die Borsäure, die Oxalsäure und die Fluorwasserstoffsäure; die Barytverbindungen dieser Säuren werden, wie wir gesehen haben, von Salzsäure ohne Zersetzung gelöst, Alkalien scheiden sie daher, indem sie die Salzsäure neutralisiren, unverändert wieder ab. Ein gleiches Verhalten zeigen die Barytverbindungen der arsenigen Säure, der Arsensäure und der Chromsäure, welche Säuren daher, wenn sie zugegen sind, entfernt werden müssen, bevor man aus einer solchen Wiederausscheidung eines Barytsalzes einen Schluss auf die Anwesenheit der Phosphorsäure, Bor-

säure, Oxalsäure oder Flusssäure machen kann. Aber auch abgesehen davon, ist auf diese Reaction nicht einmal zur Erkennung der genannten Säuren, noch weit weniger aber zu ihrer Abscheidung von anderen Säuren ein grosser Werth zu legen, da die in Rede stehenden Barytsalze, besonders der borsaure Baryt aus ihren Lösungen in Salzsäure durch Ammoniak nicht wieder präcipitirt werden, wenn die Menge der vorhandenen freien Säure irgend bedeutend war, oder wenn überhaupt ein Ammoniaksalz in einiger Menge zugegen ist. — Die Borsäure lässt sich durch die Färbung, welche sie der Alkoholflamme mittheilt, immer erkennen, wenn man nur Sorge trägt, dass die Lösungen vor dem Zusatz des Alkohols gehörig eingeengt und, im Falle man ein borsaures Salz hat, mit einer genügenden Menge Schwefelsäure (am besten concentrirter) versetzt werden. War die Borsäure frei vorhanden, so muss man sie bei dem Eindampfen ihrer Auflösung an ein Alkali binden, widrigenfalls sich ein grosser Theil derselben mit den Wasserdämpfen verflüchtigt. — Die Phosphorsäure ist durch den gelben Silberniederschlag, durch das eigenthümliche Verhalten der basisch phosphorsauren Ammoniak-Talkerde, besonders durch die Unlöslichkeit derselben in Salmiak und endlich durch das Löthrohrverhalten des phosphorsauren Bleies genügend charakterisirt. Zur Zersetzung ihrer Salze mit alkalisch erdiger Basis bietet, nachdem dieselben in Salzsäure gelöst worden, Eisenchlorid unstreitig das beste Mittel. — Die Oxalsäure lässt sich durch Gypslösung stets leicht erkennen, wenn man nur ins Auge fasst, dass der dadurch entstandene Niederschlag durch Zusatz von Essigsäure nicht verschwinden darf, (Unterschied von der Phosphorsäure), in verdünnter Salzsäure aber leicht löslich sein und beim Glühen in kohlensauren Kalk übergehen muss (Unterschied von der Flusssäure). Die oxalsauren alkalischen Erden lassen sich durch Kochen mit kohlensaurem Natron vollständig zersetzen. — Die Fluorwasserstoffsäure endlich kann nicht leicht mit anderen Säuren verwechselt werden, man erkennt sie unter allen Umständen am sichersten an ihrer Eigenschaft, das Glas zu ätzen. Die empfindlichsten Resultate erhält man stets beim Uebergiessen fester Fluoride mit concentrirter Schwefelsäure.

Vierte Abtheilung der ersten Gruppe der unorganischen Säuren.

§. 99.

a. K o h l e n s ä u r e.

1) Die kohlensauren Salze verlieren zum Theil beim Glühen ihre Kohlensäure. Alle, deren Oxyde ungefärbt erscheinen, sind weiß oder farblos. In Wasser löslich sind im neutralen Zustande nur die mit alkalischer Basis. Ihre Lösungen reagiren sehr stark alkalisch. Als saure kohlensaure Salze lösen sich außer denen mit alkalischer auch die mit alkalisch erdiger und mehrere mit metallischer Basis.

2) Die kohlensauren Salze werden von allen freien in Wasser löslichen Säuren, mit Ausnahme der Cyanwasserstoffsäure und Schwefelwasserstoffsäure, zersetzt, wobei die Kohlensäure als farbloses, fast geruchloses, Lackmus vorübergehend röthendes Gas unter Aufbrausen entweicht. Man hat dabei, besonders aber bei der Zersetzung von Salzen mit alkalischer Basis einen Ueberschuss der Säure anzuwenden, indem beim Zusatze einer geringen Menge Säure in Folge der Bildung saurer kohlensaurer Salze oft kein Aufbrausen entsteht.

3) *Kalk* und *Baryt-Wasser* geben, wenn sie mit Kohlensäure oder löslichen kohlensauren Salzen zusammenkommen, weißse Niederschläge von neutralem kohlensaurem Kalk oder Baryt. Bei Prüfung auf freie Kohlensäure hat man stets einen Ueberschuss der Reagentien anzuwenden, da ja die sauren kohlensauren alkalischen Erden in Wasser löslich sind. Die entstandenen Niederschläge lösen sich in Säuren unter Aufbrausen und werden, nach der vollständigen Austreibung der Kohlensäure durch Aufkochen, von Ammoniak nicht wieder gefällt.

4) *Chlorcalcium* und *Chlorbarium* bringen mit neutralen kohlensauren Alkalien sogleich, mit doppelt kohlensauren erst beim Kochen Niederschläge von kohlensaurem Kalk oder Baryt hervor. Mit freier Kohlensäure entsteht keine Fällung.

b) K i e s e l s ä u r e.

1) Die Kieselsäure kommt in zwei Modificationen vor, in der einen ist sie in Wasser und Säuren löslich, in der andern wird sie nur von der Flusssäure angegriffen. Die lösliche Modification geht beim Erhitzen in die unlösliche über. Wird die unlösliche

Modification mit reinen oder kohlelsauren Alkalien geschmolzen, so erhält man ein in Wasser lösliches basisch kieselsaures Alkali, aus welchem Säuren die Kieselsäure in löslicher Modification abscheiden. Durch Kochen mit Kalilauge wird die lösliche Modification leicht, die unlösliche sehr langsam aufgenommen. Von den kieselsauren Salzen sind nur die alkalischen in Wasser löslich.

2) Die Lösungen der kieselsauren Alkalien werden von allen Säuren zersetzt; sind die Auflösungen sehr concentrirt, so scheidet sich die Kieselsäure in gallertartigen Flocken aus, sind sie verdünnter, so bleibt sie aufgelöst. Dampft man eine solche mit Säure (Salzsäure oder Salpetersäure) versetzte Auflösung zur Trockne ab, so geht die Kieselsäure aus der löslichen Modification in die unlösliche über und bleibt daher als weisses, zwischen den Zähnen knirschen- des Pulver zurück, wenn man die abgedampfte Masse mit Wasser behandelt.

3) In den kieselsauren Salzen mit erdiger oder metallischer Basis ist die Kieselsäure ebenfalls entweder in löslicher oder in unlöslicher Modification enthalten. Im ersteren Falle werden sie von kochender Salz- oder Salpetersäure zersetzt, die Kieselsäure scheidet sich als Hydrat gallertartig aus, die Basis verbindet sich mit der angewandten Säure. Im andern Falle sind die genannten Säuren ohne Wirkung und zur Trennung der Kieselsäure von der Basis müssen die Salze entweder auf nassem Wege mit Flusssäure behandelt, oder mit kohlelsauren Alkalien geschmolzen werden.

4) Soda löst in der Löthrohrflamme die Kieselsäure in grosser Menge zu einem farblosen, beim Erkalten durchsichtig bleibenden Glase, zu kieselsaurem Natron auf. Die Kohlensäure entweicht dabei unter Aufbrausen. Die Ursache, warum Anfänger häufig keine klare Perle zu Stande bringen, ist gewöhnlich die, dass im Verhältniss zur Probe zu viel Soda genommen wird.

5) Phosphorsalz löst die Kieselsäure fast nicht auf. Sie schwimmt in der klaren Perle als unklare Masse herum und wird daher leichter in der glühenden, als in der erkalteten Perle wahrgenommen. Ein gleiches Verhalten zeigen die kieselsauren Salze, welchen das Phosphorsalz unter Abscheidung der Kieselsäure die Basen entzieht. Diese letzteren lösen sich auf, die erstere bleibt ungelöst.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Die Kohlensäure erkennt man meistens sehr leicht daran, dass ihre Salze, mit Säuren übergossen, fast geruchloses Gas entwickeln. Hat man Verbindungen, aus welchen sich gleichzeitig andere Gase entwickeln, so leitet man das Gas in Kalk- oder Baryt-Wasser. — Die Kieselsäure wird, wenn man sie in löslicher Modification, in welche sie immer übergeführt werden muss, hat, unter allen Umständen durch Uebersättigen ihrer Verbindungen mit Salzsäure, Abdampfen, Behandeln des Rückstandes mit Wasser und Prüfung des Ungelösten vor dem Löthrohr erkannt.

Zweite Gruppe der unorganischen Säuren.

Säuren, welche nicht von Chlorbarium, wohl aber von salpetersaurem Silberoxyd gefällt werden: Chlorwasserstoffsäure, Bromwasserstoffsäure, Jodwasserstoffsäure, Cyanwasserstoffsäure, Schwefelwasserstoffsäure.

§. 100.

Die Silberverbindungen der genannten Säuren sind sämmtlich in verdünnter Salpetersäure unlöslich. Die Säuren dieser Gruppe setzen sich mit Metalloxyden in der Art um, dass Verbindungen der Metalle mit Metalloiden gebildet werden, während sich gleichzeitig der Sauerstoff des Oxyds mit dem Wasserstoff der Säure zu Wasser vereinigt.

a. Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure).

1) Die Chlormetalle sind mit Ausnahme des Chlorbleis, Chlorsilbers und Quecksilberchlorürs in Wasser leicht löslich; die meisten sind weifs oder farblos. Viele verflüchtigen sich in der Hitze ohne Zersetzung; viele werden beim Glühen zerlegt, wenige sind feuerbeständig.

2) Freie Salzsäure und Lösungen von Chlormetallen geben mit *salpetersaurem Silberoxyd* auch bei sehr grosser Verdünnung weisse, am Licht erst violett, dann schwarz werdende, in Salpetersäure nicht, in Ammoniak mit Leichtigkeit lösliche, beim Erhitzen ohne Zersetzung schmelzende Niederschläge von Chlorsilber. Vergl. §. 90. a. 4.

3) *Salpetersaures Quecksilberoxydul* und *essigsaures Bleioxyd* bewirken in Lösungen, welche freie Salzsäure oder Chlormetalle

enthalten, Niederschläge von Quecksilberchlorür und Chlorblei. Die Eigenschaften dieser Niederschläge siehe oben §. 90. b. 4. und §. 90. c. 4.

4) Erwärmt man Chlormetalle mit *Braunstein* und *Schwefelsäure*, so entwickelt sich Chlorgas, welches an seiner gelbgrünen Farbe und seinem Geruche leicht erkannt wird.

5) Reibt man ein Chlormetall mit *chromsaurem Kali* zusammen, übergießt das Gemenge in einem Tubulatretörtchen mit *concentrirter Schwefelsäure* und erwärmt gelinde, so entwickelt sich ein tief braunrothes Gas (chromsaures Chromsuperchlorid, $\text{CrCl}_3 + 2\text{CrO}_5$) in reichlicher Menge, welches sich zu einer gleichgefärbten Flüssigkeit verdichtet und in die Vorlage übergeht. Vermischt man dieses chromsaure Chromsuperchlorid mit überschüssigem Ammoniak, so erhält man eine von chromsaurem Ammoniak gelb gefärbte Flüssigkeit, deren gelbe Farbe bei Zusatz von Säure, in Folge der Bildung sauren chromsauren Ammoniaks, rothgelb wird.

b. Bromwasserstoffsäure.

1) Die Brommetalle haben im Allgemeinen, was Löslichkeit und Verhalten in der Hitze betrifft, eine große Aehnlichkeit mit den Chlormetallen.

2) *Salpetersaures Silberoxyd* bewirkt in den wässrigen Lösungen des Bromwasserstoffs oder der Brommetalle einen gelblich-weißen Niederschlag von Bromsilber, der in verdünnter Salpetersäure unlöslich, in Ammoniak etwas schwer löslich ist.

3) *Salpetersäure* zersetzt beim Erhitzen die Bromwasserstoffsäure und die Brommetalle und macht, indem sie den Wasserstoff oder das Metall oxydirt, das Brom frei. Dasselbe färbt, im Falle man eine Lösung hatte, dieselbe gelbroth, im Falle aber das Brommetall in fester Form vorhanden war, entweichen gelbrothe, chlorartig riechende Dämpfe von Bromgas, welche sich bei genügender Menge im kälteren Theile des Proberöhrchens zu kleinen Tropfen verdichten.

4) *Chlorgas* oder *Chlorwasser* machen das Brom in den Lösungen seiner Verbindungen ebenfalls frei, wobei die Flüssigkeit eine gelbrothe Farbe annimmt, wenn die Menge des Broms nicht zu gering war. Schüttelt man eine solche Lösung mit etwas Aether, so wird sie, im Falle sie gelb war, farblos; alles Brom hat man in dem Aether gelöst, welcher auch bei sehr kleinen

Spuren von Brom noch deutlich gelb erscheint. Schüttelt man die ätherische Bromlösung mit etwas Kalilauge, so verschwindet die gelbe Farbe, man hat Bromkalium und bromsaures Kali in Lösung. Dampft man ab und glüht, so geht das bromsaure Kali in Bromkalium über. Die geglühte Masse kann alsdann nach 5. weiter geprüft werden.

5) Werden Brommetalle mit Braunstein und Schwefelsäure erhitzt, so entwickeln sich gelbrothe Dämpfe von Brom. Bei sehr geringen Brommengen ist die Farbe der Dämpfe nicht sichtbar. Man nimmt alsdann den Versuch in einer kleinen Retorte vor und leitet die übergelenden Dämpfe durch eine lange Kühlröhre von Glas in kleine Probecylinder, in welchen etwas Stärkemehl enthalten ist; denn kommt

6) Feuchtes Stärkemehl mit freiem Brom, gleichgültig ob es gelöst ist oder Gasform hat, zusammen, so bildet sich gelbes Bromamylum. Die Färbung tritt nicht immer gleich ein. Am empfindlichsten ist die Reaction, wenn man die Proberöhrchen, in welchen die mit der zu prüfenden Flüssigkeit übergossene Stärke enthalten ist, vor der Lampe zuschmilzt und umstürzt, so dass die Flüssigkeit unten, die feuchte Stärke oben ist. Die geringste Spur Brom bewirkt alsdann, dass das Amylum nach zwölf oder vierundzwanzig Stunden gelb wird. Die Färbung verschwindet bei längerem Stehen wieder.

7) Uebergießt und erwärmt man ein Gemenge von Brommetall und chromsaurem Kali mit Schwefelsäure, so entwickelt sich gerade wie bei Chlormetallen ein braunrothes Gas. Dasselbe ist jedoch reines Brom, daher die übergelende Flüssigkeit beim Uebersättigen mit Ammoniak nicht gelb, sondern farblos wird.

c. J o d w a s s e r s t o f f s ä u r e.

1) Die Jodmetalle entsprechen ebenfalls in vieler Beziehung den Chlormetallen. Von denen, welche schwere Metalle enthalten, sind jedoch weit mehr in Wasser unlöslich. Viele zeigen eigenthümliche Färbungen.

2) *Salpetersaures Silberoxyd* bewirkt in den wässrigen Lösungen des Jodwasserstoffs und der Jodmetalle gelblichweisse, am Licht sich schwärzende Niederschläge von Jodsilber, welche in verdünnter Salpetersäure nicht, in Ammoniak sehr schwierig auflöslich sind.

3) Eine Lösung von ein Theil *Kupfervitriol* und zwei und

ein Viertel *Eisenvitriol* fällt aus den wässerigen, neutralen Lösungen der Jodmetalle Kupferjodür in Gestalt eines schmutzig-weißen Niederschlages. Zusatz von etwas Ammoniak begünstigt die vollständige Ausfällung des Jods. Chlor- und Brom-Verbindungen werden durch das genannte Reagens nicht niedergeschlagen.

4) *Salpetersäure* zersetzt die Jodwasserstoffsäure und die Jodmetalle ebenso wie die Bromverbindungen. Farblose Lösungen des Jodwasserstoffs oder der Jodmetalle werden daher durch *Salpetersäure* sogleich schon in der Kälte braungelb gefärbt, aus concentrirten Lösungen scheidet sich Jod als schwarzer Niederschlag aus, während Stickoxydgas unter Aufbrausen entweicht. Feste Jodmetalle aber entwickeln beim Erhitzen mit *Salpetersäure* neben dem Stickoxydgas violetten Joddampf, der sich an den kälteren Theilen des Gefäßes zu einem schwärzlichen Sublimat verdichtet.

5) *Chlorgas* und *Chlorwasser* machen das Jod in seinen Verbindungen ebenfalls frei, ein Ueberschuss derselben aber bindet es wieder zu farblosem Chlorjod.

6) Erhitzt man Jodmetalle mit concentrirter *Schwefelsäure* oder mit *Schwefelsäure* und *Braunstein*, so wird in beiden Fällen Jod frei, welches an der violetten Farbe seines Gases leicht erkannt wird. Im ersteren Falle entwickelt sich gleichzeitig schweflige Säure. Ist die Menge des Jods sehr gering, so lässt es sich an der Farbe seines Gases nicht mehr erkennen und man muss alsdann zur Nachweisung desselben die sogleich anzugebende Reaction mit Amylum wählen.

7) Setzt man zu einer Jodlösung, zur Lösung der Jodwasserstoffsäure oder eines Jodmetalls, wenn man in den letzteren durch Zusatz von *Salpetersäure* das Jod frei gemacht hat, dünnen *Stärkekleister*, so entsteht auch bei den kleinsten Spuren von Jod eine mehr oder weniger schwarzblaue Färbung oder ein solcher Niederschlag von Jodamylum. Will man zum Freimachen des Jods *Chlorwasser* anwenden, so muss man dasselbe sehr behutsam zusetzen, da bei einem Ueberschusse desselben in Folge der Bildung von *Chlorjod* die blaue Färbung nicht oder wenigstens erst dann eintritt, wenn man Schwefelwasserstoff, Zinnchlorür oder ein anderes Reductionsmittel zusetzt. Am sichersten findet man auch die kleinsten Spuren Jod mittelst Amylum in trocknen Verbindungen jeder Art, wenn man sie in einem Kolben mit concentrirter *Schwefelsäure* übergießt und denselben mit einem Stöpsel locker verschließt, an dem ein feuchtes mit Stärkemehl bestreutes oder mit

Stärkekleister bestrichenen Papierstreifchen oder besser ein so zubereitetes Streifchen weissen Baumwollenzug's befestigt ist. Dasselbe erscheint nach einigen Stunden blau, wenn auch nur ein Minimum von Jod zugegen war.

8) Zu chromsaurem Kali und Schwefelsäure (vergl. §. 100. a. 5.) verhalten sich die Jodmetalle gerade so wie zu Schwefelsäure allein.

d. Cyanwasserstoffsäure.

1) Von den Cyanmetallen sind die mit alkalischem und alkalisch erdigem Radikal in Wasser als cyanwasserstoffsäure (blausäure) Salze löslich. Sie werden von Säuren, selbst von Kohlensäure, leicht, durch Glühen beim Abschluss der Luft nicht zerlegt. Beim Schmelzen mit Blei-, Kupfer-, Antimon-, Zinn-Oxyd und vielen anderen Oxyden reduciren sie dieselben und gehen selbst in cyansaure Salze über. Von den Cyanverbindungen, welche schwere Metalle enthalten, sind nur wenige in Wasser löslich; alle werden beim Glühen zersetzt. Sie zerfallen dabei entweder, wie die Cyanverbindungen der edlen Metalle, in Cyangas und Metall, oder wie die der anderen schweren Metalle in Stickgas und Kohlenmetall. Viele Verbindungen des Cyans mit schweren Metallen werden von verdünnten Sauerstoffsäuren nicht, von concentrirter Salpetersäure schwierig zersetzt. Salzsäure und Schwefelwasserstoff aber zerlegen die meisten leicht und vollständig. — Mit einigen Metallen (Eisen, Mangan, Kobalt, Chrom) verbindet sich das Cyan zu zusammengesetzten Radikalen, in welchen diese Metalle durch viele der gewöhnlichen Methoden nicht entdeckt werden können.

2) *Salpetersaures Silberoxyd* bewirkt in den Lösungen der freien Blausäure und der blausauren Alkalien weisse, in Cyankalium leicht, in Ammoniak etwas schwierig, in verdünnter Salpetersäure nicht lösliche Niederschläge von Cyansilber, welche beim Glühen zerlegt werden und reines Silber zurücklassen.

3) Setzt man zur Lösung eines blausauren Alkalis mit der Luft einige Zeit in Berührung gewesene *Eisenoitriol-* (*Eisenoxyduloxyd*) *Lösung*, so entsteht ein Niederschlag oder eine Färbung von Berlinerblau, vergl. oben §. 88 f. 5. Freie Blausäure muss also, wenn man sie auf diese Art erkennen will, erst an ein Alkali gebunden werden. Ist Alkali im Ueberschuss zugegen, so wird ausser dem Berlinerblau Eisenoxyduloxydhydrat gefällt, es muss in solchem Falle dieses erst durch Salzsäure aufgelöst werden, wenn die blaue Farbe des Niederschlags rein erscheinen soll.

3) Setzt man zu einer Lösung von Blausäure Kali im Ueberschuss und sodann feingepulvertes *Quecksilberoxyd*, so löst sich dieses mit Leichtigkeit ebenso wie in freier Blausäure auf. Da sich Quecksilberoxyd nur bei Anwesenheit von Cyanwasserstoff in einer alkalischen Flüssigkeit auflösen kann, so lässt sich aus dieser Reaction die Gegenwart der Blausäure mit Sicherheit erkennen.

4) In dem Cyanquecksilber lässt sich das Cyan durch die bisher angegebenen Methoden nicht entdecken. Um es in dieser Verbindung aufzufinden, setzt man der Lösung derselben Salzsäure und metallisches Eisen zu. Hierdurch wird Quecksilber regulinisch ausgeschieden, Cyanwasserstoffsäure und Eisenchlorür (welches an der Luft theilweise in Chlorid übergeht) gebildet. Setzt man der Flüssigkeit alsdann Alkali zu, so bildet sich Berlinerblau, dessen Farbe jedoch erst nach Zusatz von Salzsäure, welche den Ueberschuss des vorhandenen Eisenoxyduloxydhydrats wegnimmt, rein hervortritt. — Auch durch Schwefelwasserstoff lässt sich das Cyanquecksilber leicht zerlegen. Es setzt sich damit zu Schwefelquecksilber und Blausäure um. — Beim Erhitzen zerfällt das Cyanquecksilber, wie schon aus 1) hervorgeht, in Quecksilber und Cyangas, welches letztere an seiner eigenthümlichen Wirkung auf die Geruchsorgane erkannt werden kann.

5) In den Ferro- und Ferrid-Cyanmetallen mit alkalischer Basis lässt sich die Gegenwart dieser zusammengesetzten Radikale bei den ersteren durch *Eisenoxydul-* oder *Kupferlösung*, bei den letzteren durch *Eisenoxydulösung* leicht nachweisen. Durch Destillation mit Schwefelsäure erhält man daraus Blausäure im freien Zustande. Die unlöslichen Ferrocyan- und Ferridcyan-Verbindungen werden durch Erhitzen mit kohlensaurem oder kautischem Kali zersetzt, es entsteht Ferrocyankalium und die Metalle scheiden sich als kohlensaure oder reine Oxyde ab.

e. Schwefelwasserstoffsäure.

1) Von den Schwefelmetallen sind nur die alkalischen und alkalisch erdigen in Wasser löslich. Dieselben werden, ebenso wie die, welche Metalle der vierten (der Eisen-Mangan-etc.) Gruppe enthalten, von verdünnten Mineralsäuren unter Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas, welches an seinem Geruche und an seiner Wirkung auf Bleilösung (siehe 2.) leicht erkannt wird, zersetzt. War die Schwefelverbindung eine höhere, so scheidet sich gleichzeitig ein weißer Niederschlag von feinzertheiltem Schwefel aus,

der an seiner Brennbarkeit von ähnlichen Niederschlägen zu unterscheiden ist. Die Schwefelmetalle der 5ten und 6ten Gruppe werden zum Theil von kochender concentrirter Salzsäure unter Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas, zum Theil nicht von Salzsäure, wohl aber von concentrirter kochender Salpetersäure gelöst. Die Verbindungen des Schwefels mit Quecksilber widerstehen beiden Säuren, lösen sich aber leicht in Königswasser. Bei den Lösungen der Schwefelmetalle in Salpetersäure und Königswasser wird Schwefelsäure gebildet und meistens außerdem Schwefel, welcher an Farbe und Verhalten beim Erhitzen leicht erkannt wird, abgeschieden.

2) Kommt Schwefelwasserstoff in Lösung oder in Gasform mit *salpetersaurem Silberoxyd* oder *essigsäurem Bleioxyd* zusammen, so entstehen schwarze Niederschläge von Schwefelsilber oder Schwefelblei, siehe oben §. 89. a. und §. 89. c. Genügt daher der Geruch nicht zur Entdeckung des Schwefelwasserstoffs, so kann man sich durch diese Reagentien aufs sicherste von seiner Anwesenheit überzeugen. Ist er in Gasform, so bringt man in die zu prüfende Luft ein mit Bleisolution befeuchtetes Papierstreifchen, welches die Gegenwart des Schwefelwasserstoffs zu erkennen giebt, indem es sich mit einem braunschwarzen, glänzenden Häutchen von Schwefelblei bedeckt.

3) Werden Schwefelmetalle in der äußern *Löthrohrflamme* erhitzt, so verbrennt der Schwefel darin mit blauer Flamme und unter Verbreitung des bekannten Geruches der schwefligen Säure.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Von den Säuren der ersten Gruppe werden die meisten durch salpetersaures Silberoxyd ebenfalls gefällt. Diese Niederschläge können jedoch mit den Silberverbindungen, welche die Säuren der zweiten Gruppe bilden, nicht verwechselt werden, da jene in verdünnter Salpetersäure löslich, diese darin unlöslich sind. Die Anwesenheit der Hydrothionsäure verhindert die Prüfung auf die anderen Säuren der zweiten Gruppe mehr oder weniger, es muss daher diese Säure, im Falle sie zugegen ist, erst entfernt werden, bevor man die Prüfung auf die übrigen vornehmen kann. Es geschieht diese Entfernung, wenn die Hydrothionsäure in freiem Zustande zugegen ist, durch bloßes Aufkochen, wenn sie an ein Alkali gebunden ist, durch Zusatz eines Metallsalzes, welches die anderen Säuren nicht oder nicht aus saurer Lösung fällt. — Jod- und Cyan-Wasserstoff-

säure können auch bei Anwesenheit der Chlor- und Brom-Wasserstoffsäure durch die ebenso empfindlichen als charakteristischen Reactionen mit Amylum und Eisenoxyduloxydlösung erkannt werden. Die Erkennung des Chlors und Broms aber ist bei Anwesenheit von Jod und Cyan mehr oder minder schwierig. Es müssen daher diese letzteren, wenn sie zugegen sind, abgeschieden werden, bevor man auf Chlor und Brom prüfen kann. Die Abscheidung des Cyans gelingt leicht, wenn man die gesamten Silberverbindungen glüht. Cyansilber wird zersetzt, Chlor-, Brom- und Jod-Silber erleiden keine Zerlegung. Das Jod kann vom Brom und Chlor durch Behandeln der Silberverbindungen mit Ammoniak abgeschieden werden, da das Jodsilber darin fast unlöslich ist. Genauer ist die Scheidung, wenn man es als Kupferjodür fällt, wobei Chlor und Brom in Lösung bleiben. Das Brom erkennt man neben dem Chlor, wenn die Verbindungen beider mit Salzsäure und Chlorkalk oder mit Chlorwasser versetzt werden und das freigewordene Brom mit Aether aufgenommen wird. Das Chlor erkennt man neben Brom durch die Reaction mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure.

Dritte Gruppe der unorganischen Säuren.

Säuren, welche weder von Baryt- noch von Silbersalzen gefällt werden: Salpetersäure, Chlorsäure.

§. 101.

a. Salpetersäure.

1) Die neutralen Salze der Salpetersäure sind sämmtlich in Wasser löslich; in Wasser unlöslich sind nur einige basische salpetersaure Verbindungen. In starker Glühhitze werden alle salpetersauren Salze zersetzt. Die mit alkalischer Basis liefern Sauerstoffgas und Stickgas, die anderen Sauerstoff und salpetrige Säure.

2) Wirft man ein salpetersaures Salz auf *glühende Kohlen* oder bringt man Kohle oder einen organischen Körper, z. B. Papier, zu einem schmelzenden salpetersauren Salz, so entsteht eine *Verpuffung*, das heißt, die Kohle verbrennt auf Kosten des Sauerstoffs der Salpetersäure mit lebhaftem Funkensprühen.

3) Mischt man ein salpetersaures Salz mit gepulvertem Cyankalium und erhitzt das Gemenge auf dem Platinblech, so entsteht eine lebhaftere, mit deutlicher Feuererscheinung und schwachem Knall

verbundene Verpuffung. Diese Reaction lässt selbst sehr kleine Mengen salpetersaurer Salze erkennen.

4) Versetzt man die Auflösung eines salpetersauren Salzes mit dem vierten Theil concentrirter Schwefelsäure und wirft einen Krystall von *schwefelsaurem Eisenoxydul* in die Mischung, so färbt sich die Flüssigkeit, welche den Krystall zunächst umgiebt, dunkelbraun. Die Färbung verschwindet meistens schon beim Umschütteln, immer aber nach längerem Erhitzen. — Die Salpetersäure wird nemlich von dem Eisenoxydul zersetzt, drei Fünftheile ihres Sauerstoffs treten zu dem Oxydul und verwandeln einen Theil desselben in Oxyd, das übrigbleibende Stickstoffoxyd vereinigt sich mit dem noch nicht höher oxydirten Eisenoxydulsalz zu einer eigenthümlichen Verbindung, welche sich in Wasser mit braunschwarzer Farbe löst.

5) Fügt man zur Auflösung eines salpetersauren Salzes etwas Schwefelsäure und so viel *schwefelsaure Indigolösung*, dass die Flüssigkeit schwach hellblau erscheint, und erhitzt die Mischung zum Kochen, so verschwindet die blaue Farbe, indem sich der Indigo auf Kosten des Sauerstoffs der durch die Schwefelsäure freigemachten Salpetersäure oxydirt; die Flüssigkeit wird schwach gelblich oder farblos. Einige andere Substanzen, namentlich freies Chlor bewirken ebenfalls Entfärbung, worauf man besondere Rücksicht zu nehmen hat.

5) Mengt man ein salpetersaures Salz mit *Kupferfeile* und übergießt das Gemenge in einem Proberöhrchen mit concentrirter Schwefelsäure, so färbt sich die Luft in dem Röhrchen gelbroth, indem sich das bei der Oxydation des Kupfers durch die Salpetersäure frei werdende Stickstoffoxydgas mit dem Sauerstoff der Atmosphäre zu salpetriger Säure vereinigt.

b. C h l o r s ä u r e.

1) Die chlorsauren Salze sind sämmtlich in Wasser löslich. Beim Glühen derselben entweicht ihr gesamfter Sauerstoff, Chlormetalle bleiben zurück.

2) Mit *Kohle* oder einem organischen Körper erhitzt, verpuffen die chlorsauren Salze und zwar mit weit größerer Heftigkeit als die salpetersauren.

3) Mengt man ein chlorsaures Salz mit *Cyankalium* und erhitzt das Gemenge auf einem Platinblech, so entsteht eine auch bei sehr

kleinen Mengen mit starkem Knall und Feuererscheinung verbundene Verpuffung.

4) Freie Chlorsäure oxydirt und entfärbt den *Indigo* gerade wie Salpetersäure; mischt man daher die Lösung eines chlorsauren Salzes mit Schwefelsäure und Indigolösung, so treten die bei der Salpetersäure angeführten Erscheinungen ein.

5) Erwärmt man chlorsaure Salze mit *Salzsäure*, so setzen sich die Bestandtheile beider Säuren um, es bildet sich Wasser, chloorige Säure und Chlor, welche letzteren sich durch Geruch und grünliche Farbe erkennen lassen. $(\text{ClH} + \text{ClO}_5 = \text{ClO}_4 + \text{Cl} + \text{HO})$.

6) Wird ein chlorsaures Salz mit *concentrirter Schwefelsäure* übergossen, so werden zwei Drittel des Metalloxyds in schwefelsaures, das andere Drittel in überchlorsaures Salz verwandelt, chloorige Säure entweicht und giebt sich durch Geruch und grünliche Farbe zu erkennen. $[3(\text{KO}, \text{ClO}_5) + 2\text{SO}_3 = 2(\text{KO}, \text{SO}_3) + \text{KO}, \text{ClO}_7 + 2(\text{ClO}_4)]$ Bei diesem Versuch muss Erwärmung vermieden und mit kleinen Mengen operirt werden, sonst erfolgt die Zersetzung leicht mit solcher Heftigkeit, dass eine Explosion entsteht.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Von den Reactionen, welche zur Erkennung der Salpetersäure angegeben worden sind, geben die mit Eisenvitriol und Schwefelsäure und die mit Kupferfeile und Schwefelsäure die sichersten Resultate, denn Verpuffung mit Kohle, Detonation mit Cyankalium, Entfärbung der Indigolösung erfolgt ja, wie angegeben worden, auch bei Anwesenheit von chlorsauren Verbindungen. Es haben diese letzteren Reactionen daher nur dann entschiedenen Werth, wenn keine Chlorsäure zugegen ist. Von der Gegenwart oder Abwesenheit der Chlorsäure überzeugt man sich am sichersten, wenn man die Probe glüht und ihre Lösung alsdann mit salpetersaurem Silber prüft.

War ein chlorsaures Salz zugegen gewesen, so ist es beim Glühen zu Chlormetall geworden und man erhält jetzt einen Niederschlag von Chlorsilber. Diese Prüfung ist jedoch nur dann so einfach, wenn gleichzeitig kein Chlormetall zugegen ist. Findet dies Statt, so muss salpetersaures Silberoxyd, so lange noch ein Niederschlag entsteht, zugesetzt und erst, nachdem dieser abfiltrirt ist, abgedampft und geglüht werden. — Zu etwas minder sicherem Resultate führt das Zusammenschmelzen chlorsaurer Salze mit Cyankalium. Die Heftigkeit und der Knall, mit welcher die Verpuffung

erfolgt, machen jedoch eine Verwechslung mit salpetersauren Salzen kaum möglich.

II. Organische Säuren.

Erste Gruppe.

Säuren, welche unter irgend einer Bedingung durch Chlorcalcium gefällt werden: Oxalsäure, Weinsteinsäure, Traubensäure, Citronensäure, Aepfelsäure.

§. 102.

Keine dieser Säuren verflüchtigt sich unzersetzt.

a. O x a l s ä u r e.

Ihre Reactionen sind schon oben §. 98. c. angegeben worden.

b. W e i n s t e i n s ä u r e.

1) Die Verbindungen der Weinsteinsäure mit Alkalien, sowie mit denjenigen Metalloxyden, welche schwache Basen sind, lösen sich in Wasser. Alle in Wasser nicht löslichen weinsteinsauren Salze werden von Salzsäure aufgenommen.

2) Beim Glühen verkohlt die Weinsteinsäure und ihre Salze unter Verbreitung eines ganz eigenthümlichen, sehr charakteristischen Geruches. Die Salze mit alkalischer und alkalisch erdiger Base gehen dabei in kohlensaure Verbindungen über.

3) Setzt man zu einer Auflösung von Weinsteinsäure oder zu der eines weinsteinsauren Salzes *Eisenoxyd-Manganoxydul-* oder *Thonerde-Lösung* und dann Ammoniak oder Kali, so tritt keine Fällung von Eisenoxyd, Manganoxydul oder Thonerde ein, da die gebildeten weinsteinsauren Doppelsalze von Alkalien keine Zersetzung erleiden. Auch die Fällung mehrerer anderer Oxyde durch Alkalien wird von Weinsteinsäure verhindert.

4) Freie Weinsteinsäure giebt, mit einem *Kalisalz* am besten mit essigsaurem Kali vermischt, einen schwerlöslichen Niederschlag von saurem weinsteinsaurem Kali. Dasselbe findet Statt, wenn man zu einem neutralen weinsteinsauren Salz essigsaures Kali und freie Essigsäure, oder auch doppelschwefelsaures Kali setzt. Bei der Anwendung dieses letzteren Reagens muss man sorgfältig einen Ueberschuss desselben vermeiden. Das saure weinsteinsaure Kali löst sich leicht in Alkalien und Mineralsäuren;

Weinsteinsäure und Essigsäure befördern seine Löslichkeit in Wasser nicht. Die Abscheidung des Weisteinniederschlags wird durch heftiges Umschütteln außerordentlich befördert.

5) *Chlorcalcium* fällt aus der Lösung neutraler weinsteinsaurer Salze weinsteinsäuren Kalk als weißen Niederschlag. Die Gegenwart von Ammoniaksalzen verhindert die Fällung mehr oder weniger. Der entstandene Niederschlag löst sich in kalter verdünnter Aetzkalilauge zur klaren Flüssigkeit auf. Wird dieselbe aber gekocht, so scheidet sich der gelöste weinsäure Kalk in Gestalt eines gelatinösen Niederschlages aus. Beim Erkalten wird die Lösung wieder klar.

6) *Kalkwasser* erzeugt in den Lösungen neutraler weinsteinsaurer Salze, oder auch in der Lösung freier Weinsteinsäure, wenn es bis zur alkalischen Reaction zugesetzt wird, weiße in Weinsteinsäure leicht lösliche Niederschläge von weinsteinsäurem Kalk, welche von Salmiaklösung mit größter Leichtigkeit aufgenommen werden und sich aus dieser Lösung erst nach mehreren Stunden wieder in Form kleiner Krystalle an den Wänden des Gefäßes absetzen.

7) Gypslösung erzeugt in einer Auflösung von Weinsteinsäure keinen Niederschlag, in der eines neutralen weinsteinsäuren Salzes nach längerer Zeit einen geringen.

c. T r a u b e n s ä u r e .

1) Die traubensauren Salze zeigen zu Lösungsmitteln und beim Erhitzen ein dem der weinsäuren Salze sehr ähnliches Verhalten. Sie verhindern wie diese die Fällung von Manganoxydul, Eisenoxyd, Thonerde u. s. w. durch Alkalien.

2) Zu *Kalisalzen* verhält sich die Traubensäure wie die Weinsteinsäure. Der Niederschlag von saurem traubensaurem Kali ist eben so schwer löslich als Weinstein.

3) *Chlorcalcium* fällt aus den Lösungen der freien wie auch der gebundenen Traubensäure traubensauren Kalk als blendend weißes Pulver. Der Niederschlag ist in Salmiak nicht löslich. Kalte concentrirte Kalilauge löst ihn vollständig, verdünntere theilweise auf; die Lösung wird beim Kochen trübe und gallertartig, beim Erkalten wieder klar.

4) *Kalkwasser* erzeugt in den Lösungen neutraler traubensaurer Salze sogleich weiße Niederschläge von traubensaurem Kalk, ebenso in Traubensäureauflösung, wenn es bis zur alkali-

schen Reaction zugesetzt wird. In geringerer Menge zugefügt, so dass die Lösung noch sauer bleibt, entsteht der Niederschlag erst nach einigen Augenblicken. Der traubensaure Kalk löst sich nicht in Traubensäure, auch nicht in Weinsteinsäure; löst man ihn in Salzsäure und setzt alsdann Ammoniak im Ueberschuss zu, so scheidet er sich sogleich, oder doch nach wenigen Augenblicken wieder aus.

6) *Gypslösung* bringt in einer Auflösung von Traubensäure sogleich keinen Niederschlag hervor, nach 10 bis 15 Minuten scheidet sich jedoch traubensaurer Kalk ab, in Auflösungen neutraler traubensaurer Salze entsteht der Niederschlag sogleich.

7) Erhitzt man krystallisirte Traubensäure oder ein traubensaures Salz mit concentrirter Schwefelsäure, so wird diese unter Entwicklung von schwefliger Säure und Kohlenoxydgas schwarz gefärbt. — Weinsteinsäure verhält sich ebenso.

d. Citronensäure.

1) Die citronensauren Salze mit alkalischer Base sind sowohl im neutralen als auch im sauren Zustande in Wasser leicht löslich, ebenso die Verbindungen der Citronensäure mit den Metalloxyden, welche schwache Basen sind. Die Citronensäure verhindert wie die Weinsteinsäure die Fällung des Eisenoxyds, des Manganoxyduls, der Thonerde u. s. w.

2) Beim *Glühen* verkohlt die Citronensäure und ihre Salze unter Ausstossung stechender saurer Dämpfe, deren Geruch von dem der verkohlenden Weinsteinsäure leicht zu unterscheiden ist.

3) *Chlorcalcium* bewirkt in der Lösung der Citronensäure weder so noch beim Kochen einen Niederschlag. Sättigt man aber die freie Säure mit Kali oder Natron, so entsteht sogleich ein Niederschlag von neutralem citronensaurem Kalk, der in Kali unlöslich ist, von Salmiaklösung aber leicht aufgenommen wird. Wird diese Salmiak enthaltende Lösung gekocht, so scheidet sich sogleich ein weißer schwerer Niederschlag von basisch citronensaurem Kalk ab. — Sättigt man eine mit Chlorcalcium vermischte Citronensäurelösung mit Ammoniak, so entsteht in der Kälte kein Niederschlag, wenn die Lösung nicht sehr concentrirt war. Kocht man aber die klare Flüssigkeit, so scheidet sich plötzlich basisch citronensaurer Kalk mit den eben angeführten Eigenschaften ab.

4) *Kalkwasser* bewirkt in der Lösung der Citronensäure oder eines citronensauren Salzes in der Kälte keinen Niederschlag.

Erhitzt man aber die Lösung mit einem ziemlichen Ueberschuss von Kalkwasser zum Kochen, so entsteht ein weißer Niederschlag von basisch citronensaurem Kalk, der beim Erkalten wieder verschwindet.

5) Setzt man zu einer Lösung von Citronensäure *essigsaueres Blei* im Ueberschuss, so entsteht ein weißer Niederschlag von citronensaurem Blei, der sich in Ammoniak sehr schwer, in citronensaurem Ammoniak aber leicht löst. Setzt man zu Bleizuckerlösung Citronensäure im Ueberschuss, so entsteht ebenfalls ein Niederschlag von citronensaurem Blei, der sich mit Leichtigkeit löst, wenn Ammoniak zugefügt wird. Diese Lösung erfolgt, dem eben angeführten Verhalten des citronensauren Bleies gemäß, also nicht durch das Ammoniak, sondern durch das sich bildende citronensaure Ammoniak.

6) Erhitzt man Citronensäure oder eines ihrer Salze mit concentrirter Schwefelsäure, so entweicht am Anfang Kohlenoxydgas und Kohlensäure ohne gleichzeitige Schwärzung der Schwefelsäure, nach längerem Kochen jedoch wird die Lösung dunkel und es entweicht schweflige Säure.

e. A e p f e l s ä u r e.

1) Die Aepfelsäure bildet mit den meisten Basen in Wasser lösliche Salze. Das saure äpfelsaure Kali ist in Wasser nicht schwerlöslich. Die Aepfelsäure verhindert, wie die Weinsäure, die Fällung des Eisenoxyds u. s. w. durch Alkalien.

2) Beim Erhitzen auf 200° zerfällt die Aepfelsäure in Maleinsäure und in Fumarsäure. Dieses Verhalten ist höchst charakteristisch. Nimmt man den Versuch in einem Löffelchen vor, so entwickeln sich unter Aufschäumen stechend saure Dämpfe von Maleinsäure, nimmt man ihn in einem Röhrchen vor, so verdichten sie sich im kälteren Theile zu Krystallen. Die Fumarsäure bleibt zurück.

3) *Chlorcalcium* bringt weder in der Lösung der freien, noch der gebundenen Aepfelsäure Niederschläge hervor. Setzt man aber zur Lösung eines äpfelsauren Salzes nach Hinzufügung von Chlorcalcium Alkohol, so scheidet sich sogleich äpfelsaurer Kalk als weißes Pulver ab.

4) *Kalkwasser* schlägt weder die freie, noch die gebundene Aepfelsäure nieder.

5) *Essigsaueres Bleioxyd* fällt aus der Lösung der Aepfelsäure

und der äpfelsauren Salze äpfelsaures Bleioxyd als weissen Niederschlag. Derselbe ist erstens dadurch ausgezeichnet, dass er, wenn man ihn längere Zeit unter der Flüssigkeit stehen lässt, seine käsige Beschaffenheit verliert und sich in concentrisch gruppirte perlmutterglänzende Nadeln verwandelt, und zweitens dadurch, dass sein Schmelzpunkt tiefer liegt, als der Siedepunkt des Wassers. Erhitzt man daher die Flüssigkeit, in welcher der Niederschlag suspendirt ist, zum Kochen, so schmilzt derselbe und gleicht alsdann unter Wasser geschmolzenem Harz.

6) Wird Aepfelsäure mit concentrirter Schwefelsäure erhitzt, so schwärzt sich diese unter Entwicklung von schwefliger Säure.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Von den abgehandelten organischen Säuren sind die Weinsteinsäure und Traubensäure durch die Schwerlöslichkeit ihrer sauren Kalisalze, wie auch durch das Verhalten ihrer Kalksalze zu Kalilauge und durch den eigenthümlichen Geruch, welchen sie beim Verkohlen verbreiten, genügend charakterisirt. Die Weinsteinsäure lässt sich von der Traubensäure am besten in ihrer Kalkverbindung unterscheiden, da dieselbe in freier Weinsteinsäure, wie auch in Salmiak löslich ist, also zwei Eigenschaften zeigt, welche beide dem traubensauren Kalk abgehen. Die Traubensäure ist ferner durch ihr Verhalten zu Gypslösung von der Weinsteinsäure verschieden. Dieses Verhalten stellt die Traubensäure der Oxalsäure nahe, giebt jedoch, wenn man mit den freien Säuren zu thun hat, nicht leicht zu Verwechslungen Anlass, da der Niederschlag, welchen Gypssolution in Traubensäurelösung erzeugt, nie sogleich entsteht. Die oxalsauren Salze sind ausserdem von den traubensauren durch ihr Verhalten beim Erhitzen für sich und mit Schwefelsäure leicht zu unterscheiden. — Die Citronensäure wird am besten durch ihr Verhalten zu Kalkwasser oder zu Chlorcalcium und Ammoniak erkannt. Auch die Schwerlöslichkeit ihres ausgewaschenen Bleisalzes in Ammoniak unterscheidet sie von der Weinstein- und Traubensäure. Die übrigen Reagentien, welche Niederschläge oder Veränderungen mit ihr hervorbringen, als Goldchlorid, Silber- und Quecksilber-Salze u. s. w. verhalten sich zu Weinsteinsäure und Traubensäure ähnlich oder gleich und lassen daher keine sichere Unterscheidung zu. — Die Aepfelsäure wäre durch das Verhalten ihres Bleisalzes beim Erhitzen unter Wasser ganz gut charakterisirt, hätte diese Reaction grössere Empfindlich-

keit und würde sie nicht so leicht durch die Anwesenheit anderer Säuren verhindert. Die Fällung des äpfelsauren Kalkes durch Alkohol kann nur dann für die Erkennung der Aepfelsäure von Werth sein, wenn man sich von der Abwesenheit aller anderen Säuren, deren Kalksalze in Wasser schwerlöslich, in Weingeist aber unlöslich sind, also z. B. der Schwefelsäure oder Borsäure, überzeugt hat. Jedenfalls muss der durch Alkohol gefällte Niederschlag immer einer näheren Prüfung unterworfen werden. Das Erhitzen der Aepfelsäure in einer Glasröhre führt in jedem Falle zum sichersten Resultat; die Reaction ist jedoch nicht unter allen Umständen leicht anwendbar.

Zweite Gruppe der organischen Säuren.

Säuren, welche von Chlorcalcium unter keiner Bedingung, von Eisenchlorid aber aus neutraler Lösung gefällt werden: Bernsteinsäure, Benzoësäure.

§. 103.

a. B e r n s t e i n s ä u r e.

1) Die reine Bernsteinsäure ist geruchlos, löst sich leicht in Wasser und verflüchtigt sich beim Erhitzen vollständig. Die officinelle, nach brenzlichem Oel riechende Säure hinterlässt einen geringen kohligen Rückstand. Die bernsteinsauren Salze, mit Ausnahme des bernsteinsauren Ammoniaks, werden beim Glühen zersetzt; die mit alkalischer oder alkalisch erdiger Base gehen dabei in kohlensaure Verbindungen über. Von den bernsteinsauren Salzen sind die meisten in Wasser löslich, nur mit den Metalloxyden, welche schwache Basen sind, geht die Bernsteinsäure unlösliche oder schwerlösliche Verbindungen ein.

2) *Eisenchlorid* bewirkt in einer Auflösung der Bernsteinsäure einen bräunlich blassrothen voluminösen Niederschlag von bernsteinsaurem Eisenoxyd. Soll die Fällung vollständig sein, so muss die freie Säure mit Ammoniak neutralisirt werden. Das bernsteinsaure Eisenoxyd löst sich leicht in Säuren, von Ammoniak wird es zersetzt, indem sich Eisenoxydhydrat abscheidet und die Bernsteinsäure als bernsteinsaures Ammoniak gelöst wird.

3) *Essigsaures Blei* erzeugt mit Bernsteinsäure einen weissen, in überschüssiger Bernsteinsäure, in essigsaurer Bleilösung und in

Essigsäure löslichen Niederschlag von bernsteinsaurem Bleioxyd.

4) *Salpetersaures Quecksilberoxydul* und *salpetersaures Silberoxyd* schlagen die bernsteinsauren Salze ebenfalls nieder; die Niederschläge haben jedoch nichts charakteristisches.

5) Die bernsteinsauren Alkalien sind in Weingeist unlöslich.

b. B e n z o ö s ä u r e.

1) Die reine Benzoësäure stellt weisse Blättchen oder Nadeln, oder auch nur ein krystallinisches Pulver dar. Sie verflüchtigt sich beim Erhitzen vollständig, ihre Dämpfe erzeugen ein ganz eigenthümliches Kratzen im Schlund und reizen zum Husten. Die gewöhnliche officinelle Benzoësäure riecht nach dem Benzoëharz und hinterlässt beim Erhitzen einen geringen kohligen Rückstand. Die benzoësauren alkalischen Erden und Alkalien gehen beim Erhitzen in kohlenaure Salze über. Die Benzoësäure ist in kaltem Wasser sehr schwer löslich, von heissem Wasser und von Alkohol wird sie ziemlich leicht aufgenommen. Sie bildet mit den meisten Oxyden in Wasser lösliche Salze, nur mit denjenigen, welche schwache Basen sind, vereinigt sie sich zu unlöslichen oder schwer löslichen Verbindungen.

2) Zu *Eisenchlorid* verhält sich die Benzoësäure wie die Bernsteinsäure. Das benzoësaure Eisenoxyd ist jedoch weit heller und mehr gelb, als das bernsteinsaure. Von Ammoniak wird es wie dieses zersetzt. Behandelt man es mit stärkeren Säuren, so verbinden sich diese mit dem Eisenoxyd, die Benzoësäure scheidet sich wegen ihrer Schwerlöslichkeit als weisser Niederschlag ab.

3) Setzt man zu der Lösung eines benzoësauren Salzes eine starke *Säure*, so wird die Benzoësäure ausgetrieben und scheidet sich in Gestalt eines blendend weissen, schwer löslichen Pulvers ab. Auf gleiche Weise wird, wie eben schon beim benzoësauren Eisenoxyd erwähnt worden, die Benzoësäure aus ihren unlöslichen Salzen abgeschieden, wenn man diesen stärkere Säuren zusetzt, welche mit den Basen, an die die Benzoësäure gebunden war, lösliche Salze bilden.

4) *Essigsaures Bleioxyd* schlägt freie Benzoësäure und benzoësaures Ammoniak nicht oder wenigstens nicht sogleich, benzoësaure Salze mit fixer alkalischer Basis aber flockig weiss nieder.

5) Die benzoësauren Alkalien sind in Alkohol löslich.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Die Bernstein- und Benzoësäure sind durch ihr Verhalten zu Eisenchlorid und ihre Flüchtigkeit von allen anderen Säuren verschieden. Von einander unterscheiden sie sich durch die Farbe ihrer Eisenoxydsalze, hauptsächlich aber dadurch, dass die Bernsteinsäure leicht, die Benzoësäure aber so schwer löslich ist. Diese letztere lässt sich außerdem durch ihre zum Husten reizenden Dämpfe erkennen. Die Bernsteinsäure ist meistens nicht vollkommen rein, daher sich ihre Anwesenheit oft durch den Geruch nach Bernsteinöl verräth.

Eine Trennung beider Säuren wird bewerkstelligt, wenn man ihre Eisenoxydsalze mit Ammoniak zersetzt und die entstandenen Ammoniakverbindungen nach dem Abdampfen zur Trockne mit Alkohol behandelt. Kann man die Säuren auf directerem Wege an Alkalien binden, so ist die Scheidung natürlich noch einfacher. Das benzoësaure Salz löst sich alsdann auf, das bernsteinsaure bleibt zurück.

Dritte Gruppe der organischen Säuren.

Säuren, welche von Chlorcalcium und Eisenchlorid unter keiner Bedingung gefällt werden: Essigsäure, Ameisensäure.

§. 104.

a. E s s i g s ä u r e.

1) Die Essigsäure verflüchtigt sich beim Erhitzen vollständig in stechend riechenden, in concentrirtem Zustande entzündbaren, mit blauer Flamme brennenden Dämpfen. Ihre Salze werden beim Glühen zerlegt. Unter den Zersetzungsproducten findet sich meistens Essigsäure, stets Aceton. Die mit alkalischer und alkalisch erdiger Base verwandeln sich dabei in kohlensaure Salze. Von denen mit metallischer Base lassen manche Metall, andere Oxyd zurück. Sämmtliche Rückstände sind kohlehaltig. Fast alle essigsauren Salze werden von Wasser und Weingeist aufgenommen; die meisten sind in Wasser leicht löslich, schwer löslich sind nur einige wenige.

2) Setzt man zu Essigsäure *Eisenchlorid*, so tritt keine Veränderung ein, sättigt man aber die Säure mit Ammoniak, oder mischt man ein neutrales essigsaures Salz mit Eisenchlorid, so

nimmt die Flüssigkeit von dem entstandenen essigsauren Eisenoxyd eine tief dunkelrothe Färbung an. Aus einer solchen Lösung fällt Ammoniak alles Eisenoxyd.

3) Neutrale essigsaure Salze, nicht aber freie Essigsäure, geben mit *salpetersaurem Silberoxyd* weisse, in kaltem Wasser sehr schwer lösliche krystallinische Niederschläge von essigsaurem Silberoxyd. In heissem Wasser lösen sich dieselben leichter, beim Erkalten der Lösung scheiden sie sich in Gestalt sehr feiner Krystalle aus. Ammoniak nimmt sie leicht auf, freie Essigsäure vermehrt die Löslichkeit in Wasser nicht.

3) *Salpetersaures Quecksilberoxydul* bewirkt in Essigsäure, leichter noch in essigsauren Salzen, in Wasser und Essigsäure in der Kälte schwerlösliche, im Ueberschuss des Fällungsmittels leicht lösliche, weisse, schuppig krystallinische Niederschläge von essigsaurem Quecksilberoxydul. Beim Erhitzen mit Wasser werden sie gelöst, beim Erkalten scheiden sie sich wieder in Form kleiner Krystalle aus. Das essigsaure Quecksilberoxydul wird dabei theilweise zersetzt, Quecksilber scheidet sich metallisch aus und ertheilt dem Niederschlag eine graue Färbung. Kocht man anstatt mit Wasser mit verdünnter Essigsäure, so ist die Menge des sich abscheidenden metallischen Quecksilbers höchst gering.

4) Erwärmt man essigsaure Salze mit *verdünnter Schwefelsäure*, so entwickelt sich Essigsäure, welche an ihrem stechenden Geruch zu erkennen ist. Erhitzt man die Salze aber mit einem Gemenge von etwa gleichen Gewichts-Theilen concentrirter *Schwefelsäure* und *Alkohol*, so entwickelt sich Essigäther, dessen höchst charakteristischer lieblicher Geruch, der besonders beim Umschütteln der schon etwas erkalteten Mischung hervortritt, kaum und jedenfalls weit weniger als der stechende Geruch der freien Säure eine Verwechslung zulässt.

5) Destillirt man essigsaure Salze mit verdünnter Schwefelsäure und digerirt das Destillat mit überschüssigem Bleioxyd, so löst sich ein Theil desselben zu basisch essigsaurem Bleioxyd auf, welches sich an seiner alkalischen Reaction leicht erkennen lässt.

b. Ameisensäure.

1) Die Ameisensäure hat einen eigenthümlichen stechenden Geruch, sie verflüchtigt sich beim Erhitzen vollständig, die Dämpfe der concentrirten Säure lassen sich entzünden und brennen mit blauer Flamme. Die ameisensauren Salze hinterlassen beim Glühen

wie die entsprechenden essigsauren Salze entweder kohlsaure Verbindungen, Oxyde oder Metalle; gleichzeitig scheidet sich Kohle ab, Kohlenwasserstoff, Kohlensäure und Wasser entweichen. Alle Verbindungen der Ameisensäure mit Basen lösen sich in Wasser, Alkohol nimmt nur manche auf.

2) Zu *Eisenchlorid* verhält sich die Ameisensäure wie die Essigsäure.

3) *Salpetersaures Silberoxyd* schlägt freie Ameisensäure nicht, ameisensaure Alkalien nur in concentrirten Lösungen nieder. Der weißse, schwer lösliche, krystallinische Niederschlag von ameisen-saurem Silberoxyd wird sehr bald dunkler, indem sich metallisches Silber ausscheidet. Nach längerem Stehen erfolgt die Reduction schon in der Kälte vollständig; erhitzt man aber die Flüssigkeit mit dem Niederschlag, so tritt sie sogleich ein. Dieselbe Reduction des Silberoxyds erfolgt auch dann, wenn die Lösung des ameisen-sauren Salzes so verdünnt war, dass kein Niederschlag entstand, oder wenn man freie Ameisensäure hatte. Die Ameisensäure, welche man als eine Verbindung von Kohlenoxyd mit Wasser betrachten kann, entzieht nemlich dem Silberoxyd seinen Sauerstoff, es bildet sich Kohlensäure, welche entweicht, und Wasser; Metall wird abgeschieden.

4) *Salpetersaures Quecksilberoxydul* bewirkt in freier Ameisensäure keinen, in concentrirten Lösungen ameisen-saurer Alkalien einen weißen schwerlöslichen Niederschlag von ameisen-saurem Quecksilberoxydul. Derselbe wird nach sehr kurzer Zeit von ausgeschiedenem Quecksilber grau, nach längerem Stehen tritt schon in der Kälte, sogleich aber beim Erhitzen vollständige Reduction ein. Es bildet sich hierbei ebenfalls Kohlensäure und Wasser. Die Reduction erfolgt wie bei dem Silberoxyd auch dann, wenn die Flüssigkeit so verdünnt ist, dass das ameisen-saure Quecksilberoxydul gelöst bleibt, oder wenn man freie Ameisensäure hat.

5) Erwärmt man Ameisensäure oder ein ameisen-saures Alkali mit *Quecksilberchlorid* auf $60 - 70^{\circ}$, so erhält man einen Niederschlag von *Quecksilberchlorür*. Bei der Kochhitze des Wassers wird zugleich Metall abgeschieden.

6) Wird Ameisensäure oder ein Salz derselben mit *concentrirter Schwefelsäure* erwärmt, so zerlegt sie sich ohne Schwärzung der Flüssigkeit in Kohlenoxydgas, welches unter Aufbrausen entweicht und angezündet mit blauer Flamme brennt, und in Wasser.

Die Schwefelsäure entzieht nemlich der Ameisensäure das zu ihrem Bestehen nothwendige Wasser oder Oxyd und veranlasst so eine Umsetzung ihrer Atome ($C_2, H, O_3 = 2 CO + HO$). Erwärmt man ein ameisensaures Salz mit verdünnter Schwefelsäure, so entweicht Ameisensäure, welche an ihrem Geruche leicht erkannt wird; übergießt man mit einer Mischung von Schwefelsäure und Alkohol, so entwickelt sich Ameisenäther, der durch seinen eigenthümlichen, an den des Arraks erinnernden Geruch ausgezeichnet ist.

Zusammenstellung und Bemerkungen. Da die Reactionen der Essig- und Ameisensäure nicht so charakteristisch sind, als die vieler anderer Säuren, so kann ihre sichere Erkennung nur auf die Uebereinstimmung der angegebenen Reactionen gegründet werden. Am leichtesten wird die Essigsäure an ihrem Geruch, oder an dem des Essigäthers, am sichersten aber durch ihr Verhalten zu Bleioxyd erkannt. Die Ameisensäure ist am besten durch ihr Verhalten zu Schwefelsäure und zu den Salzen der edlen Metalle zu erkennen. Die Trennung der Essigsäure von der Ameisensäure gelingt, wenn man beide mit überschüssigem Quecksilberoxyd oder Silberoxyd erwärmt. Die Ameisensäure reducirt die Oxyde, indem sie selbst zerlegt wird, die Essigsäure bleibt mit denselben verbunden in Lösung.

Zweite Abtheilung.

**Systematischer Gang
der
qualitativen chemischen Analyse.**

Ueber
den Gang einer qualitativen Analyse
im Allgemeinen
und über
den Plan der vorliegenden zweiten Abtheilung
insbesondere.

Wenn man die Reagentien und das Verhalten der Körper zu denselben kennt, so ist man im Stande, sogleich zu entscheiden, ob irgend eine einfache Verbindung, deren physikalische Eigenschaften einen Schluss auf ihre Natur gestatten, das wirklich ist, wofür man sie hält. Einige einfache Reactionen lehren uns ja z. B., dass ein Körper, den wir für Kalkspath halten, in der That kohlensaurer Kalk, einer, den wir für Gyps halten, wirklich schwefelsaurer Kalk sey. Ebenso genügen diese Kenntnisse gewöhnlich, um zu ermitteln, ob in irgend einer zusammengesetzten Substanz ein gewisser Körper vorhanden oder nicht vorhanden ist, ob also z. B. ein weißes Pulver Quecksilberchlorür enthält oder nicht. Handelt es sich aber darum, die chemische Natur eines uns völlig unbekannten Körpers darzuthun, sollen alle Bestandtheile eines Gemenges oder einer chemischen Verbindung aufgefunden werden, will man den Beweis liefern, dass außer den aufgefundenen Stoffen durchaus keine weiteren vorhanden sein können, ist demnach von einer vollständigen qualitativen Analyse die Rede, so muss sich zu der Kenntniss der Reagentien und zu der des Verhaltens der einzelnen Körper zu denselben nothwendig die eines bestimmten systematischen Verfahrens bei der Analyse gesellen; das heisst, wir müssen wissen, in welcher Reihenfolge wir Lösungsmittel, allgemeine und besondere Reagentien anzuwenden haben, um sowohl von der Abwesenheit aller nicht zugegebenen Körper schnell überzeugt zu werden, als auch um die wirklich vorhandenen bald und sicher zu erkennen. — Fehlt uns die Kenntniss eines solchen systematischen Ganges, oder sagen wir uns, in der Hoffnung schneller zum Ziele zu kommen, bei Untersuchungen von jeder Methode los, so wird das Analysiren, wenigstens in der

Hand des Anfängers, ein Herumrathen und die erhaltenen Resultate sind nicht mehr Ergebnisse wissenschaftlicher Berechnung, sondern Sache des bald günstigen, bald ungünstigen Zufalls.

Eine bestimmte Methode muss demnach jeder Analyse zu Grunde liegen; es ist aber keineswegs nöthig, dass diese immer ein und dieselbe sei. Im Gegentheile, Uebung, Nachdenken und Betrachtung der Umstände führen uns in verschiedenen Fällen meist zu verschiedenen Methoden. Alle aber kommen darin überein, dass die vorhandenen oder vorauszusetzenden Stoffe erst in gewisse Gruppen getheilt und die in die verschiedenen Gruppen gehörenden Körper alsdann weiter unterschieden und zuletzt einzeln erkannt werden müssen. — Die Verschiedenheit der Methoden aber ist theils in der Reihenfolge, in welcher die Reagentien angewendet werden, theils in ihrer Auswahl begründet.

Um nun zu dem Standpunkte zu gelangen, selbstständige Methoden zur Analyse entwerfen zu können, muss man sich zuvor mit einem durch die Erfahrung geprüften, allen irgend möglichen Fällen angepassten Gange ganz und gar vertraut machen, damit man in der Folge bei erlangter Uebung durch eigne Ueberlegung zu finden vermag, in welchen Fällen diese oder jene Modification der allgemeinen Methode etwa schneller oder leichter zum Ziele führe. —

Die Darlegung eines solchen allen Fällen angepassten, möglichst sicheren und einfachen, durch die Erfahrung erprobten und bewährten Ganges ist der Gegenstand dieser zweiten Abtheilung. —

Die Elemente und Verbindungen, welche darin umfasst werden, sind dieselben, welche pag. 3. aufgezählt worden sind.

Da zur Aufstellung eines solchen systematischen Verfahrens Voraussicht aller möglichen Umstände nothwendig ist, so ergiebt sich von selbst, dass die in den Kreis unserer Betrachtung aufgenommenen Körper zwar in allen beliebigen Mischungen und Gemengen unter sich, aber frei von fremdartigen organischen Stoffen angenommen werden mussten, indem durch solche viele Reactionen verdeckt, andere mannigfach modificirt werden. Es soll jedoch hiermit keineswegs gesagt sein, dass nicht auch bei Anwesenheit vieler, besonders in Wasser zu farblosen oder hellen Flüssigkeiten auflöslicher organischer Substanzen, der vorgeschlagene Gang genau befolgt werden könne. Wie man sich in den einzelnen Fällen, wenn dunkelfärbende, schleimige Stoffe im Spiele sind, helfen müsse, lehrt am besten die Erfahrung und ist Sache des Nach-

denkens in jedem einzelnen Falle. Die Hauptregeln, das Verfahren im Allgemeinen, findet man übrigens §. 129.

Die vorliegende zweite Abtheilung zerfällt in zwei Abschnitte. Der erste enthält eine praktische Anweisung zum Analysiren; es wird darin ein Weg vorgeschrieben, auf dem man gerade fortschreitend zum Ziele gelangen muss. Es mag Manches auf den ersten Anblick etwas weitläufig scheinen, ich glaube jedoch nicht, dass es unbeschadet der Deutlichkeit für Anfänger kürzer gefasst werden konnte; auch hege ich die Hoffnung, der Gebrauch werde überzeugen, dass der Gang nichtsdestoweniger schnell durchgemacht werden könne, und ich gründe sie darauf, dass ich stets die möglichen Erscheinungen in genau charakterisirte Fälle getheilt habe, da so, indem nur der betreffende berücksichtigt zu werden braucht und eine Nummer zur andern hinweist, das Durchlesen der auf den speciellen Fall nicht passenden Stellen erspart wird.

Die Unterabtheilungen dieser praktischen Anweisung sind: 1) Einleitende Prüfung, 2) Auflösung, 3) Eigentliche Untersuchung, 4) Bestätigende Versuche. —

Die dritte Unterabtheilung (die eigentliche Untersuchung) zerfällt wieder in die Untersuchung von Verbindungen, in welchen nur eine Basis und eine Säure vorausgesetzt wird und in die von Gemengen oder Verbindungen, in welchen alle hier in Betracht kommenden Körper als gegenwärtig angenommen werden. In Bezug auf die letztere muss bemerkt werden, dass man, wenn die einleitende Prüfung nicht von der Abwesenheit bestimmter Körpergruppen die gewisseste Ueberzeugung gegeben hat, ohne Gefahr einen oder mehrere Stoffe zu übersehen, keinen Paragraph, auf welchen in Folge der sich zeigenden Erscheinungen hingewiesen wird, übergehen darf. — Will man eine Verbindung oder ein Gemeng nicht auf alle Bestandtheile, sondern nur auf gewisse Stoffe prüfen, so findet man leicht, welche Nummern alsdann in Betracht zu ziehen sind.

Der zweite Abschnitt enthält eine Erklärung des praktischen Verfahrens, eine Auseinandersetzung der Gründe, worauf die Scheidung, und der Ursachen, worauf die Erkennung der Substanzen beruht; außerdem mancherlei Zusätze zum praktischen Gange. Es dürfte räthlich sein, sich mit diesem Abschnitte, welcher als Schlüssel zum ersten zu betrachten ist, bald bekannt zu machen.

Als Anhang ist ein allgemeines Schema, nach dem man die Substanzen, welche zur Uebung analysirt

werden sollen, zweckmäfsig auf einander folgen lässt, so wie eine tabellarische Zusammenstellung der häufiger vorkommenden Formen und Verbindungen der pag. 3. angeführten Körper nach ihren Löslichkeitsverhältnissen in Wasser und Säuren beigefügt worden. — Ersteres soll dem Anfänger als Leitfaden dienen, sein Ziel, die gründliche Erlernung der qualitativen Analyse, schnell und sicher zu erreichen, — letztere wird ohne Zweifel Manchem, der mit den Löslichkeitsverhältnissen noch weniger vertraut ist, besonders bei den Schlüssen, wie die aufgefundenen Säuren und Basen etc. vereinigt gewesen sind, oder welche Säuren in wässrigen oder sauren Lösungen bei Anwesenheit der oder jener Basen gar nicht zugegen sein können u. s. w., von Nutzen sein.

Erster Abschnitt.

Praktisches Verfahren.

I. Einleitende Prüfung.

§. 105.

Man beachtet vor Allem die äufseren, sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften der zu untersuchenden Substanz: Farbe, Form, Härte Schwere, Geruch u. s. w., da sich daraus oft mancher Schluss ziehen lässt. Ehe man weiter verfährt, ist wohl zu berücksichtigen, wie viel des zu untersuchenden Körpers zu Gebote steht, weil man schon jetzt die Quantitäten, die man zur einleitenden Prüfung verwenden darf, darnach beurtheilen muss. Sparsamkeit ohne Uebertreibung ist, auch wenn man den Körper in Pfunden hätte, zur Gewöhnung anzurathen; Gesetz aber muss es sein, stets nur einen Theil der Substanz zur Untersuchung zu verwenden, einen anderen aber, wenn auch kleineren, für unvorhergesehene Fälle und zu bestätigenden Versuchen aufzubewahren.

A. Der zu untersuchende Körper ist fest.

I. Er ist weder ein regulinisches Metall, noch eine Legirung.

1) Ist die Substanz pulverförmig oder kleinkrystallisirt, so ist sie zur

Untersuchung geeignet; ist sie in größeren Krystallen oder in festen Stücken, so muss vorher ein Theil derselben, wenn es möglich ist, fein zerrieben werden.

2) Man erhitzt etwas des Pulvers in einem kleinen eisernen Löffelchen über der einfachen Weingeistlampe. Die stattfindenden Erscheinungen lassen über die Natur des Körpers Manches mit Sicherheit schliessen, Anderes mit Wahrscheinlichkeit folgern.

a) Der Körper bleibt unverändert; keine organischen Substanzen, keine wasserhaltigen Salze, keine leicht schmelzbaren Stoffe, keine flüchtigen Körper.

b) Er schmilzt leicht und wird unter Ausstossung von Wasserdämpfen wieder fest; Salze, welche Krystallwasser enthalten. Schmilzt der erhärtete Rückstand bei verstärkter Hitze wieder, so ist c. zu berücksichtigen.

c) Er schmilzt ohne Ausstossung von Wasserdämpfen. Man setzt etwas Papier zu der schmelzenden Masse; entsteht Verpuffung, so deutet sie auf salpetersaure, oder auch auf die seltneren chlorsauren Salze.

d) Er verflüchtigt sich ganz oder theilweise. Im ersteren Falle sind keine fixen Basen vorhanden, im letzteren ist ein flüchtiger Körper beigemischt.

α) Es verbreitet sich dabei kein Geruch. Alsdann hat man besonders auf Ammoniak-, Quecksilber- und Arsenik-Verbindungen Rücksicht zu nehmen.

β) Es verbreitet sich zugleich ein Geruch. Ist er der der schwefligen Säure, so ist Schwefel vorhanden; sind die Dämpfe violett und riechen sie nach Jod, so ist die Gegenwart dieses Körpers im freien Zustande sicher. Mit gleicher Gewissheit kann freie Benzoësäure und manche andere Substanzen am Geruch ihrer Dämpfe erkannt werden.

e) Der Körper ist ein weisses Pulver und wird beim Erhitzen gelb, deutet auf Zinkoxyd oder Bleioxyd. Letzteres bleibt auch bei dem Erkalten gelb, das Zinkoxyd wird dabei wieder weiss.

f) Es tritt Verkohlung ein, organische Substanzen. Braust der Rückstand mit Säuren übergossen, während der ursprüngliche Körper diese Erscheinung nicht zeigt, so deutet dies auf

an Alkalien oder alkalische Erden gebundene organische Säuren. Verbreitet sich ein Geruch nach Cyan, so wird die Anwesenheit einer Cyanverbindung dadurch angedeutet.

Außerdem schwellen manche Substanzen bedeutend auf, wie z. B. Borax, schwefelsaure Thonerde; andere decrepitiren, wie Chlornatrium und Chlorkalium etc.; diese Erscheinungen berechtigen jedoch weniger zu allgemeinen und sichern Schlüssen.

3) Man bringt einen kleinen Theil des Körpers in ein Kohlengrübchen und bläst mit der innern Löthrohrflamme darauf.

Da sich hierbei die Erscheinungen, welche schon §. 105. 2. erwähnt wurden, größtentheils wiederholen, so werden nur die dieser Behandlung eigenthümlichen hier angeführt.

a) Der Körper verflüchtigt sich theilweise oder ganz. Dies deutet außer auf die in §. 105. 2. d. angeführten Substanzen auch auf Antimonoxyd und einige andere Oxyde, vergleiche §. 105. 3. d. β . Das genannte schmilzt, bevor es sich als weißer Rauch verflüchtigt. Außerdem ist zu bemerken, dass sich bei Gegenwart von arseniger oder Arsenik-Säure ein knoblauchartiger Geruch verbreitet, der stärker hervortritt, wenn man der Probe zuvor Soda zusetzt.

b) Der Körper schmilzt und zieht sich in die Kohle; deutet auf Alkalien. Man bringt in diesem Falle einen Theil des gepulverten Körpers auf das befeuchtete Ohr eines Platindrahts und leitet die Spitze der inneren Löthrohrflamme darauf. Violette Färbung der äußern Flamme deutet nur auf Kali, gelbe auf Natron, dem jedoch Kali selbst in größerer Menge beigemengt sein kann, da bei Gegenwart beider Alkalien die Flamme stets gelb erscheint.

c) Es bleibt ein unschmelzbarer weißer Rückstand auf der Kohle, entweder sogleich oder nach vorhergegangenem Schmelzen im Krystallwasser; deutet besonders auf Baryt, Strontian, Kalk, Magnesia, Thonerde, Zink und Kieselsäure. Von diesen zeichnen sich Strontian, Kalk, Magnesia und Zink durch ein sehr helles Leuchten in der Löthrohrflamme aus. Man bringt auf die geglühte

weiße Masse ein Tröpfchen salpetersaure Kobaltlösung und erhitzt wieder stark. Schön blaue Färbung zeigt Alaunerde, röthliche Magnesia, grüne Zink. Bei Gegenwart von Kieselsäure entsteht auch eine schwach bläuliche Färbung, welche man nicht mit der von Alaunerde herrührenden verwechseln darf. Die Kieselsäure ist außerdem dadurch ausgezeichnet, dass sie mit kohlsaurem Natron bei gutem Blasen unter Aufbrausen ein klares Glas giebt (§. 99. b.)

d) Es bleibt ein unschmelzbarer Rückstand von anderer Farbe oder es erfolgt eine Metallreduction mit oder ohne Beschlag. Man mengt etwas des Pulvers mit Soda und erhitzt auf Kohle in der Reductionsflamme.

α) Man erhält nach gutem Blasen ein Metallkorn, ohne dass sich die Kohle beschlägt, deutet auf Gold, Silber, Zinn, Kupfer. — Platin, Eisen, Kobalt und Nickel werden zwar gleichfalls reducirt, liefern aber keine Metallkörner.

β) Es bildet sich zugleich mit einem Metallkorn oder auch ohne ein solches ein Beschlag auf der Kohle. Er kann herrühren von Wismuth, Blei, Cadmium, Antimon und Zink.

aa) Der Beschlag ist weiß, deutet auf Antimon und Zink. Der Beschlag des Zinks erscheint, so lange er noch heiß ist, gelb. Das regulinische Antimonkorn entwickelt ohne weiteres Erhitzen noch lange einen weißen Rauch und umgiebt sich endlich beim Erkalten meist mit Krystallen von Antimonoxyd. Unter dem Hammer ist es spröde.

bb) Der Beschlag ist mehr oder weniger gelb oder braun, Wismuth, Blei, Cadmium. Der Beschlag des Cadmiumoxyds neigt in's Orangefarbene, die Beschläge von Blei- und Wismuth-Oxyd gehen beim Erkalten aus dem Braungelben in's Hellgelbe über. Cadmium wird bei der Reduction sogleich verflüchtigt. Die Bleikörner lassen sich leicht ausplatten, Wismuthkörner hingegen springen unter dem Hammer.

Da ein zu untersuchender Körper aus den verschiedenartig-

sten Stoffen gemengt sein kann, so ist bei diesen Prüfungen die Aufstellung ganz scharf begränzter Fälle nicht möglich, wenn sie zugleich allgemein sein sollen. Treten daher bei den Versuchen Erscheinungen ein, welche aus der Vereinigung zweier oder mehrerer Fälle herrühren, so sind natürlicherweise auch die zu ziehenden Schlüsse darnach einzurichten.

II. Der Körper ist ein regulinisches Metall oder eine Legirung.

1) Man übergießt und erhitzt eine Probe mit Wasser, dem man etwas Essigsäure zugesetzt hat.

a) Es entwickelt sich Wasserstoffgas, deutet auf ein Leichtmetall. Es muss alsdann bei der eigentlichen Untersuchung auch auf Alkalien und Erden Rücksicht genommen werden.

b) Es entwickelt sich kein Wasserstoffgas; zeigt die Abwesenheit eines Leichtmetalls an. Im Verlaufe der Untersuchung brauchen Alkalien und alkalische Erden nicht berücksichtigt zu werden.

2) Man erhitzt eine Probe im Kohlengrübchen mit der innern Löthrohrflamme und beobachtet, ob dieselbe schmilzt, ob sich ein Beschlag bildet, ein Geruch entwickelt u. s. w.

a) Die Probe bleibt unverändert; zeigt die Abwesenheit des Antimons, Zinks, Bleis, Wismuths, Cadmiums, Zinns, Quecksilbers und Arsens mit ziemlicher Bestimmtheit, die des Golds, Silbers und Kupfers mit Wahrscheinlichkeit an, deutet auf Platin, Eisen, Mangan, Nickel und Kobalt hin.

b) Die Probe schmilzt ohne gleichzeitigen Beschlag und ohne dass sich ein Geruch verbreitet; zeigt die Abwesenheit des Antimons, Zinks, Bleis, Wismuths, Cadmiums und Arsens an, deutet auf Gold, Silber, Kupfer, Zinn.

c) Die Probe schmilzt, es bildet sich ein Beschlag, es verbreitet sich kein Geruch. Zeigt die Abwesenheit des Arsens an, deutet auf Antimon, Zink, Wismuth, Blei, Cadmium, vergleiche §. 105. A. I. 3. d. β.

d) Es verbreitet sich ein knoblauchartiger Geruch, Arsen. Je nach den im Uebrigen eintretenden Erscheinungen ist a. b. oder c. zu berücksichtigen.

3) Man erhitzt eine Probe in einer am einen Ende zugeschmolzenen Glasröhre vor dem Löthrohr.

a) Es bildet sich im kälteren Theile der Röhre kein Anflug, Abwesenheit des Quecksilbers.

b) Es bildet sich ein Anflug, Quecksilber, Cadmium oder Arsen. Der Anflug des ersteren, der aus lauter kleinen Kügelchen besteht, kann mit dem Cadmium- oder Arsen-Anflug nicht verwechselt werden.

B. Der zu untersuchende Körper ist eine Flüssigkeit.

1) Man verdampft ein Theilchen in einem Platin-Löffelchen oder in einem kleinen Porzellantiegel und sieht, ob überhaupt etwas aufgelöst war und (nach §. 105. A.) von welcher Natur der Rückstand ist.

2) Man prüft mit Lackmuspapieren.

a) Blaues wird geröthet. Diese Reaction kann sowohl von einer freien Säure oder einem sauren Salze, als auch von einem in Wasser löslichen Metallsalze herrühren. Um diese beiden Fälle zu unterscheiden, gießt man etwas von der Flüssigkeit auf ein Uhrglas und stellt ein nur mit der äußersten Spitze in verdünnte kohlensaure Kalilösung getauchtes Stäbchen hinein; bleibt sie klar, oder löst sich ein entstandener Niederschlag beim Umrühren wieder auf, so ist das erstere, entsteht eine Trübung, das letztere wenigstens im Durchschnitt der Fall. Dass man bei Gegenwart einer freien Säure oder eines sauren Salzes die Lösung nicht als eine bloß wässrige betrachten dürfe, sondern bei der Untersuchung zugleich das für Körper, die in Wasser unlöslich und nur in Säuren löslich sind, Geltende zu beachten habe, versteht sich von selbst.

b) Geröthetes wird blau; deutet auf freies oder kohlensaures Alkali, auf freie alkalische Erden, alkalische Schwefelverbindungen, wie auch auf eine Reihe von sonstigen Salzen,

welchen diese Reaction eigenthümlich ist. Bei Gegenwart eines freien Alkali kann ein in der Flüssigkeit aufgelöster Körper eben so gut zu den in Wasser löslichen, wie zu den darin unlöslichen gehören. Wie man dies erfährt und was man bei alkalischen Lösungen besonders zu berücksichtigen habe, wird in der Folge §. 107. I. 2 gezeigt.

- 3) Man prüft durch Geruch und Geschmack, oder im Falle man damit nicht zu sicheren Resultaten gelangt, durch eine Destillation, ob das vorhandene einfache Lösungsmittel Wasser, Weingeist, Aether u. s. w. ist. Findet man, dass dasselbe nicht Wasser ist, so verdampft man die Lösung zur Trockne und verfährt mit dem Rückstand nach §. 106. A.
- 4) Im Falle die Lösung eine wässrige ist und im Falle sie saure Reaction zeigt, verdünnt man ein Theilchen derselben mit viel Wasser. Wird sie dadurch milchig getrübt, so deutet diese Erscheinung auf Antimon, Wismuth oder Zinn. Verschwindet der Niederschlag bei Zusatz von Weinsäure, so hat man Ursache auf Antimon, verschwindet er nicht durch Weinsäure wohl aber durch Essigsäure, auf Wismuth zu schließen. Man verfährt mit der ursprünglichen Flüssigkeit, je nachdem man sie als die Lösung einer einfachen oder zusammengesetzten (gemengten) Substanz zu betrachten Grund hat, nach §. 107. oder nach §. 114.

II. Auflösung der Körper oder Eintheilung derselben nach ihrem Verhalten zu gewissen Lösungsmitteln.

§. 106.

Die Lösungsmittel, deren wir uns bedienen, um einfache Körper oder Verbindungen einzutheilen und Gemenge zu scheiden, sind Wasser und Salzsäure oder in gewissen Fällen Salpetersäure; der Classen aber, in welche die Körper nach ihrem Verhalten zu denselben zerfallen, sind drei.

Erste Classe. In Wasser lösliche Körper.

Zweite Classe. In Wasser unlösliche oder schwerlösliche, in Salzsäure oder Salpetersäure hingegen lösliche Körper.

Dritte Classe. In Wasser, wie in Salzsäure oder Salpetersäure unlösliche oder schwerlösliche Körper.

Da Metalllegirungen zweckmäßiger auf eine etwas abweichende Art aufgelöst werden, soll für sie eine besondere Methode aufgestellt werden, §. 106. B.

Um die Auflösung oder Scheidung vorzunehmen, verfährt man nun folgendermaßen:

A. Der Körper ist weder ein regulinisches Metall, noch eine Metalllegirung.

1) Man übergießt etwa 15 bis 20 Gran des zu untersuchenden Körpers in Pulverform mit der zehn- bis zwölffachen Menge destillirten Wassers in einem Proberöhrchen und erhitzt über einer Spirituslampe zum Kochen.

a) Er löst sich ganz. In dem Falle ist er, unter Berücksichtigung des in der einleitenden Prüfung §. 105. B. 2. in Bezug auf Reaction Gesagten, in die erste Classe zu rechnen. Man verfährt mit der Lösung, je nachdem man darin eine oder mehrere Basen und Säuren voraussetzen muss, nach §. 107. oder nach §. 114.

b) Es bleibt auch nach längerem Kochen ein Rückstand. Man lässt absetzen und filtrirt die Flüssigkeit ab, wo möglich so, dass man das Ungelöste im Röhrchen behält. Dann verdampft man einige Tropfen des klaren Filtrats auf blankem Platinblech. Bleibt kein Rückstand, so war die Substanz in Wasser unlöslich, man verfährt nach §. 106. 2. Bleibt ein Rückstand, so ist die Verbindung wenigstens theilweise löslich. Man kocht nochmals mit Wasser aus und filtrirt zu der ersten Lösung. Mit dieser Flüssigkeit verfährt man sodann, je nach den Umständen, nach §. 107. oder nach §. 114. Den Rückstand aber wäscht man mit Wasser aus und verfährt damit nach §. 106. 2.

2) Einen solchen mit Wasser ausgekochten Rückstand übergießt man mit verdünnter Salzsäure. Löst er sich nicht, so erhitzt man zum Kochen, findet auch dadurch keine vollständige Auflösung statt, so gießt man ab und kocht den Rückstand mit concentrirter Salzsäure.

Die Erscheinungen, welche dabei statt finden können und wohl beachtet werden müssen, sind: α) Aufbrausen, deutet auf Kohlensäure oder Schwefelwasserstoff, siehe §. 108. 2.

β) Entwicklung von Chlor, weist auf Hyperoxyde, chrom-

saure Salze etc. γ) Entwicklung von Blausäuregeruch deutet auf unlösliche Cyanmetalle. Da letztere zweckmäßiger auf eine abweichende Art zerlegt werden, so ist ihnen ein eigener Abschnitt gewidmet, siehe §. 128.

- a) Es erfolgt durch die Behandlung mit Salzsäure vollständige Lösung; man verfährt, je nach Umständen, nach §. 110. oder nach §. 114. Der Körper gehört zur zweiten Classe.

Hierhin wird auch der Fall gerechnet, wenn nur ausgeschiedener Schwefel, der an Farbe und specifischem Gewicht leicht erkannt wird, ungelöst bleibt.

- b) Es bleibt ein Rückstand. In diesem Falle stellt man das Röhrchen, in welchem sich die mit Salzsäure gekochte Probe befindet, einstweilen bei Seite und versucht eine andere Probe des zu untersuchenden Körpers durch Kochen mit Salpetersäure und nachherigen Zusatz von Wasser zu lösen.

α) Sie löst sich dadurch ganz, oder es bleibt nur ausgeschiedener Schwefel ungelöst, alsdann gehört der Körper gleichfalls zur zweiten Classe und man wählt diese Lösung zur weiteren Untersuchung auf Basen und verfährt je nach Umständen nach §. 110. oder nach §. 114. III.

β) Es bleibt beim Kochen mit Salpetersäure ein Rückstand. Alsdann sind folgende zwei Fälle zu unterscheiden:

aa) Man hat Grund in der zu untersuchenden Substanz nur eine Base und eine Säure vorauszusetzen. Man übergießt und erhitzt alsdann den Körper mit Königswasser.

$\alpha\alpha$) Er löst sich. Man verfährt mit der Lösung nach §. 110.

$\beta\beta$) Er löst sich nicht. Man verfährt nach §. 113.

bb) Man hat Grund, die zu untersuchende Substanz als eine mehrfach zusammengesetzte oder gemengte zu betrachten. Zum Auffinden der Basen bedient man sich in diesem Falle der aufbewahrten salzsäuren Lösung (§. 106. A. 2. b.). Man erhitzt zu dem Ende dieselbe mit dem unlöslichen Rückstande, mit welchem

alsdann nach §. 106, 3. zu verfahren ist, noch einmal zum Kochen und filtrirt heiß in ein Röhrchen, das etwas Wasser enthält, kocht sodann den Rückstand mit etwas Wasser und filtrirt heiß zu der salzsauren Flüssigkeit.

αα) Das Filtrat wird milchig trübe, deutet auf Antimon und Wismuth, oder setzt feine Krystalle ab, weist auf Blei hin. Man erwärmt es, nöthigenfalls unter Zusatz von etwas Salzsäure, bis es wieder klar erscheint und verfährt damit nach §. 114. II.

ββ) Es bleibt klar. Man verdampft einige Tropfen, um sich zu überzeugen, ob Salzsäure auch etwas aufgelöst habe. Bleibt ein Rückstand, so verfährt man mit dem Filtrat nach §. 114. II.

3) Hat kochende concentrirte Salzsäure einen Rückstand gelassen, so wäscht man ihn mit Wasser aus und verfährt damit nach §. 127.

B. Der Körper ist ein Metall oder eine Metalllegirung.

Regulinische Metalle theilt man am besten nach ihrem Verhalten zu Salpetersäure ein.

I. Metalle, welche von Salpetersäure nicht angegriffen werden: Gold, Platin.

II. Metalle, welche von Salpetersäure oxydirt werden, deren Oxyde sich aber im Säureüberschuss nicht lösen: Antimon, Zinn.

III. Metalle, welche von Salpetersäure oxydirt werden und deren Oxyde sich im Säureüberschuss zu salpetersauren Salzen auflösen: alle Uebrigen.

Demzufolge übergießt man ein Theilchen des Körpers mit Salpetersäure von 1,25. sp. G. und erhitzt.

1) Es erfolgt vollständige Lösung oder es lässt sich eine solche durch Zusatz von Wasser bewirken; zeigt die Abwesenheit von Platin, Gold, Antimon und Zinn. Man verdünnt eine kleine Probe mit viel Wasser.

- a) *Sie bleibt klar*; man setzt ihr etwas Salzsäure zu, entsteht hierdurch ein weißer Niederschlag, der sich beim Erhitzen der Flüssigkeit nicht löst, von Ammoniak aber aufgelöst wird, wenn er zuvor ausgewaschen worden, so ist Silber zugegen. Man verfährt mit der Hauptlösung nach §. 115.
- b) *Sie trübt sich milchig*, zeigt die Anwesenheit des Wismuths. Man filtrirt und prüft das Filtrat wie in §. 106. B. 1. a. auf Silber. Alsdann verfährt man mit der Hauptlösung nach §. 115.

2) Es bleibt ein Rückstand;

a) *ein metallischer*. Man filtrirt ab und verfährt mit der Lösung, nachdem man geprüft hat, ob überhaupt etwas aufgelöst worden, wie im Falle §. 106. B. 1., den Rückstand aber befreit man durch Abspülen von allen gelösten Metallen, löst in Königswasser und setzt zu einer Probe Chlorkalium, zu einer andern schwefelsaures Eisenoxydul. Ein gelber Niederschlag in der ersten Probe zeigt Platin, ein schwarzer in der zweiten Gold an.

b) *ein weißer pulveriger*, deutet auf Antimon und Zinn. Man filtrirt ab, prüft, ob etwas aufgelöst worden sei und verfährt mit dem Filtrat wie im Falle §. 106. B. 1. Den Rückstand wäscht man sorgfältig aus und erhitzt mit einer heiss gesättigten Lösung von saurem weinsteinsaurem Kali, oder mit einer Lösung von Weinsteinsäure.

α) Es erfolgt vollständige Lösung, bloß Antimonoxyd, man prüft sie mit Schwefelwasserstoff-Wasser.

β) Es bleibt auch nach dem Kochen mit einer neuen Portion Weinstein- oder Weinsteinsäure-Lösung ein weißer Rückstand, wahrscheinlich Zinn. Man filtrirt ab und versetzt die Lösung mit Schwefelwasserstoffwasser. Erfolgt ein orangerother Niederschlag, so ist Antimonoxyd vorhanden. Von der Anwesenheit des Zinnoxys überzeugt man sich, indem man den Rückstand mit Cyankalium und Soda mengt und vor dem Löthrohre reducirt. Vergleiche §. 94. c. 7.

III. Eigentliche Untersuchung.

Verbindungen, in welchen nur eine Basis und eine Säure, oder ein Metall und ein Metalloid vorausgesetzt wird.

A. In Wasser lösliche Körper.

Auffindung der Base ¹⁾.

§. 107.

1) Man setzt zu einem Theilchen der wässerigen Lösung etwas Salzsäure.

a) Es entsteht kein Niederschlag; deutet mit Bestimmtheit auf die Abwesenheit des Silbers und Quecksilberoxyduls, mit Wahrscheinlichkeit auf die des Bleis. Man geht zu §. 107. 2. über.

b) Es entsteht ein Niederschlag. Man theilt die Flüssigkeit, in der er suspendirt ist, in zwei Theile und setzt zum einen Ammoniak im Ueberschuss.

α) *Der Niederschlag verschwindet, die Flüssigkeit wird klar.* Er ist alsdann Chlorsilber gewesen und zeigt die Gegenwart des Silbers an. Zur Ueberzeugung prüft man die ursprüngliche Lösung mit chromsaurem Kali und mit Schwefelwasserstoff. Siehe §. 90. a. 2. und §. 96. b. 5.

β) *Der Niederschlag wird schwarz.* Er war alsdann Quecksilberchlorür, welcher durch das Ammoniak in Quecksilberoxydul verwandelt worden ist. Man erkennt daraus die Anwesenheit des Quecksilberoxyduls. Zur Ueberzeugung prüft man die ursprüngliche Lösung mit Zinnchlorür und mit metallischem Kupfer. Siehe §. 90. b.

γ) *Der Niederschlag bleibt unverändert.* Er ist alsdann Chlorblei, welches von Ammoniak weder zersetzt, noch gelöst wird. Man erkennt daraus die Gegenwart des Bleis. Man überzeugt sich von seiner Anwesenheit erstens dadurch, dass man die zweite Hälfte der Flüssigkeit, in welcher der durch Salzsäure hervorgebrachte Niederschlag suspendirt ist, mit vielem Wasser verdünnt und erhitzt. Der Niederschlag muss sich auflösen, wenn er wirklich Chlorblei ist; zweitens durch

¹⁾ Bei diesem Gange ist zugleich auf die Arseniksäuren Rücksicht genommen, da ihre Ausmittlung im Wege liegt.

Zusatz von verdünnter Schwefelsäure zur ursprünglichen Lösung. (§. 90. c.)

2) Zu der mit Salzsäure angesäuerten Flüssigkeit setzt man Schwefelwasserstoffwasser, bis dieselbe auch nach dem Umschütteln deutlich darnach riecht, und erwärmt.

a) Die Flüssigkeit bleibt klar. Man geht zu 3) über, denn Blei, Wismuth, Kupfer, Cadmium, Quecksilberoxyd, Gold, Platin, Zinn, Antimon, Arsenik und Eisenoxyd sind nicht zugegen.

b) Man erhält einen Niederschlag.

α) Derselbe ist weiß. Er rührt alsdann von ausgeschiedenem Schwefel her und deutet auf Eisenoxyd. (§. 88. f.) Man überzeugt sich von seiner Gegenwart durch Ammoniak und durch Ferrocyankalium in der ursprünglichen Lösung. (§. 88. f.)

β) Der Niederschlag ist gelb. Er kann alsdann Schwefelcadmium, Schwefelarsenik und Zinnsulfid sein und deutet demnach entweder auf Cadmium oder auf Arsenik oder Zinnoxid hin. Zur Unterscheidung dieser Fälle setzt man zu der Flüssigkeit, in welcher der Niederschlag suspendirt ist, Ammoniak im Ueberschuss.

aa) *Er verschwindet nicht*, Cadmium, denn das Schwefelcadmium ist in Ammoniak unlöslich. Ueberzeugung durch das Löthrohr. (§. 91. d.)

bb) *Er verschwindet*, Zinnoxid oder Arsenik. Man setzt zu einem Theilchen der ursprünglichen Lösung Ammoniak.

αα) *Es entsteht ein weißer Niederschlag*, Zinnoxid. Ueberzeugung durch Reduction dieses Niederschlags mit Cyankalium und Soda vor dem Löthrohr (§. 94. b.)

ββ) *Es entsteht kein Niederschlag*, Arsenik. Vergewisserung durch Darstellung eines Metallspiegels aus der ursprünglichen Substanz oder dem Schwefelarsenniederschlag mit Cyankalium und Soda oder auf eine sonstige Art und ferner durch Behandeln der ursprünglichen Substanz mit Soda in der inneren Löthrohrflamme. (§. 94. d.)

γ) Der Niederschlag ist orangefarben. Er ist alsdann Schwefelantimon und deutet Antimonoxyd an.

Man überzeugt sich durch einen Reductionsversuch vor dem Löthrohr. (§. 94. a.)

δ) Der Niederschlag ist braun. Er ist alsdann Zinnsulfür und deutet Zinnoxydul an. Zur Ueberzeugung prüft man ein Theilchen der ursprünglichen Lösung mit Quecksilberchloridlösung, ein anderes mit Goldsolution. (§. 94. b.)

ε) Der Niederschlag ist schwarz. Er kann alsdann Schwefelblei, Schwefelkupfer, Schwefelwismuth, Schwefelgold, Schwefelplatin und Quecksilbersulfid sein. Man macht zur Unterscheidung dieser Fälle folgende Versuche mit der ursprünglichen Lösung.

aa) Zu einem Theilchen setzt man verdünnte Schwefelsäure. Weißer Niederschlag, Blei. Ueberzeugung durch chromsaures Kali. (§. 90. c.)

bb) Zu einem Theilchen setzt man Ammoniak im Ueberschuss. Blauer Niederschlag, sich im Ammoniaküberschuss mit lasurblauer Farbe lösend, Kupfer. Ueberzeugung mit Ferrocyankalium. (§. 91. b.)

cc) Zu einem Theilchen setzt man Kali, gelber Niederschlag, Quecksilberoxyd. Ueberzeugung mit Zinnchlorür und metallischem Kupfer. (§. 91. a.)

Die Anwesenheit des Quecksilberoxyds giebt sich in der Regel schon dadurch zu erkennen, dass der Niederschlag, der durch Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser entsteht, nicht gleich von Anfang schwarz erscheint, sondern erst bei Zusatz von überschüssigem Fällungsmittel durch weiß, gelb und orange in diese Farbe übergeht. (§. 91. a. 2.)

dd) Ein Theilchen der ursprünglichen Lösung verdampft man in einem Porzellantiegelchen beinahe zur Trockne und spült alsdann den Rückstand in ein halb mit Wasser gefülltes Proberöhrchen. Entsteht eine milchige Trübung, so rührt sie von einem basischen Wismuthsalz her und lässt also Wismuth erkennen. Ueberzeugung durch das Löthrohr. (§. 91. c.)

ee) Zu einem Theilchen der ursprünglichen Lösung setzt man Eisenvitriollösung. Entsteht ein feiner schwarzer Niederschlag von regulinischem Gold, so ist dieses Metall zu-

gegen. Ueberzeugung durch Behandeln dieses Niederschlags vor dem Löthrohr oder durch Prüfung der ursprünglichen Lösung mit Zinnchlorür. (§. 93. a.)

ff) Zu einem Theilchen der Lösung setzt man Chlorkalium. Entsteht ein gelber krystallinischer Niederschlag, so ist Platin zugegen. Ueberzeugung durch Glühen dieses Niederschlags. (§. 93. b.)

3) Zu der Flüssigkeit, in welcher Schwefelwasserstoff keinen Niederschlag hervorgebracht hat, oder, im Falle diese zu verdünnt geworden sein sollte, zu einem Theilchen der ursprünglichen Lösung setzt man Ammoniak bis zur alkalischen Reaction, dann Schwefelammonium. (Im Falle durch den Zusatz des Ammoniaks in der Lösung kein Ammoniaksalz entstanden ist, fügt man vor dem Zusatz des Schwefelammoniums Salmiak hinzu).

a) Es entsteht kein Niederschlag. Man geht zu §. 107. 4, über, denn Eisen, Kobalt, Nickel, Mangan, Zink, Chrom und Thonerde sind nicht vorhanden.

b) Es entsteht ein Niederschlag.

α) *Er ist schwarz.* Eisenoxydul, Nickel oder Kobalt. Man versetzt ein Theilchen der ursprünglichen Lösung mit kautistischem Kali.

aa) Man erhält einen schmutzig grünlichweißen Niederschlag, der an der Luft sehr bald rothbraun wird, Eisenoxydul. Man überzeugt sich durch Ferridcyankalium (§. 88. e.)

bb) Man erhält einen hellgrünlichen Niederschlag, der seine Farbe nicht ändert, Nickel. Ueberzeugung durch Ammoniak und Zusatz von Kali. (§. 88. c.)

cc) Man erhält einen himmelblauen beim Kochen roth werdenden Niederschlag, Kobalt. Ueberzeugung durch das Löthrohr. (§. 88. d.)

β) *Er ist nicht schwarz.*

aa) Ist er deutlich fleischroth, so ist er Schwefelmangan und deutet Manganoxydul an. Man überzeugt sich durch Zusatz von Kali zur ursprünglichen Lösung oder durch das Löthrohr. (§. 88. b.)

bb) Ist er bläulich grün, so ist er Chromoxydhydrat und deutet also auf Chromoxyd. Man überzeugt sich,

indem man die ursprüngliche Lösung mit Kali prüft und vor dem Löthrohr. (§. 87. b.)

cc) Ist er weiß, so kann er Thonerdehydrat oder Schwefelzink sein, also entweder Thonerde oder Zinkoxyd anzeigen. Man setzt zur Unterscheidung beider zu einem Theilchen der ursprünglichen Lösung tropfenweise Kali, bis der entstandene Niederschlag eben wieder gelöst ist und fügt

$\alpha\alpha$) zu einer Probe der kalischen Lösung Schwefelwasserstoffwasser, ein dadurch hervorgebrachter weißer Niederschlag lässt Zink erkennen. Ueberzeugung mit Kobaltsolution vor dem Löthrohr. (§. 88. a.)

$\beta\beta$) zu einer andern Probe der kalischen Lösung Chlorammonium. Weißer Niederschlag zeigt Thonerde an. Ueberzeugung mit Kobaltsolution vor dem Löthrohr. (§. 87. a.)

Bemerkung zu §. 107. 3. β .

Da sehr geringe Verunreinigungen die Farben der sub §. 107. 3. b. β . betrachteten Niederschläge undeutlich machen können, so ist, im Falle dieses Statt zu finden scheint, zur Entdeckung des Mangans, Chroms, Zinks und der Thonerde folgender Weg einzuschlagen.

Man setzt zu einem Theilchen der ursprünglichen Lösung Kali im Ueberschuss.

aa) Es entsteht ein weißlicher Niederschlag, der sich im Ueberschuss des Fällungsmittels nicht löst und an der Luft bald braunschwarz wird, Mangan. Man überzeugt sich durch das Löthrohr. (§. 88. b.)

bb) Es entsteht ein Niederschlag, der sich im Ueberschuss des Kali löst, Chromoxyd, Thonerde, Zink.

$\alpha\alpha$) Man setzt zu einer Probe der kalischen Lösung Schwefelwasserstoffwasser. Weißer Niederschlag, Zink.

$\beta\beta$) Im Falle die ursprüngliche oder die kalische Lösung grün erscheint, und im Falle der durch Kali erzeugte, im Ueberschuss sich wieder lösende Niederschlag bläulich war, ist Chromoxyd zugegen. Ueberzeugung

durch Kochen der kalischen Lösung und durch das Löthrohr. (§. 87. b.)

γγ) Man setzt der kalischen Lösung Chlorammonium zu. Weißer Niederschlag, Thonerde. Ueberzeugung wie oben.

4) Man fügt zu einem Theilchen der ursprünglichen Lösung Chlorammonium und kohlensaures Ammoniak, dem etwas Aetzammoniak zugesetzt ist, und kocht.

a) Es entsteht kein Niederschlag, Abwesenheit von Baryt, Strontian und Kalk. Man geht zu §. 107. 5. über.

b) Es entsteht ein Niederschlag, Anwesenheit von Baryt, Strontian oder Kalk.

Man setzt zu einer Probe der ursprünglichen Lösung Gypsolution und erwärmt.

α) *Es entsteht auch nach 5—10 Minuten keine Trübung, Kalk.* Ueberzeugung durch Oxalsäure. (§. 86. c.)

β) *Es entsteht von Anfang keine Trübung, wohl aber nach einiger Zeit, Strontian.* Man überzeugt sich durch die Alkoholflamme. (§. 86. b.)

γ) *Es entsteht sogleich ein Niederschlag, Baryt.* Man überzeugt sich mit Kieselfluorwasserstoffsäure. (§. 86. a.)

5) Zu der Probe von 4, in der man durch kohlensaures Ammoniak nach Salmiakzusatz keinen Niederschlag erhalten hat, setzt man phosphorsaures Natron.

a) Es entsteht kein Niederschlag, auch nicht nach dem Durchschütteln der Flüssigkeit, Abwesenheit der Magnesia. Man geht zu §. 107. 6. über.

b) Es entsteht ein feinkrystallinischer Niederschlag, Magnesia.

6) Man verdampft einen Tropfen der ursprünglichen Lösung auf Platinblech und glüht.

a) Es bleibt kein fixer Rückstand. Man prüft alsdann auf Ammoniak, indem man zur ursprünglichen Lösung Kali setzt und den Geruch, die Nebel mit Essigsäure und die Reaction des entweichenden Gases prüft (§. 85. c.)

b) Es bleibt ein fixer Rückstand, Kali oder Natron.

Man setzt zu einem Theilchen der ursprünglichen Lösung Weinsteinsäure und schüttelt tüchtig um.

α) *Kein Niederschlag, auch nicht nach zehn bis fünfzehn Minuten, Natron.* Ueberzeugung durch die Löthrohr- und Weingeistflamme. (§. 85. b.)

β) *Krystallinischer körniger Niederschlag, Kali.* Ueberzeugung durch Platinchlorid, durch die Löthrohr- und Weingeistflamme. (§. 85. a.)

Verbindungen, in welchen nur eine Basis und eine Säure u. s. w. vorausgesetzt wird.

A. In Wasser lösliche Körper. Auffindung der Säure.

I. Einer unorganischen.

§. 108.

Man überlegt vor Allem, welche Säuren überhaupt mit der gefundenen Base in Wasser lösliche Verbindungen bilden und nimmt bei der folgenden Prüfung darauf Rücksicht.

1) Die arsenige und die Arseniksäure erkennt man schon beim Aufsuchen der Basen, man unterscheidet sie durch ihr Verhalten zu salpetersaurem Silber, oder zu Kali und Kupfervitriol, siehe §. 94. d. und e.

2) Auf die Kohlensäure, Hydrothionsäure und Chromsäure wird man ebenfalls schon bei dem Aufsuchen der Base nach dem vorgeschriebenen Gange hingewiesen. Die beiden ersten geben sich durch Aufbrausen beim Zusatz von Salzsäure zu erkennen; man unterscheidet dieselben durch den Geruch und überzeugt sich nöthigenfalls von der Anwesenheit der Kohlensäure durch Kalkwasser, siehe §. 99. a., von der des Schwefelwasserstoffs durch Bleilösung. (§. 100. e.) Auf die Chromsäure wird man in den meisten Fällen durch die gelbe oder rothe Farbe der Lösung, sowie durch den Farbenwechsel derselben und die Schwefelabscheidung beim Zusatz des Schwefelwasserstoffwassers hingewiesen. Man überzeugt sich von ihrer Anwesenheit durch Blei- und Silber-Solution. (§. 96. b.)

3) Man setzt zu einer Probe der Lösung, nachdem man sie im

Falle saurer Reaction mit Ammoniak neutral oder schwach alkalisch gemacht hat, Chlorbarium.

a) Die Flüssigkeit bleibt klar. Man geht zu §. 108. 4. über; es wird dadurch die Abwesenheit der Schwefelsäure, Phosphorsäure und Kieselsäure mit Gewissheit, die der Oxalsäure und Borsäure mit Wahrscheinlichkeit angedeutet. Die Barytverbindungen dieser beiden letzteren Säuren werden nämlich durch Ammoniaksalze in Auflösung erhalten und der borsaure Baryt scheidet sich aus verdünnten Lösungen überhaupt nicht aus.

b) Es entsteht ein Niederschlag. Man setzt Salzsäure im Ueberschuss zu.

α) *Er löst sich auf*, keine Schwefelsäure. Man geht zu 4. über.

β) *Er bleibt ungelöst* und wird auch von vielem Wasser nicht aufgenommen, Schwefelsäure.

4) Man setzt zu einer neuen Probe, nachdem sie bei saurer Reaction mit Ammoniak neutral oder schwach alkalisch gemacht worden ist, Gypssolution.

a) Es entsteht kein Niederschlag; Abwesenheit der Oxalsäure und der Phosphorsäure. Man geht zu §. 108. 5. über.

b) Es entsteht ein Niederschlag. Man setzt Essigsäure im Ueberschuss zu.

α) *Er löst sich auf*, Phosphorsäure; Ueberzeugung mit schwefelsaurer Magnesia und Ammoniak, mit Silbersolution und vor dem Löthrohr. (§. 98. a.)

β) *Er bleibt ungelöst*, wird aber von Salzsäure leicht aufgenommen, Oxalsäure; Ueberzeugung durch concentrirte Schwefelsäure. (§. 98. c.)

5) Man macht eine neue Probe mit Salpetersäure sauer und setzt alsdann salpetersaure Silberlösung zu.

a) Die Flüssigkeit bleibt klar. Sichere Abwesenheit von Chlor und Jod, wahrscheinliche von Cyan.

Von den löslichen Cyanmetallen wird nämlich das Quecksilbercyanid durch salpetersaures Silber nicht gefällt; ob man auf dieses Rücksicht zu nehmen hat, ersieht man aus

der gefundenen Base; wie man in demselben das Cyan nachweist, siehe §. 100. d. Man geht zu §. 108. 6. über.

b) Es entsteht ein Niederschlag. Man setzt Ammoniak im Ueberschuss zu.

α) *Er löst sich nicht*, Jod, Ueberzeugung mit Stärkmehl. (§. 100. c.)

β) *Er löst sich*. Löst er sich leicht, so hat man Ursache Chlor, löst er sich schwieriger und erst bei Zusatz von viel Ammoniak, Cyan zu vermuthen. Man überzeugt sich von der Anwesenheit des Chlors durch Prüfung der ursprünglichen Flüssigkeit mit salpetersaurem Quecksilberoxydul und durch das Verhalten des Silberniederschlags in der Hitze (§. 100. a.), von der des Cyans aber durch Zusatz von Kali, Eisenoxyduloxydlösung und Salzsäure zur ursprünglichen Lösung. (§. 100. d.)

6) Man übergießt ein Theilchen des festen Körpers oder im Falle man eine Flüssigkeit hat, den durch Abdampfen erhaltenen Rückstand mit etwas Schwefelsäure, setzt Alkohol zu und entzündet diesen. Erscheint die Flamme beim Umrühren grün, so ist Borsäure zugegen.

7) Auf die Salpetersäure wird man in der Regel schon bei der vorläufigen Prüfung hingeführt (§. 105. A. I. 2. c.), man überzeugt sich von ihrer Gegenwart durch Eisenvitriol und Schwefelsäure, sowie durch Indigosolution. (§. 101. a.)

8) Was die Auffindung der an und für sich oder in löslichen Verbindungen seltner vorkommenden Chlorsäure, Flusssäure und Kieselsäure und die des Broms betrifft, so verweise ich auf §. 123. am Ende.

Verbindungen, in welchen nur eine Basis und eine Säure u. s. w. vorausgesetzt wird.

A. In Wasser lösliche Körper. Auffindung der Säure.

II. Einer organischen.

§. 109.

1) Man setzt zu einem Theilchen der wässerigen Lösung Ammoniak bis zur schwach alkalischen Reaction, dann Chlorcalcium. Im

Falle die Lösung neutral war, fügt man vor dem Zusatz des Chlorcalciums etwas Chlorammonium zu.

a) Es entsteht kein Niederschlag, auch nicht nach dem Umschütteln und nach Verlauf einiger Minuten. Abwesenheit der Oxalsäure und Weinsteinsäure. Man geht zu §. 109. 2. über.

b) Es entsteht ein Niederschlag. Man setzt zu einer neuen Probe Kalkwasser im Ueberschuss und fügt alsdann zu dem entstandenen Niederschlag Salmiaklösung.

α) *Der Niederschlag verschwindet, Weinsteinsäure.* Ueberzeugung durch essigsaures Kali, sicherer aber durch das Verhalten des durch Chlorcalcium entstandenen Niederschlags zu Aetzkali. (§. 102. b.)

β) *Der Niederschlag verschwindet nicht, Oxalsäure.*

2) Die Flüssigkeit von 1. a. erhitzt man zum Kochen, erhält sie darin eine Zeit lang und setzt der kochenden Flüssigkeit noch etwas Ammoniak zu.

a) Sie bleibt klar, keine Citronensäure. Man geht zu §. 109. 3. über.

b) Sie trübt sich und setzt einen Niederschlag ab, Citronensäure.

3) Die Flüssigkeit von 2. a. vermischt man mit Alkohol.

a) Sie bleibt klar, keine Aepfelsäure. Man geht zu §. 109. 4. über.

b) Sie wird gefällt, Aepfelsäure. Man überzeugt sich von ihrer Anwesenheit durch essigsaures Blei. (§. 102. e.)

4) Man macht eine Probe der ursprünglichen Lösung, im Falle sie es nicht schon ist, durch Ammoniak oder Salzsäure ganz neutral und setzt Eisenchloridlösung zu.

a) Es entsteht ein zimmtbrauner oder schmutzig gelber voluminöser Niederschlag. Man behandelt denselben mit verdünnter Salzsäure.

α) *Er löst sich klar, Bernsteinsäure.*

β) *Er löst sich unter Abscheidung eines weißen Niederschlags, Benzoësäure;* man überzeugt sich von ihrer Anwesenheit durch Erhitzen dieses weißen Niederschlags. Er muss das Verhalten der freien Benzoësäure zeigen, siehe §. 103. b.

b) Es entsteht eine ziemlich intensive tiefrothe Färbung der Flüssigkeit, und bei längerem Kochen scheidet sich ein hell rothbrauner Niederschlag ab. Essigsäure oder Ameisensäure.

Man erwärmt ein Theilchen des zu untersuchenden festen Salzes oder des durch Abdampfen der Flüssigkeit (wenn sie sauer ist, muss zuvor Kali bis zur Neutralität zugesetzt werden) erhaltenen Rückstandes mit Schwefelsäure und Alkohol (§. 104. a.); Geruch nach Essigäther giebt Essigsäure zu erkennen.

Von der Anwesenheit der Ameisensäure, auf welche man schliessen muss, wenn man keine Essigsäure gefunden hat, überzeugt man sich durch salpetersaures Silber und Quecksilberoxydul (§. 104. b.).

Verbindungen, in welchen nur eine Basis und eine Säure u. s. w. vorausgesetzt wird.

B. In Wasser unlösliche oder schwerlösliche, in Salzsäure, Salpetersäure oder Königswasser lösliche Körper.

Auffindung der Base¹⁾.

§. 110.

Einen Theil der Lösung in Salzsäure, Salpetersäure oder Königswasser verdünnt man mit Wasser²⁾ und verfährt sodann zur Auffindung der Base genau nach §. 107., indem man, im Falle die Auflösung eine salpetersaure ist, bei 1., im Falle sie aber schon Salzsäure enthält, bei 2. beginnt. Dabei ist Folgendes wohl zu beachten. Hat man einen in Wasser löslichen Körper und man bekommt im Laufe der Untersuchung mit Schwefelammonium nach Neutralisation der vorher zugesetzten oder überhaupt vorhandenen Säure mit Ammoniak einen weissen Niederschlag, so kann dieser nur Schwefelzink oder Thonerde sein, wie wir oben gesehen haben. Anders verhält es sich, wenn der Körper in Wasser nicht löslich war, von Salzsäure aber aufgenommen wurde.

¹⁾ Bei diesem Gang ist zugleich auf einige Salze Rücksicht genommen, da man geradezu auf dieselben hingeführt wird.

²⁾ Entsteht beim Zusatz des Wassers eine weisse Trübung oder Fällung, so deutet dieselbe auf Antimon, Wismuth oder Zinn. Vergl. §. 105. B. 4.

Es kann nämlich alsdann ein solcher durch Schwefelammonium bei Gegenwart von Salmiak hervorgebrachter weißer Niederschlag auch von einer phosphorsauren alkalischen Erde, sowie von oxalsaurem Kalk (Baryt und Strontian) herrühren. Bekommt man demnach bei Untersuchung einer sauren Lösung unter den angeführten Umständen bei Befolgung des Ganges nach §. 107. bei 3. β . cc. einen weißen Niederschlag, so verfährt man folgendermaßen. Man setzt zu einer kleinen Probe der ursprünglichen salzsauren Lösung kautistisches Kali im Ueberschuss.

1) Der entstehende Niederschlag löst sich im Ueberschuss des Fällungsmittels wieder auf, Abwesenheit der Erdsalze, Anwesenheit von Zink oder Thonerde. Zu ihrer Unterscheidung prüft man die kalische Lösung mit Schwefelwasserstoff und Chlorammonium, siehe oben §. 107. 3. β . cc. Die Thonerde kann als phosphorsaure Thonerde vorhanden gewesen und gefällt worden sein. Man erforscht dies, indem man den Niederschlag in etwas Salzsäure löst, Weinsäure zufügt, mit Ammoniak übersättigt und mit schwefelsaurer Magnesia versetzt. Im Falle Phosphorsäure zugegen ist, entsteht ein Niederschlag von basisch phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde.

2) Der entstehende Niederschlag löst sich in überschüssigem Kali nicht wieder auf. Anwesenheit eines phosphorsauren oder oxalsauren Salzes mit alkalisch erdiger Basis. Man prüft nun zuerst vorläufig, ob man mit einer oxalsauren oder mit einer phosphorsauren Verbindung zu thun hat, indem man ein Theilchen des ursprünglichen Körpers glüht. Geht derselbe dabei unter geringer Schwärzung oder auch ohne dieselbe in eine kohlensaure Verbindung über, was man leicht daran erkennt, dass die geglühte Masse beim Uebergießen mit Säuren aufbraust, während der Körper ungeglüht ruhig gelöst wird, so ist das Salz ein oxalsaures, bleibt er unverändert ein phosphorsaures.

a) Die vorläufige Prüfung deutete auf eine phosphorsaure Verbindung hin.

Man setzt zu einer Probe der salzsauren Lösung Eisenchlorid in einiger Menge, fügt Ammoniak bis zur alkalischen Reaction zu und filtrirt die Flüssigkeit von dem volu-

minösen Niederschlag, welcher eine rothbraune Farbe haben muss, ab. Durch diese Operation wird die Phosphorsäure von ihrer Base getrennt und, an Eisenoxyd gebunden, nebst freiem Oxydhydrat niedergeschlagen. Die alkalisch erdige Basis aber hat man als Chlorverbindung in dem Filtrat. Ihre weitere Erkennung geschieht auf die gewöhnliche Art, siehe §. 107. 4.

Um nun auch die Phosphorsäure nachzuweisen, digerirt man den ausgewaschenen Eisenniederschlag mit Schwefelammonium. Man bekommt dadurch Schwefeleisen und phosphorsaures Ammoniak. Man trennt durch Filtration und setzt dem Filtrat Salmiak und schwefelsaure Magnesia zu, der entstehende Niederschlag von basisch phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde lässt die Phosphorsäure mit Sicherheit erkennen. Bei genaueren Prüfungen zersetzt man erst den vorhandenen Ueberschuss des Schwefelammoniums durch Zusatz von Salzsäure, erhitzt zum Kochen, filtrirt den ausgeschiedenen Schwefel ab, engt nöthigenfalls durch Abdampfen ein, übersättigt mit Ammoniak und fügt alsdann schwefelsaure Magnesia zu.

b) Die vorläufige Prüfung deutete auf eine oxalsaure Verbindung hin.

Man kann alsdann zwei Wege einschlagen, um die Basis und die Säure mit Sicherheit zu erkennen.

Der erste ist der, dass man ein Theilchen der Verbindung glüht, den Rückstand in Salzsäure löst und in dieser Lösung die alkalisch erdige Basis auf die gewöhnliche Art darthut. Von der Anwesenheit der Oxalsäure überzeugt man sich alsdann durch das Verhalten einer weiteren Probe zu concentrirter Schwefelsäure (§. 98. c.).

Der zweite ist der, dass man ein Theilchen der Verbindung mit concentrirter kohlensaurer Kalilösung einige Zeit kocht und dann die Flüssigkeit von dem Rückstande abfiltrirt. Durch diese Behandlung erhält man die alkalisch erdige Basis an Kohlensäure gebunden im Rückstand, die Oxalsäure aber mit Kali vereinigt in der Lösung; man weist sie darin, nachdem man mit Essigsäure sauer gemacht hat, mit Gypssolution nach (§. 98. c.). Den Rückstand löst man nach dem Auswaschen in Salzsäure und verfährt mit der Lösung wie gewöhnlich (§. 107. 4.).

Verbindungen, in welchen nur eine Basis und eine Säure u. s. w. vorausgesetzt wird.

B. In Wasser unlösliche oder schwer lösliche, in Salzsäure, Salpetersäure oder Königswasser lösliche Körper. Auffindung der Säure.

I. Einer unorganischen.

§. 111.

1) Chlorsäure kann nicht zugegen sein, denn die chlorsauren Salze sind sämmtlich im Wasser löslich; auf Salpetersäure hat man ebenfalls gewöhnlich keine Rücksicht zu nehmen, da sich auch die salpetersauren Salze fast alle in Wasser lösen. Der Ausnahmen sind wenige. Als die am häufigsten vorkommende verdient das basisch salpetersaure Wismuth erwähnt zu werden. Man überzeugt sich von der Anwesenheit der Salpetersäure in solchen Verbindungen am schnellsten durch die Verpuffung, wenn man sie auf glühende Kohlen wirft. Genauer durch die Verpuffung, welche beim Zusammenschmelzen mit Cyankalium entsteht, siehe §. 101. a. — Wegen der in Wasser unlöslichen Cyanmetalle siehe § 128.

2) Die arsenige und Arseniksäure, die Kohlensäure, Hydrothionsäure und Chromsäure hat man schon bei der Prüfung auf Basen gefunden, und zwar wurde man auf die letztere durch die gelbe oder rothe Farbe der Verbindung, durch die Chlorentwicklung beim Kochen mit Salzsäure und durch die nachherige Auffindung von Chromoxyd in der Lösung hingewiesen.

Die sicherste Methode, sich von der Gegenwart der Chromsäure zu überzeugen, welche sich in allen Fällen anwenden lässt, ist die, dass man die Verbindung mit etwas kohlensaurem Natron und Salpeter zusammenschmilzt (§. 96. b.).

3) Man kocht eine Probe der Substanz mit Salpetersäure.

a) Entwickelt sich dabei Stickoxydgas, welches sich durch die rothen Dämpfe von salpetriger Säure, die es beim Zusammentreffen mit Luft bildet, zu erkennen giebt, so deutet dies ein Schwefelmetall, entwickelt sich Kohlensäure, ein kohlensaures Salz an. Von der Anwesenheit eines Schwefelmetalls

überzeugt man sich alsdann leicht, wenn man die salpetersaure Lösung mit Chlorbarium prüft; sie muss damit einen auch in vielem Wasser nicht löslichen Niederschlag von schwefelsaurem Baryt geben. Ebenso sicher erkennt man Schwefelmetalle vor dem Löthrohr, siehe §. 100. e.

b) Entweichen violette Dämpfe, so ist die Verbindung ein Jodmetall. Ueberzeugung durch ein mit Amylum bestrichenenes Papier (§. 100. c.)

4) Zu einem Theilchen der salpetersauren Lösung, welche man, im Falle bei der Behandlung mit Salpetersäure ein darin unlöslicher Rückstand geblieben ist, zuvor filtrirt, setzt man salpetersaures Silber; weißer Niederschlag, in Ammoniak löslich, beim Erhitzen ohne Zersetzung schmelzend, Chlor.

5) Man kocht eine Probe mit Salzsäure, filtrirt, wenn nöthig, und setzt salpetersauren Baryt zu; entsteht ein weißer, auch bei Zusatz von viel Wasser nicht verschwindender Niederschlag, so ist die Säure Schwefelsäure.

6) Auf Borsäure prüft man wie oben, §. 108.

7) War von allen bisher genannten Säuren keine zugegen, so hat man Grund, auf die Gegenwart von Phosphorsäure oder Oxalsäure oder auch auf die Abwesenheit eines aciden Körpers zu schliessen. Im Falle die Phosphorsäure an eine alkalische Erde und die Oxalsäure an Kalk (Baryt oder Strontian) gebunden gewesen wäre, hätte man sie schon beim Aufsuchen der Basen erkannt (§. 110.), man hat daher jetzt nur nöthig, auf dieselben Rücksicht zu nehmen, wenn die Untersuchung eine andere Basis ergeben hat. Man wendet alsdann zur Prüfung die von den schweren Metallen befreite Flüssigkeit, sei es, dass dieselben aus saurer Lösung durch Schwefelwasserstoff, sei es, dass sie aus alkalischer durch Schwefelammonium gefällt worden sind, an, und weist die beiden Säuren darin, wie oben §. 108. 4. nach.

8) Wegen Auffindung der Kieselsäure, des Broms und Fluors siehe §. 123. am Schluss.

Verbindungen, in welchen nur eine Basis und eine Säure vorausgesetzt wird.

B. In Wasser unlösliche oder schwerlösliche, in Säuren lösliche Körper. Auffindung der Säure.

II. Einer organischen.

§. 112.

1) Man löst eine Probe in möglichst wenig Salzsäure. Bleibt ein Rückstand, so ist dieser durch Erhitzen auf Benzoësäure zu prüfen. Zur Lösung setzt man kohlensaures Kali im Ueberschuss, kocht eine Zeit lang und filtrirt. Man hat jetzt unter allen Umständen die organische Säure in dem alkalischen Filtrat. Man sättigt dieses daher genau mit Salzsäure und prüft diese Flüssigkeit wie oben §. 109. angegeben. Auf Ameisensäure braucht man nicht Rücksicht zu nehmen, da ihre Salze sämmtlich in Wasser löslich sind.

2) Die Essigsäure findet man in solchen Verbindungen mittelst Schwefelsäure und Alkohol am schnellsten. (§. 104. a.)

Verbindungen, in welchen nur eine Basis und eine Säure u. s. w. vorausgesetzt wird.

C. In Wasser, in Salzsäure, Salpetersäure und Königswasser unlösliche oder schwerlösliche Körper. Auffindung der Base und der Säure.

§. 113.

(Unter dieser Rubrik betrachten wir hier schwefelsauren Baryt, schwefelsauren Strontian, schwefelsauren Kalk, Kieselerde, schwefelsaures Bleioxyd, Chlorblei und Chlorsilber, als diejenigen Verbindungen, welche von allen hierher gehörigen allein häufig vorkommen. Hinsichtlich der in diese Classe gehörenden seltner zur Untersuchung kommenden Verbindungen wird auf §. 127. verwiesen.

Schwefelsaurer Kalk und Chlorblei sind in Wasser nicht unlöslich, schwefelsaures Bleioxyd kann in Salzsäure aufgelöst werden. Diese Verbindungen werden jedoch, da sie so schwer löslich sind, dass man selten eine totale Lösung bekommt, hier nochmals mit abgehandelt, damit dieselben, im Falle sie bei der Untersuchung der wässerigen oder sauren Lösung übersehen wurden, hier gefunden werden.

1) Man übergießt eine ganz geringe Menge der Substanz mit Schwefelammonium.

a) Sie wird schwarz, deutet auf die Anwesenheit eines Bleisalzes oder des Chlorsilbers. Man digerirt eine etwas grössere Probe der Substanz mit Schwefelammonium eine Zeit lang. Dadurch wird das Metallsalz zersetzt, man erhält ein Schwefelmetall, welches ungelöst bleibt, während sich die Säure des Metallsalzes mit dem Ammoniak des Schwefelammoniums verbunden in der Lösung befindet. Man filtrirt nun ab, löst das ausgewaschene Schwefelmetall in Salpetersäure und prüft mit Schwefelsäure auf Blei, mit Chlorwasserstoffsäure und nachherigen Zusatz von Ammoniak auf Silber. Im Filtrat prüft man, nachdem man den Ueberschuss des Schwefelammoniums durch Zusatz von Salzsäure und Aufkochen zersetzt hat, mit Chlorbarium auf Schwefelsäure, in einem andern Theile, nachdem man mit Salpetersäure angesäuert und gekocht hat, mit Silberlösung auf Chlorwasserstoff.

b) Sie bleibt weifs. Abwesenheit eines schweren Metalloxyds. Man mengt eine kleine Probe der sehr fein geriebenen Substanz mit der vierfachen Quantität kohlensauren Natron-Kalis, giebt in einen kleinen Platintiegel und schmilzt über der Berzelius'schen Spirituslampe.

Die geschmolzene Masse kocht man mit Wasser.

α) *Es erfolgt totale Lösung, Kieselerde.* Man überzeugt sich, indem man die Lösung mit Salzsäure übersättigt und zur Trockne verdampft. Hierdurch geht die Kieselsäure in die unlösliche Modification über. Sie bleibt daher zurück, wenn man die abgedampfte Masse mit Wasser auszieht. Mit Soda giebt sie in guter Löthrohrflamme ein klares Glas. (§. 99. b.)

β) *Es bleibt ein weisser Rückstand, eine der schwefelsauren alkalischen Erden.* Man filtrirt ab. Im Filtrat erkennt man die Schwefelsäure mit Chlorbarium, nachdem man mit Salzsäure sauer gemacht hat. Den weissen Rückstand (die kohlensaure alkalische Erde) wäscht man sorgfältig aus, löst in wenig verdünnter Salzsäure und prüft die Lösung auf Baryt, Strontian und Kalk, wie oben §. 107. 4. angegeben wurde.

Verbindungen, in welchen sämtliche häufiger vorkommende Basen, Säuren, Metalle und Metalloide vorausgesetzt werden.

A. In Wasser lösliche und in Wasser unlösliche, aber in Salzsäure oder Salpetersäure lösliche Körper. Auf-
findung der Basen¹⁾.

§. 114.

Das Schema zur Untersuchung auf die Basen ist für die Verbindungen der Classe I. und II. (s. §. 106.) vereinigt, da der Gang in den meisten Fällen derselbe ist. Die Abschnitte, die sich bloß auf in Wasser unlösliche, in Salzsäure oder Salpetersäure lösliche Körper beziehen, sind zu schnellerer Uebersicht mit Anführungszeichen („—“) versehen und können also bei Untersuchung in Wasser löslicher Körper überschlagen werden.

I. Man hat eine rein wässrige Lösung.

Man versetzt dieselbe mit etwas Salzsäure.

1) Sie reagirte vorher sauer oder war neutral.

a) Es entsteht kein Niederschlag, zeigt die Abwesenheit von Silber und Quecksilberoxydul. Man geht zu §. 115. über.

b) Es entsteht ein Niederschlag; man setzt tropfenweise mehr Salzsäure zu, bis die Menge des Niederschlags nicht weiter zunimmt. Derselbe kann sein: Chlorsilber, Quecksilberchlorür, Chlorblei, ein basisches Antimonsalz, möglicherweise auch Benzoësäure. Man verdünnt ein Theilchen der aufgeschüttelten Flüssigkeit sammt dem darin suspendirten Niederschlag mit vielem Wasser und erhitzt zum Kochen.

Bei Anwesenheit von Wismuth-, Antimon- oder Zinn-Verbindungen kann durch das Verdünnen mit Wasser eine milchige Trübung entstehen, welche Erscheinung sich ungeachtet des schon in der Flüssigkeit befindlichen Niederschlags gewöhnlich sehr deutlich wahrnehmen lässt. Um in solchen Fällen mit Sicherheit beurtheilen zu können, ob der durch Salzsäure entstandene Niederschlag von Wasser beim Kochen gelöst wird oder nicht,

¹⁾ Bei diesem Gange ist zugleich auf die Arseniksäuren und einige Salze Rücksicht genommen, da ihre Ausmittlung im Wege liegt.

ob man also nach α oder β zu verfahren habe, setzt man zur verdünnten Flüssigkeit, ehe man sie erhitzt, Salzsäure, bis die milchige Trübung verschwindet.

α) Der Niederschlag verschwindet, zeigt die Abwesenheit des Silbers und des Quecksilberoxyduls. Man erhitzt die Hauptlösung sammt dem darin befindlichen Niederschlag zum Kochen und filtrirt heiß. Im Falle der Niederschlag sich nicht ganz löst, kocht man den Rückstand nochmals mit Wasser und filtrirt die Lösung heiß zur ersten. Mit dem Filtrat verfährt man nach §. 115. Im Falle es beim Erkalten einen Niederschlag oder kleine Krystalle (Chlorblei) abgesetzt hätte, erhitzt man es vorher, bis es wieder klar erscheint.

β) Der Niederschlag verschwindet nicht oder nicht vollständig, deutet auf Silber und Quecksilberoxydul.

Man verfährt mit der Hauptlösung wie in §. 114. I. 1. b. α . Der dabei zurückbleibende unlösliche Niederschlag wird ausgewaschen und folgendermaßen geprüft. Man übergießt ihn, wo möglich vom Filter getrennt, in einem Röhrchen mit Ammoniak. Löst er sich darin auf, so ist bloß Silber, wird er schwarz, Quecksilberoxydul zugegen. In diesem Falle, oder überhaupt wenn ein in Ammoniak unlöslicher Rückstand blieb, filtrirt man ab und setzt Salpetersäure im Ueberschuss zum Filtrat; entsteht ein weißer, käsiger Niederschlag, so zeigt er Silber an.

2) Die wässerige Lösung reagirte alkalisch.

a) Es entsteht durch den Zusatz von Salzsäure bis zur stark sauren Reaction keine Gasentwicklung und kein Niederschlag, oder der entstandene löst sich bei Zusatz von mehr Säure wieder auf; man geht zu §. 115. über. Von dem sich auf die Körper der zweiten Classe Beziehenden, mit Anführungszeichen versehenen hat man nur das die phosphorsaure Thonerde, bei Anwesenheit eines Ammoniaksalzes jedoch auch das die oxalsauren Erden Betreffende zu berücksichtigen, da diese Verbindungen in einer alkalisch reagirenden Flüssigkeit denkbarer Weise gelöst sein können.

b) Es entsteht durch den Zusatz der Salzsäure ein Niederschlag, der sich im Ueberschuss derselben nicht löst.

α) Es entwickelt sich zu gleicher Zeit kein Schwefelwasser-

stoffgas. Man verdünnt ein Theilchen der Flüssigkeit, in welcher der Niederschlag suspendirt ist, mit viel Wasser und erhitzt. Löst sich der Niederschlag auf, so ist Blei, möglicherweise auch Benzoësäure, zu vermuthen. Man erhitzt die Hauptlösung sammt dem Niederschlag zum Kochen, filtrirt heiß, kocht einen etwa bleibenden Rückstand mit Wasser, filtrirt heiß zur salzsauren Lösung und verfährt mit dem im Fall eingetretener Trübung nochmals erhitzten Filtrat nach §. 115. Löst sich der Niederschlag beim Erhitzen der mit Wasser verdünnten Flüssigkeit nicht auf, wird er aber von Ammoniak aufgenommen, so ist Silber zugegen. Die Behandlung der Hauptlösung bleibt sich gleich.

β) *Es entwickelt sich zu gleicher Zeit Schwefelwasserstoffgas.*

aa) Der Niederschlag ist ein rein weißer von ausgeschiedenem Schwefel. Alsdann ist ein geschwefeltes alkalisches Schwefelmetall vorhanden. Man filtrirt ab und geht zu §. 118 über, mit der Beachtung, dass von den daselbst berücksichtigten Körpern nur Chromoxyd und Thonerde vorhanden sein können.

bb) Der Niederschlag ist gefärbt. Alsdann muss man auf ein metallisches Schwefelsalz, d. h. auf die Verbindung einer alkalischen Schwefelbase mit einem electronegativen Schwefelmetall schließen. Man filtrirt, nachdem man zuvor die Flüssigkeit zum Kochen erhitzt hat, ab und fährt mit der Untersuchung des Filtrats wie vorher im Falle aa fort. Mit dem Niederschlage, der Schwefelgold, Schwefelplatin, Schwefelzinn, Schwefelarsen und Schwefelantimon sein kann, verfährt man nach §. 116.

c) Es entsteht durch den Zusatz von Salzsäure kein bleibender Niederschlag, aber eine Gasentwicklung.

α) *Das entweichende Gas riecht nach Schwefelwasserstoff,* dies deutet auf eine einfache alkalische Schwefelverbindung. Man verfährt wie vorher im Falle aa.

β) *Das entweichende Gas ist geruchlos,* so ist es Kohlensäure, die an ein Alkali gebunden war. Man geht zu §. 115 über mit der Beachtung, dass Quecksilber, Wismuth, unlösliche Talksalze und, bei stark alkalischer Reaction, Baryt, Stron-

tian und Kalk nicht oder nur bei ganz besonderen Umständen (z. B. das Quecksilber als Cyanverbindung) zugegen sein können.

II. Man hat eine salzsaure Lösung.

Man verfährt mit derselben nach §. 115.

III. Man hat eine salpetersaure Lösung.

Man verdünnt eine kleine Probe mit viel Wasser.

1) Sie bleibt klar, man setzt Salzsäure zu.

a) *Es entsteht kein Niederschlag.* Abwesenheit von Silber. Man verfährt mit der Hauptlösung nach §. 115.

b) *Es entsteht ein Niederschlag.* Löst er sich nicht beim Erhitzen der Flüssigkeit, wohl aber, nachdem er ausgewaschen ist, in Ammoniak, so ist Silber zugegen. Mit der Hauptlösung verfährt man nach §. 115.

2) Sie wird milchig, Wismuth oder Antimon. Man filtrirt ab und verfährt mit dem Filtrat zur Entdeckung des Silbers nach §. 114. III. 1., mit der Hauptlösung aber nach §. 115.

§. 115.

Zu einem kleinen Theil der sauren, klaren Lösung setzt man Schwefelwasserstoffwasser, bis der Geruch nach dem Umschütteln deutlich hervortritt, und erwärmt.

a) *Es entsteht kein Niederschlag*, auch nicht nach einiger Zeit. Man geht zu §. 118 über, denn Blei, Wismuth, Cadmium, Kupfer, Quecksilber, Gold, Platin, Antimon, Zinn und Arsenik¹⁾ sind nicht zugegen; außerdem wird auch die Abwesenheit des Eisenoxyds und der Chromsäure dadurch angedeutet.

b) *Es entsteht ein Niederschlag.*

aa) *Er ist rein weiß*, dünn, feinpulverig und verschwindet nicht durch Zusatz von Salzsäure. Es ist ausgeschiedener Schwefel. Er lässt Eisenoxyd vermuthen²⁾. Alle

¹⁾ Um von der Abwesenheit der Arseniksäure vollkommen überzeugt zu sein, muss man die Probe längere Zeit stehen lassen, oder vor dem Zusatz des Schwefelwasserstoffs schweflige Säure zusetzen. Vergl. §. 93. e. Ob man dazu Grund hat, lehrt die einleitende Prüfung.

²⁾ Bei Gegenwart von schwefliger Säure, Jodsäure, Bromsäure, welche wir nicht in den Kreis der Untersuchung aufgenommen haben, wie auch bei der

übrigen in §. 115. a. genannten Metalle können nicht zugegen sein. Man verfährt mit der Hauptlösung nach §. 118.

bb) *Er ist gefärbt.*

Man setzt alsdann zum größern Theil der sauren oder angesäuerten Lösung Schwefelwasserstoffwasser im Ueberschuss, das heißt bis die Lösung deutlich darnach riecht und der Niederschlag sich durch weiteren Zusatz nicht vermehrt, erhitzt bis fast zum Kochen und schüttelt einige Zeit sehr stark.

In vielen Fällen, ganz besonders aber, wenn man Grund hat, Arsenik zu vermuthen, ist es zweckmäßiger, Schwefelwasserstoffgas durch die Lösung streichen zu lassen.

1) Der Niederschlag ist ein rein gelber. Er kann nur von arseniger oder Arsenik-Säure, von Zinnoxid oder von Cadmiumoxyd herrühren. Man trennt die Flüssigkeit, welche nach §. 118. weiter zu untersuchen ist, von dem Niederschlag¹⁾, wäscht diesen aus und übergießt ihn mit Ammoniak.

a) *Er löst sich vollständig auf*, Abwesenheit von Cadmium. Man setzt zur Lösung Essigsäure im geringen Ueberschuss und prüft den entstandenen Niederschlag nach §. 116. 1. auf Zinn und Arsenik.

b) *Es bleibt auch nach Zusatz von mehr Ammoniak und nach gelindem Erwärmen ein gelber Rückstand*, Cadmium. Man filtrirt ab und setzt Essigsäure im geringen Ueberschuss zum Filtrat. Entsteht kein Niederschlag, so war der Niederschlag bloß Schwefelcadmium, entsteht einer, so deutet er auf Zinnoxid und Arsenik; man prüft ihn nach §. 116. 1.

der Chromsäure und Chlorsäure und des freien Chlors wird gleichfalls Schwefel ausgeschieden.

¹⁾ Die zweckmäßigste Art, einen Niederschlag von einer Flüssigkeit zu trennen, welche bei qualitativen Analysen stets, wenn es irgend möglich ist, angewendet zu werden verdient, ist die, dass man den Niederschlag sich zu Boden setzen lässt (welches Absetzen durch Erwärmen und heftiges Schütteln fast immer bewerkstelligt werden kann) und die überstehende Flüssigkeit alsdann in der Art auf ein Filter gießt, dass der Niederschlag im Röhrchen bleibt, in welchem er sodann durch Decantation ausgewaschen wird.

2) Der Niederschlag ist orangeroth, oder gelb mit Neigung in's Orangefarbene. Er zeigt Antimon an und kann außerdem Zinn (im Falle es als Oxyd vorhanden gewesen wäre), Arsenik und Cadmium enthalten. Man trennt von der Flüssigkeit, welche nach §. 118. weiter untersucht wird, wäscht den Niederschlag aus und digerirt eine kleine Probe desselben mit Schwefelammonium, welches überschüssigen Schwefel enthält.

a) *Sie löst sich ganz*, kein Cadmium. Man verfährt mit dem Rest des Niederschlags nach §. 116. 2.

b) *Es bleibt auch nach längerem Digeriren mit mehr Schwefelammonium ein gelber Rückstand*, Cadmium. Man verfährt alsdann mit dem gesammten Niederschlage wie mit der Probe, filtrirt von dem Schwefelcadmium ab, versetzt das Filtrat mit Essigsäure im gelinden Ueberschuss und verfährt mit dem entstehenden Niederschlag nach §. 116. 2.

3) Der Niederschlag ist dunkel, von brauner oder schwarzer Farbe. Man trennt den Niederschlag von der Flüssigkeit (welche nach §. 118. weiter untersucht wird) wo möglich durch Absetzenlassen, so dass man nur die überstehende Flüssigkeit aufs Filtrum gießt, wäscht ihn mit Wasser aus, übergießt mit Schwefelammonium, welches entweder durch Einwirkung der Luft oder durch Zusatz von Schwefel einen Ueberschuss an Letzterem enthält, und digerirt einige Zeit damit¹⁾.

a) *Der Niederschlag löst sich im Schwefelammonium oder Schwefelkalium ganz auf*; dadurch wird die Anwesenheit von Cadmium, Blei, Wismuth, Kupfer und Quecksilber ausgeschlossen, weshalb der §. 117. zu überschlagen ist. Man setzt zu der Lösung, nachdem sie verdünnt worden, Essigsäure bis zur sauern Reaction, erhitzt zum Kochen und verfährt mit dem entstandenen Niederschlag nach §. 116.

b) *Er löst sich nicht, oder nicht vollständig*. Man filtrirt die Flüssigkeit ab, wo möglich so, dass man den ungelösten Nieder-

¹⁾ Wenn in der Lösung Kupfer vorhanden ist, was meist schon ihre Farbe, mit Sicherheit aber eine vorläufige Probe mit einem blanken Eisenstäbchen vergl. §. 91. b. 6. zu erkennen giebt, so muss anstatt des Schwefelammoniums Schwefelkaliumlösung genommen und der Schwefelniederschlag damit gekocht werden (siehe §. 91. b. 2.)

schlag im Röhrchen behält und wäscht denselben im Falle §. 115. 3. b. α . mit Wasser aus, im Falle β . digerirt man ihn nochmals mit Schwefelammonium, filtrirt zur ersten Lösung und wäscht dann aus. Den Rückstand bewahrt man zur weiteren Untersuchung nach §. 117.

Ein kleines Theilchen des schwefelammonhaltigen Filtrats verdünnt man mit drei bis vier Theilen Wasser, setzt Essigsäure bis zur sauren Reaction zu und erhitzt zum Kochen.

α) *Es entsteht blofs eine rein weifse Trübung von ausgeschiedenem Schwefel.* Alsdann ist weder Gold noch Platin, Zinn, Antimon oder Arsenik vorhanden. Man geht zu §. 117. über.

β) *Es entsteht ein gefärbter Niederschlag.* Man beobachtet die Farbe genau, setzt alsdann zur gesammten schwefelammonhaltigen Lösung, nachdem man sie etwas verdünnt hat, Essigsäure bis zur sauren Reaction und erhitzt zum Kochen.

§. 116.

Der Niederschlag, der durch Essigsäure in der schwefelammon- oder schwefelkalium-haltigen Lösung hervorgebracht wurde, ist:

1) rein gelb, ohne Neigung in's Orangefarbene; Arsen oder Zinn. Man filtrirt ab, wäscht gut aus, legt das Filtrum mit dem Niederschlag zwischen Fließpapier, nimmt denselben, wenn sich die Hauptmasse des Wassers in das Papier gezogen hat, noch feucht vom Filter (was alsdann sehr leicht geschehen kann), mengt den feuchten Niederschlag etwa mit der Hälfte seines Volumens reiner zerfallener Soda und dem anderthalbfachen Volumen reinen Salpeters in einem Porzellantiegelchen, erwärmt unter Umrühren gelinde bis die Masse trocken wird, alsdann stärker vom Rand des Tiegels her bis die ganze Masse schmilzt und kein Theilchen des Schwefelmetalls mehr unzersetzt ist. — (Erhitzt man, nachdem die Masse trocken geworden, plötzlich sehr stark und lässt man die Flamme auf den ganzen Tiegel wirken, so entstehen leicht kleine Explosionen, wodurch mehr oder weniger der Masse aus dem Tiegelchen ausgeschleudert wird).

a) *Die schmelzende Masse ist klar.* Abwesenheit des Zinns. Man kocht die erkaltete Masse mit Wasser, theilt die Lösung in

zwei Theile, setzt zum einen sehr behutsam stark verdünnte Salpetersäure bis zur schwach sauren Reaction und erhitzt. (Ist wirklich kein Zinn zugegen, so darf erstens beim Kochen der verpufften Masse mit Wasser kein weißer pulveriger Rückstand geblieben und zweitens durch Ansäuren der Lösung mit Salpetersäure auch nach einigem Stehen kein Niederschlag entstanden sein.) Zu der erkalteten angesäuerten Lösung setzt man salpetersaures Silberoxyd, filtrirt, im Falle sich etwas Chlorsilber ausscheiden sollte, was sehr häufig eintritt, wenn die Reagentien nicht absolut rein waren und der Niederschlag nicht vollkommen ausgewaschen wurde, und gießt auf das Filtrat am Rande des schief zu haltenden Röhrchens hinab eine Schicht ganz verdünntes Ammoniak (ein Theil gewöhnliches Ammoniak, zwanzig Theile Wasser) und läßt ohne zu Schütteln eine Zeit lang stehen. Ein entstehender rothbrauner Niederschlag, der an der Berührungsfläche der beiden Schichten wolkenartig erscheint (er kann weit leichter bei auffallendem, als bei durchfallendem Lichte wahrgenommen werden) zeigt Arsen an. Zur festeren Ueberzeugung fällt man jetzt den zweiten Theil der Auflösung der verpufften Masse mit Bleizuckerlösung, filtrirt den Niederschlag ab, läßt ihn zwischen Fließpapier etwas abtrocknen und setzt ihn sodann auf Kohle der innern Löthrohrflamme aus. Man bekommt, im Falle Arsen zugegen ist, ein arsenhaltiges Bleikorn, welches den knoblauchartigen Arsengeruch sehr lange und anhaltend entwickelt, so oft man die innere Löthrohrflamme darauf wirken läßt. — Zu weiterer Bestätigung muss das Arsen auf irgend eine Art in metallischer Form dargestellt werden. Vergleiche §. 94. d. und §. 94. e. Ob es in der Verbindung als arsenige oder als Arsenik-Säure vorhanden war, erforscht man nach der §. 94. am Ende angegebenen Methode.

b) *Die schmelzende Masse ist weißlich trübe.* Wahrscheinliche Anwesenheit des Zinns. Man digerirt die Masse mit kaltem Wasser und zerreibt sie damit in einem kleinen Mörser, alsdann filtrirt man die Lösung ab und wäscht den Niederschlag, der geblieben sein muss, wenn Zinn wirklich zugegen ist, sehr sorgfältig aus. Man weist das Zinn darin nach, indem man ihn vor dem Löthrohre mit Cyankalium und Soda reducirt und die Probe im Mörserchen unter Zusatz von Wasser heftig reibt, siehe §. 94. b. — Die abfiltrirte Flüssigkeit theilt

man in zwei Theile und verfährt zur Nachweisung des Arsens genau wie in §. 116. 1. a. angegeben worden ist. — Beim Ansäuern der Lösung mit Salpetersäure scheidet sich in der Regel ein geringer Niederschlag aus. Man kann ihn abfiltriren und ebenso wie den ungelösten Rückstand auf Zinn prüfen. Im Falle man aber das Zinn schon gefunden hat, vernachlässigt man denselben, setzt, ohne ihn von der Flüssigkeit zu trennen, salpetersaures Silberoxyd zu, filtrirt und prüft wie oben angegeben durch Zusatz von Ammoniak auf Arseniksäure. — Ob das Zinn als Oxydul zugegen war, findet man, indem man ein Pröbchen der ursprünglichen Lösung in Wasser oder Salzsäure mit einem Tropfen Salpetersäure und etwas Goldchlorid versetzt. (§. 94. b. 5.)

2) orangeroth oder gelb mit Neigung in's Orangefarbene; Antimon. Außerdem kann noch Zinn und Arsen zugegen sein. Man schmilzt den ausgewaschenen Niederschlag mit Salpeter und Soda und verfährt überhaupt zur Prüfung auf Arsen und Zinnoxidul genau nach §. 116. 1. b. Den beim Behandeln der verpufften Masse mit kaltem Wasser bleibenden Rückstand, sowie den beim Ansäuern der Lösung mit Salpetersäure etwa entstehenden Niederschlag aber kann man auf dreierlei Art prüfen.

a) Man mengt ihn nach sorgfältigstem Auswaschen mit Cyankalium und Soda und setzt ihn im Kohlengrübchen der innern Löthrohrflamme aus.

α) Es erscheinen Metallkügelchen, welche sich unter Ausstoßung eines weißen Rauches und Bildung eines weißen Beschlags endlich vollständig verflüchtigen. Hierdurch wird die Anwesenheit des Antimons bestätigt, die Abwesenheit des Zinns dargethan.

β) Es bleiben nach langem Blasen weiche Metallkörnchen, Zinn. Ihre Anwesenheit und Beschaffenheit erkennt man am Besten beim Zerreiben der mit den umgebenden Kohletheilchen ausgegrabenen Probe mit etwas Wasser in einem Mörserchen. (§. 94. b.)

b) Man wäscht ihn sehr sorgfältig mit Wasser aus, trocknet ihn und schmilzt denselben mit seiner vier- bis fünffachen Quantität Cyankalium in einem kleinen Porzellantiegelchen einige Zeit. Nach dem Erkalten übergießt man die Masse mit

Wasser, erhitzt zum Kochen und trennt so die Schlacke von den erhaltenen Metallkörnchen. Diese aber behandelt man mit Salpetersäure und verfährt überhaupt zur Entdeckung des Zinns und Antimons genau nach §. 106. B. 2. b.

c) Man löst den zu prüfenden Rückstand nach gutem Auswaschen in Salzsäure, verdünnt die Lösung und stellt ein Zinkstäbchen hinein. Wenn die Einwirkung nachgelassen hat und die Reduction vollendet ist, kocht man die reducirten Metalle, welche von dem compacten Zinkstücke leicht zu trennen sind, mit Salpetersäure und verfährt ebenfalls genau nach §. 106. B. 2. b.

Die beiden letzteren Methoden, Zinn und Antimon neben einander zu erkennen, sind, wenigstens in den Händen von Anfängern, weit sicherer als die erstere.

3) braunschwarz; Gold oder Platin. Außerdem vielleicht auch Antimon, Arsenik, Zinn. Man setzt zur ursprünglichen Lösung der Substanz

a) Zinnchlorür; entsteht ein röthlichbrauner oder purpurfarbiger Niederschlag, so ist Gold zugegen. Von seiner Anwesenheit kann man sich, ebenfalls in der ursprünglichen Lösung, auch durch schwefelsaures Eisenoxydul überzeugen, wodurch regulinisches Gold als schwarzes Pulver ausgeschieden wird.

b) Chlorammonium; entsteht ein gelber Niederschlag, so ist Platin zugegen. Ist die Lösung sehr verdünnt, so muss sie vor Zusatz dieses Reagens durch Abdampfen concentrirt werden.

Zur Untersuchung des Niederschlags auf Arsenik verfährt man mit einem Theilchen desselben nach §. 116. 1. Den Rest kocht man mit concentrirter Salzsäure und filtrirt ab, das Filtrat prüft man auf Antimon, indem man, nachdem der Säureüberschuss durch Abdampfen möglichst entfernt ist, einen Tropfen in Wasser fallen lässt, eine entstehende milchige Trübung zeigt es an; ferner, indem man ein Pröbchen mit Schwefelwasserstoffwasser versetzt, ein orangefarbener Niederschlag lässt es erkennen. Den Rest der salzsauren Lösung verdampft man zur Trockne, mengt ihn mit Soda und Cyankalium und prüft auf Zinnoxid, wie in §. 116. 2. angegeben ist. — Sicherer findet man das Antimon und Zinn, wenn man sie aus dem salzsauren Filtrat mit Zink niederschlägt und überhaupt ganz nach §. 116. 2. c. verfährt.

§. 117.

Der Niederschlag, welcher durch Schwefelammonium nicht aufgelöst worden ist, wird nach dem Auswaschen mit Salpetersäure gekocht. Es geschieht dies am besten in einer kleinen Porzellanschale. Man rührt dabei mit einem Glasstäbchen fortwährend um.

1) Er löst sich auf und in der Flüssigkeit schwimmt nur der ausgeschiedene, leichte, flockige, gelbe Schwefel; deutet auf Abwesenheit von Quecksilber. — Cadmium, Kupfer, Blei und Wismuth können zugegen sein. War der Niederschlag rein gelb, so ist nur Cadmium zugegen, war er braun oder schwarz, so filtrirt man von dem ausgeschiedenen Schwefel ab und macht mit der Flüssigkeit folgende Proben.

a) Man setzt zu einem Theile derselben Ammoniak im Ueberschuss.

α) Es entsteht kein Niederschlag, oder der entstehende löst sich wieder vollständig im Ueberschuss des Fällungsmittels auf;

Abwesenheit von Blei und Wismuth. Man verfährt mit Beachtung des in §. 117. 1. a. *γ*. Gesagten nach §. 117. 1. b.

β) Es entsteht ein bleibender Niederschlag; Anwesenheit von Blei oder Wismuth. Man filtrirt ab und verfährt mit dem Filtrat nach §. 117. 1. b. mit Beachtung des in *γ* Gesagten.

γ) Die Flüssigkeit ist blau gefärbt, gleichgültig, ob ein Niederschlag entstanden ist oder nicht, Kupfer.

b) Zur ammoniakalischen Lösung setzt man Salzsäure bis zur gelinde sauren Reaction, und fügt kohlensaures Ammoniak im Ueberschuss hinzu.

α) Die Flüssigkeit bleibt klar, kein Cadmium.

β) Es entsteht gleich oder nach dem Erwärmen ein weißer Niederschlag, Cadmium. Zur Ueberzeugung filtrirt man ab, wäscht aus, löst den Niederschlag in Salzsäure und fügt Schwefelwasserstoffwasser hinzu. Es muss bei Anwesenheit von Cadmium ein gelber Niederschlag entstehen.

Im Falle Kupfer durch eine blaue Färbung der ammoniakalischen Flüssigkeit noch nicht angezeigt worden ist, macht man zu genauerer Prüfung darauf die Flüssigkeit, in der kohlensaures Ammoniak keinen Niederschlag hervorgebracht hat (§. 117. 1. b. *α*.),

oder die von demselben abfiltrirte (§. 117. 1. b. β .), mit Essigsäure gelinde Sauer und setzt Ferrocyankalium zu. Im Falle Kupfer zugegen ist, entsteht ein braunrother Niederschlag oder eine solche Färbung.

c) Im Falle §. 117. 1. a. β . setzt man zu einem zweiten Theilchen der Lösung der Schwefelmetalle in Salpetersäure verdünnte Schwefelsäure in nicht zu geringer Menge; entsteht ein Niederschlag, so ist Blei zugegen.

Die Reaction wird genauer, wenn man den größten Theil der freien Salpetersäure zuvor durch Abdampfen verjagt.

d) Den Rest der Lösung verdampft man, ebenfalls nur im Falle §. 117. 1. a. β , zur Trockne, setzt wenige Tropfen Wasser und nach Verhältniss der Menge einen oder zwei Tropfen Salzsäure zu und erwärmt. Alsdann gießt man die Flüssigkeit in ein Röhrchen voll Wasser; entsteht eine milchige Trübung, so ist Wismuth vorhanden ¹⁾.

2) Der Niederschlag der Schwefelmetalle löst sich in der kochenden Salpetersäure nicht vollkommen auf, sondern es bleibt auferdem oben schwimmenden Schwefel ein Niederschlag zurück. Wahrscheinlich (wenn der Niederschlag schwer und schwarz ist, fast mit Gewissheit) Quecksilberoxyd. Man lässt absetzen, filtrirt die noch auf Cadmium, Kupfer, Blei und Wismuth zu untersuchende Flüssigkeit ab, versetzt ein kleines Pröbchen davon mit viel Schwefelwasserstoffwasser und verfährt, im Falle ein Niederschlag entsteht, mit dem Rest des Filtrats nach §. 117. 1. — Den Rückstand wäscht man aus, löst ihn durch Zusatz weniger Tropfen Königswasser, setzt soviel Ammoniak zu, dass die Lösung nur noch schwach sauer reagirt, und bringt einen Tropfen derselben auf blankes Kupferblech. Ist Quecksilber zugegen, so entsteht dadurch auf dem Kupfer nach einiger Zeit ein weißer Fleck, der gerieben metallisch glänzt und beim Erhitzen verschwindet. — Oder man verdampft die Lösung in Königswasser

¹⁾ Wegen eines andern Ganges zur Unterscheidung des Cadmiums, Kupfers, Bleis und Wismuths siehe der zweiten Abtheilung zweiten Abschnitt, Zusätze und Bemerkungen zu §. 117.

unter Zusatz von Salzsäure bis fast zur Trockne, verdünnt mit etwas Wasser und setzt Zinnchlorür zu. Ein im Anfang weißer, bei Ueberschuss von Zinnchlorür grau werdender Niederschlag lässt die Anwesenheit des Quecksilbers mit Sicherheit erkennen.

§. 118.

Ein Theilchen der Flüssigkeit, in der Schwefelwasserstoffwasser keinen Niederschlag hervorgebracht hat (§. 115. a.), oder die von dem entstandenen abfiltrirt ist, versetzt man mit Ammoniak bis zur alkalischen Reaction, dann mit Schwefelammonium.

Im Falle wenig Salzsäure zugegen gewesen ist, also wenig Chlorammonium entstand, fügt man eine Lösung dieses Salzes in nicht zu geringem Maasse zu, bevor man mit Schwefelammonium versetzt.

a) Es entsteht kein Niederschlag. Man geht zu §. 119. über, denn es ist weder Eisen, noch Nickel, Kobalt, Zink, Mangan, Chromoxyd, Thonerde, noch phosphorsaure alkalische Erden, noch oxalsaurer Kalk (Baryt und Strontian), zugegen.

b) Es entsteht ein Niederschlag.
Man verfährt mit der gesamten Flüssigkeit wie mit der Probe.

1) Der Niederschlag ist weiß. Abwesenheit von Eisen, Kobalt, Nickel. Auf alle übrigen in §. 118. a. genannten Metalle und Verbindungen muss Rücksicht genommen werden, da die wenig intensiven Farben des Schwefelmangans und Chromoxyds in einer größeren Menge eines weißen Niederschlags verschwinden. Man filtrirt ab, hebt das Filtrat zur weiteren Untersuchung nach §. 119. auf, wäscht den Niederschlag aus, löst ihn in Salzsäure¹⁾, kocht auf, filtrirt die Lösung und setzt Kali im Ueberschuss zu.

a) Der entstandene Niederschlag hat sich im Ueberschuss des Kalis wieder vollständig aufgelöst. Ab-

¹⁾ Ist der Niederschlag gering, so geschieht dies sehr zweckmässig, indem man ihn mit der Spritzflasche in den untern Theil des Filtrums treibt und, wenn das Wasser ziemlich abgelaufen ist, Salzsäure tropfenweise zufügt. Ist Schwefelzink vorhanden, so erfolgt durch Salzsäure nur unvollständige Lösung, man setzt alsdann etwas Salpetersäure zu und erhitzt.

wesenheit der phosphorsauren und oxalsauren Erden und des Mangans. Man theilt die kalische Lösung in zwei Theile, macht den einen mit Salzsäure eben sauer, setzt Ammoniak im Ueberschuss hinzu und kocht eine kleine Weile.

α) *Es entsteht kein bleibender Niederschlag.* Abwesenheit der Thonerde und des Chromoxyds. Man fügt alsdann zur andern Hälfte der kalischen Lösung Schwefelwasserstoffwasser. Ein weißer Niederschlag zeigt Zink an.

β) *Es entsteht ein bleibender Niederschlag.* Man filtrirt ihn ab und prüft, im Falle eine grüne Farbe der kalischen oder eine grüne, gelbe oder rothe der ursprünglichen Lösung dazu Grund giebt, ein Theilchen desselben mit Phosphorsalz auf Chromoxyd (§. 87. b. 5.)¹⁾. Zum Filtrat setzt man Schwefelwasserstoffwasser. Ein weißer Niederschlag zeigt Zink an. Auf Thonerde prüft man alsdann folgendermaßen.

aa) Man hat kein Chromoxyd gefunden. Alsdann ist die Anwesenheit der Thonerde schon an und für sich erwiesen. Ueberzeugung durch Prüfung des durch Ammoniak entstandenen Niederschlags vor dem Löthrohr, siehe §. 87. a. 4.

bb) Man hat Chromoxyd gefunden. In diesem Falle kocht man die zweite Hälfte der kalischen Lösung so lange bis sich das Chromoxyd abgeschieden hat, filtrirt die zuvor etwas verdünnte Flüssigkeit, macht sie mit Salzsäure schwach sauer und fügt Ammoniak im Ueberschuss zu. Ein entstehender Niederschlag zeigt Thonerde an. Ueberzeugung wie in aa. Sollte die Abscheidung des Chromoxyds aus der kalischen Lösung durch Kochen nicht gelingen, wie dies unter gewissen Umständen der Fall sein kann, so schmilzt man zur Entfernung des Chroms den durch Ammoniak entstandenen Niederschlag mit Salpeter und etwas Soda. Siehe §. 87. b. 4. „Die Thonerde kann als phosphorsaure Thonerde vorhan-

¹⁾ Auch im Falle Chromsäure zugegen war, erhält man nämlich durch Schwefelammonium einen Niederschlag von Chromoxyd, da sie durch Schwefelwasserstoff reducirt wird. Man erkennt dies daran, dass nach dem Zusatze von Schwefelwasserstoff, unter gleichzeitiger Ausscheidung von Schwefel die gelbe oder rothe Farbe der Lösung in eine grüne übergeht.

den gewesen und gefällt worden sein. Wie man dies erkennt ist oben §. 110. 1. bereits angegeben worden.“

b) Es ist ein in Kali unlöslicher Rückstand geblieben. Man filtrirt und verfährt mit dem Filtrat nach §. 118. 1. a. Der Rückstand kann von Mangan, »von phosphorsauren und oxalsauren Erden« herrühren. Wird er an der Luft braun, so zeigt diese Erscheinung die Anwesenheit des Mangans an. Ueberzeugung durch das Löthrohr mit Soda (§. 88. b. 5.) Man löst ihn, im Falle Mangan zugegen ist, in Salzsäure, setzt etwas Weinsäure, dann Ammoniak im Ueberschuss zu. Entsteht kein Niederschlag, so sind weder phosphorsaure, noch oxalsaure alkalische Erden vorhanden, entsteht einer, so weist er auf solche hin.

Diesen Niederschlag oder, im Falle kein Mangan zugegen war, direkt den von Kali ungelösten Rückstand wäscht man aus und unterwirft ihn zur Ausmittelung, ob derselbe nur aus phosphorsauren oder nur aus oxalsauren alkalischen Erden besteht, oder endlich, ob er ein Gemenge beider ist, der folgenden vorläufigen Prüfung.

Eine kleine Probe des Niederschlags glüht man gelinde auf Platinblech und übergießt den Rückstand mit Salzsäure.

α) *Er löst sich ohne Aufbrausen.* Abwesenheit eines oxalsauren Salzes. Man löst alsdann den Rest des Niederschlags in Salzsäure, setzt Eisenchlorid im Ueberschuss, dann Ammoniak hinzu und verfährt überhaupt zur Ermittlung der Basen und der Phosphorsäure, wie oben §. 110. 2. a. angegeben ist.

β) *Er löst sich unter Aufbrausen.* Anwesenheit eines oxalsauren Salzes. Man hat alsdann auch eine vorläufige Prüfung auf phosphorsaure Salze nöthig und verfährt zu dem Ende also:

Eine zweite kleine Probe des ungeglühten Niederschlags übergießt man mit etwas concentrirter Schwefelsäure auf dem Platinblech und erhitzt längere Zeit bis keine Dämpfe mehr entweichen. Zum Rückstand fügt man einen Tropfen Wasser und prüft mit blauem Lackmuspapier.

aa) *Es wird nicht roth.* Abwesenheit eines phosphorsauren, alleinige Anwesenheit eines oxalsauren Salzes. Man verfährt alsdann zur Ermittlung der Basen in dem Nieder-

schlag und zur bestätigenden Prüfung auf Oxalsäure nach §. 110. 2. b.

bb) *Es wird roth.* Anwesenheit eines phosphorsauren und eines oxalsauren Salzes. Man glüht alsdann den gesammten Rest des Niederschlags, löst ihn in möglichst wenig verdünnter Salzsäure, kocht zur Austreibung der Kohlensäure, setzt Ammoniak im Ueberschuss zu und filtrirt. Im Filtrat findet man die Erden, welche an Oxalsäure gebunden waren, nach der §. 119. anzugebenden Methode. Mit dem Niederschlag verfährt man wie im Falle §. 118. 1. b. α .

2) Der durch Schwefelammonium entstandene Niederschlag ist nicht weifs, deutet auf Chrom, Mangan, Eisen, Kobalt oder Nickel. Ist er schwarz, oder neigt er in's Schwarze, so ist jedenfalls eins der drei letzten Metalle zugegen. Unter allen Umständen muss auf alle in §. 118. a. genannten Metalle und Verbindungen Rücksicht genommen werden. Man filtrirt ab, bewahrt das Filtrat zur weiteren Untersuchung nach §. 119. auf, wäscht den Niederschlag sorgfältig aus und übergießt ihn mit verdünnter Salzsäure.

a) Es erfolgt keine oder eine in der Art unvollständige Lösung, dass die schwarze Farbe des Niederschlags nicht verschwindet; deutet auf Kobalt und Nickel. Man setzt alsdann der Salzsäure etwas Salpetersäure zu, kocht und verfährt mit der Lösung folgendermassen: Man filtrirt vom ausgeschiedenen Schwefel ab, nimmt eine kleine Probe von der Flüssigkeit, versetzt sie mit Salmiaklösung, sodann mit Ammoniak im Ueberschuss und erwärmt.

α) Es entsteht durch Ammoniak kein bleibender Niederschlag. Abwesenheit von Eisenoxyd, Chromoxyd, Thonerde, von phosphorsauren und oxalsauren alkalischen Erden. Man versetzt den Rest der sauren Lösung der Schwefelmetalle mit kaustischem Kali im Ueberschuss, erwärmt, filtrirt von dem entstandenen Niederschlage ab und versetzt das Filtrat zur Prüfung auf Zink mit Schwefelwasserstoffwasser, vergl. §. 118. 1. a. α . Den abfiltrirten und ausgewaschenen Niederschlag übergießt, erwärmt und schüttelt man eine Zeit lang mit einer ziemlich beträchtlichen Menge kohlensaurer Ammoniaklösung, der, man die Hälfte Aetzammoniak zugesetzt hat.

aa) *Der Niederschlag löst sich vollständig.* Abwesenheit des Mangans. Man verdampft die ammoniakalische Lösung zur Trockne, löst den Rückstand in einigen Tropfen Salzsäure, verdampft nochmals ein wenig und prüft ein Pröbchen des noch feuchten Rückstandes mit Borax auf Kobalt. (§. 88. d. 7.) Alsdann nimmt man den Rest des feuchten Rückstandes mit etwas Wasser auf, setzt zur Lösung Cyankaliumsolution, bis der entstehende Niederschlag eben wieder im Cyankaliumüberschuss gelöst ist, fügt verdünnte Schwefelsäure zu, erwärmt und lässt stehen. Ein sogleich oder nach einiger Zeit erscheinender grünlich weißer Niederschlag zeigt Nickel an. (§. 88. c. 6., sowie Zusätze und Bemerk. zu demselben p. 82.)

bb) *Es bleibt bei der Behandlung des durch kaustisches Kali entstandenen Niederschlages mit kohlensaurem und ätzendem Ammoniak ein unlöslicher Rückstand.* Man prüft denselben mit Soda auf Mangan. (§. 88. b. 5.) Ist der Rückstand wirklich Manganoxydul, so lässt sich dies fast immer schon an dem Braunwerden an der Luft mit Sicherheit erkennen. — Mit der ammoniakalischen Lösung verfährt man zur Prüfung auf Kobalt und Nickel nach der in §. 118. 2, a. α. aa. angegebenen Methode.

β) Es entsteht durch Ammoniak ein bleibender Niederschlag. Man verfährt alsdann mit der gesammten Lösung der Schwefelmetalle in Königswasser wie mit der Probe, filtrirt den durch Ammoniak bei Anwesenheit von Salmiak entstandenen Niederschlag ab, wäscht ihn aus und verfährt zur Prüfung des Niederschlages und des Filtrats folgendermaßen:

1) Zum Filtrat setzt man Schwefelammonium, so lange der entstehende Niederschlag sich noch vermehrt, filtrirt ihn ab, wäscht ihn sorgfältig aus, löst ihn in Königswasser, versetzt mit kaustischem Kali im Ueberschuss und verfährt überhaupt zur Prüfung auf Kobalt, Nickel, Mangan und Zink genau nach §. 118. 2. a. α.

2) Den durch Ammoniak erhaltenen Niederschlag digerirt man mit verdünnter Aetzkalklauge. (Im Falle seine Menge sehr gering ist, löst man ihn auf dem Filter mit etwas Salzsäure auf und setzt zu dieser Lösung Aetzkali im Ueberschuss.)

aa) *Der Niederschlag löst sich in der Kalilauge vollständig.* Abwesenheit des Eisenoxyds, der phosphorsauren und oxalsauren alkalischen Erden. Man prüft alsdann die kalische Lösung auf Thonerde und Chromoxyd genau nach §. 118. 1. a.

bb) *Der Niederschlag löst sich nicht oder nicht vollständig.* Man filtrirt ab und prüft das Filtrat auf Chromoxyd und Thonerde wie vorher in aa., den Rückstand löst man in verdünnter Salzsäure und versetzt ein kleines Theilchen der Lösung mit Ferrocyankalium. Ein sogleich entstehender blauer Niederschlag, oder eine solche Färbung zeigt Eisen an. Den Rest der salzsauren Lösung versetzt man, im Falle man Eisen gefunden hat, mit etwas Weinsteinsäure und fügt alsdann Ammoniak im Ueberschuss zu; im Falle kein Eisen zugegen war, übersättigt man nur mit Ammoniak. Entsteht kein Niederschlag, so sind weder phosphorsaure noch oxalsaure alkalische Erden vorhanden, entsteht einer, so verfährt man damit nach §. 118. 1. b. — Um zu unterscheiden, ob Eisen als Oxyd oder als Oxydul vorhanden war, prüft man die ursprüngliche Lösung in Wasser oder Salzsäure (nicht in Salpetersäure) mit Ferrocyankalium und mit Ferridcyankalium. — Ein dunkel blauer Niederschlag mit ersterem zeigt Oxyd, mit letzterem Oxydul an.

b) *Der durch Schwefelammonium entstandene Niederschlag löst sich beim Uebergiessen mit Salzsäure leicht und vollständig, oder die schwarze Farbe desselben verschwindet wenigstens sogleich;* deutet auf Abwesenheit von Kobalt und Nickel. Man kocht die Lösung mit etwas Salpetersäure, filtrirt vom ausgeschiedenen Schwefel ab, nimmt eine kleine Probe von der Flüssigkeit, versetzt sie mit Salmiaklösung, sodann mit Ammoniak im Ueberschuss und erwärmt.

α) *Es entsteht durch Ammoniak kein bleibender Niederschlag.* Abwesenheit von Eisen, Chromoxyd, Thonerde, von phosphorsauren und oxalsauren alkalischen Erden. Man versetzt den Rest der salzsauren Lösung mit kaustischem Kali im Ueberschuss, prüft den entstehenden Niederschlag mit Soda auf Mangan und die davon abfiltrirte alkalische Flüssigkeit mit Schwefelwasserstoff auf Zink.

β) Es entsteht durch Ammoniak ein bleibender Niederschlag.

Man verfährt mit der gesammten Lösung der Schwefelmetalle wie mit der Probe. Den Niederschlag prüft man alsdann genau nach §. 118. 2. a. *β*. 2. — Die von dem Niederschlag abfiltrirte Lösung aber versetzt man mit Schwefelammonium im Ueberschuss.

aa) Es entsteht dadurch kein Niederschlag. Abwesenheit von Mangan und Zink.

bb) Es entsteht ein Niederschlag. Man wäscht ihn gut aus, löst in Königswasser und versetzt die Lösung mit Kali im Ueberschuss.

αα) Es entsteht kein bleibender Niederschlag. Abwesenheit von Mangan, folglich Anwesenheit von Zink. Ueberzeugung durch Zusatz von Schwefelwasserstoff zur kalischen Lösung.

ββ) Es entsteht ein Niederschlag, Mangan. Ueberzeugung durch das Löthrohr. Die abfiltrirte kalische Flüssigkeit versetzt man mit Schwefelwasserstoff, weißer Niederschlag, Zink.

§. 119.

Man setzt zu einem Pröbchen der Flüssigkeit, in welcher Schwefelammonium keinen Niederschlag gegeben hat, oder die von dem entstandenen abfiltrirt ist, phosphorsaures Natron und Ammoniak, wenn noch kein freies zugegen ist und schüttelt tüchtig.

a) Es entsteht kein Niederschlag, zeigt die Abwesenheit aller alkalischen Erden. Man verdampft ein weiteres Pröbchen der Flüssigkeit zur Trockne und glüht. Bleibt kein Rückstand, so ist weder Kali, noch Natron zugegen und man geht zu §. 122. über; bleibt einer, so verfährt man mit der ganzen Menge der Flüssigkeit wie mit der Probe und geht alsdann zu §. 121. über.

b) Es entsteht einer.

Man erhitzt den gesammten Rest der Flüssigkeit, wenn sie Schwefelwasserstoff oder Schwefelammonium enthält (in welchem letztern Falle man sie zuvor mit Salzsäure sauer macht) bis sie nicht mehr nach Schwefelwasserstoff riecht und filtrirt den Schwefel, wenn sich welcher ausgeschieden hat, ab. Alsdann versetzt man sie mit einer Mischung von kohlensaurem und etwas kaustischem Ammoniak im Ueberschuss, nachdem man zuvor Chlorammonium zugesetzt hat, wenn sich im Laufe der Untersuchung

zu wenig in der Flüssigkeit gebildet haben sollte, und kocht eine Zeit lang.

1) Es entsteht kein Niederschlag. Man geht zu §. 120. über, denn es ist weder Kalk, noch Baryt oder Strontian vorhanden.

2) Es entsteht ein Niederschlag. Anwesenheit von Kalk, Baryt oder Strontian. Man filtrirt ab, hebt die Flüssigkeit zur weitem Untersuchung nach §. 120. auf und löst den Niederschlag in möglichst wenig sehr verdünnter Salzsäure.

a) Zu einem Pröbchen der Lösung setzt man Gypssolution.

α) *Es entsteht dadurch auch nach längerer Zeit kein Niederschlag.* Man geht zu §. 119. 2. b. über, denn Baryt und Strontian sind nicht vorhanden.

β) *Es entsteht durch Gypslösung ein Niederschlag.*

aa) *Er entsteht sogleich, zeigt Baryt an, zugleich kann noch Strontian zugegen sein.*

Man verdampft einen Theil der salzsauren Lösung (s. §. 119. 2.) zur Trockne, digerirt den Rückstand mit absolutem, mindestens recht starkem Alkohol und filtrirt. Von dem Filtrat verdampft man einige Tropfen auf Platinblech.

$\alpha\alpha$) Es bleibt kein Rückstand, man geht zu §. 120. über, denn es ist weder Strontian, noch Kalk zugegen.

$\beta\beta$) Es bleibt ein Rückstand. Man theilt die alkoholische Lösung in zwei Theile. Die eine Hälfte erhitzt man in einem kleinen Tiegel und zündet an, carminrothe Färbung der Flamme zeigt Strontian an. Erscheint die Flamme nicht roth oder ist man darüber im Zweifel, so verdampft man zu genauerer Prüfung die zweite Hälfte der alkoholischen Lösung zur Trockne, löst den Rückstand in wenig Wasser und prüft mit Gypslösung, ein nach einiger Zeit entstehender Niederschlag zeigt Strontian.

Von der Gegenwart des Baryts kann man sich noch vergewissern, indem man Kieselfluorwasserstoffsäure zur Lösung in Salzsäure setzt und erwärmt. Bei Anwesenheit von Baryt entsteht nach einiger Zeit ein Niederschlag.

bb) *Er entsteht erst nach einiger Zeit, zeigt die Abwesenheit des Baryts, die Anwesenheit des Strontians.*

b) Zu einer weitem Probe der salzsauren Lösung (s. §. 119. 2.) setzt man, nachdem sie mit Ammoniak alkalisch gemacht worden ist, Oxalsäure. Im Falle nach §. 119. 2. a. β . Baryt oder Strontian gefunden wurde, schlägt man diese zuvor mit schwefelsaurem Kali nieder und setzt die Oxalsäure zum Filtrat, nachdem es ebenfalls mit Ammoniak versetzt wurde. Entsteht durch Oxalsäure ein Niederschlag, so ist Kalk zugegen.

§. 120.

Von der Flüssigkeit, in welcher kohlensaures Ammoniak keinen Niederschlag hervorgebracht hat (§. 119. 1.), oder die von dem entstandenen abfiltrirt worden ist, nimmt man zwei kleine Proben und versetzt die eine mit etwas schwefelsaurem Kali, die andere mit oxalsaurem Ammoniak.

1) Beide Reagentien bewirken keine Niederschläge mehr. Man kann alsdann überzeugt sein, dass man durch kohlensaures Ammoniak allen Baryt, Strontian und Kalk vollständig gefällt hat, und mit Sicherheit auf Magnesia prüfen, indem man zu einer dritten Probe der genannten Flüssigkeit phosphorsaures Natron setzt und mit einem Glasstäbchen umrührt. Entsteht dadurch ein krystallinischer Niederschlag (vergleiche §. 86. d. 5.), so ist Magnesia zugegen. Den Rest der Flüssigkeit, von der man ein Theilchen auf Magnesia geprüft hat, verdampft man zur Trockne und erhitzt, bis alle Ammoniaksalze verjagt sind. Bleibt kein Rückstand, so geht man zu §. 122., bleibt einer, zu §. 121. über.

2) Beide oder eines der Reagentien bewirken noch einen Niederschlag. Man hat alsdann durch kohlensaures Ammoniak den Baryt, Strontian oder Kalk noch nicht vollständig gefällt, weshalb man dem Rest der Flüssigkeit nochmals kohlen- saures Ammoniak, dem man Aetzammoniak beimischt, zusetzt und wiederum einige Zeit kocht. Mit der vom entstandenen Niederschlag abfiltrirten Flüssigkeit verfährt man alsdann wieder nach §. 120.

§. 121.

Jetzt bleibt noch die Untersuchung auf fixe Alkalien und Ammoniak übrig.

Die Verbindungen der ersteren sind mit sehr wenigen Ausnahmen in Wasser löslich, daher man bei gewöhnlichen Untersuchungen nicht nöthig hat, bei in Wasser unlöslichen Verbindungen auf sie Rücksicht zu nehmen.

Im Falle man mit einem in Wasser unlöslichen, in Salzsäure oder Salpetersäure löslichen Körper zu thun hat, bewahrt man ein Theilchen der Flüssigkeit, in deren Probe phosphorsaures Natron keinen Niederschlag hervorgebracht hat (§. 119. a.), oder der, in welcher kohlensaures Ammoniak keinen hervorbrachte (§. 119. 1.), oder der vom entstandenen abfiltrirten (§. 119. 2.) zur Ermittlung etwa zugegener Phosphorsäure und Oxalsäure auf. Siehe §. 125. 8.

1) Magnesia ist nicht zugegen. Man löst den geglühten Rückstand (§. 119. a.) in wenig Wasser, setzt Alkohol zu, erhitzt zum Kochen und zündet an.

a) Die Flamme ist violett gefärbt. Abwesenheit von Natron, wahrscheinliche Anwesenheit von Kali.

b) Die Flamme ist gelb gefärbt. Anwesenheit von Natron.

Man dampft zur Trockne ein und vergewissert sich von der Anwesenheit des Natrons durch die Löthrohrflamme (siehe §. 85. b. 2.), von der Anwesenheit des Kalis, indem man den Rückstand in Wasser oder besser, wenn es möglich ist, in Weingeist löst und die eine Hälfte der Lösung mit Weinsteinssäure, die andere mit Platinchlorid versetzt. Bei Anwesenheit von Kali wird nach einiger oder längerer Zeit das erste Reagens einen farblosen, körnig krystallinischen, das letztere einen gelben Niederschlag hervorbringen.

2) Magnesia ist zugegen. Man löst den Rückstand in Wasser, setzt Barytwasser oder (kaustischen Baryt enthaltende) Schwefelbariumlösung zu, so lange noch ein Niederschlag entsteht, kocht, filtrirt ab, setzt zum Filtrat tropfenweise verdünnte Schwefelsäure bis zur sauren Reaction, filtrirt von dem gefällten schwefelsauren Baryt ab, verdampft das Filtrat zur Trockne und verfährt mit einem etwa bleibenden Rückstande zur Ausmittlung des Kalis und Natrons, wie im Falle §. 121. 1. Oder man über-

gießt den Magnesia und vielleicht Alkalien enthaltenden Rückstand mit etwas Schwefelsäure, verdampft zur Trockne und glüht, so lange Dämpfe entweichen, löst die Masse in Wasser, fällt die Lösung mit essigsaurem Baryt im Ueberschuss, verdampft das Filtrat von Neuem zur Trockne, glüht stark, behandelt den Rückstand mit wenig Wasser, filtrirt und verfäht, im Falle das Filtrat alkalische Reaction zeigt, nachdem man es mit Salzsäure neutralisirt hat, zur Prüfung auf Kali und Natron nach §. 121. 1.

§. 122.

Es bleibt jetzt noch die Prüfung auf Ammoniak übrig. Man übergießt etwas des zu untersuchenden Körpers oder, wenn es eine Flüssigkeit ist, einen Theil derselben mit concentrirter Kalilauge und erwärmt. Riecht das entweichende Gas nach Ammoniak, bläuet es feuchtes geröthetes Lackmuspapier und entstehen weisse Nebel, wenn man ein mit Salzsäure befeuchtetes Stäbchen ins Röhrchen senkt, so ist Ammoniak zugegen.

Verbindungen, in welchen sämmtliche häufiger vorkommende Basen, Säuren, Metalle und Metalloide vorausgesetzt werden.

A. 1. In Wasser lösliche Körper. Ausmittlung der Säuren und der sie vertretenden Körper.

1. Bei Abwesenheit organischer Säuren.

§. 123.

1) In Bezug auf die Ausmittlung der Arseniksäuren, der Kohlensäure, Hydrothionsäure und Chromsäure vergleiche man das §. 108. 1. und 2. darüber Gesagte.

2) Man setzt zu einer Probe der Lösung salpetersauren Baryt und, im Falle sie sauer ist, Ammoniak bis zur Neutralität.

a) Es entsteht kein Niederschlag. Abwesenheit der Schwefelsäure, Phosphorsäure, Borsäure, Chromsäure, Kieselsäure, Oxalsäure, arsenigen und Arseniksäure¹⁾. Man geht zu 3. über.

¹⁾ Ist in der Flüssigkeit Chlorammonium vorhanden, so kann man von der Abwesenheit der Oxalsäure, der arsenigen und Arseniksäure besonders,

b) Es entsteht ein Niederschlag. Man verdünnt die Flüssigkeit und setzt Salzsäure zu; löst sich der Niederschlag nicht oder nicht ganz, so ist Schwefelsäure vorhanden.

3) Man setzt zu einem Theile der Lösung salpetersaures Silber, nachdem sie zuvor, wenn sie alkalisch war, mit Salpetersäure, wenn sie sauer war, mit Ammoniak genau neutralisirt worden ist.

a) Es entsteht kein Niederschlag. Man geht zu 4. über; es ist weder Chlor, noch Jod, Cyan, Phosphorsäure, Kieselsäure, Oxalsäure, Chromsäure und, wenn die Lösung nicht zu verdünnt war, auch keine Borsäure zugegen.

b) Es entsteht ein Niederschlag. Man beobachtet die Farbe und setzt alsdann Salpetersäure zu.

α) Der Niederschlag löst sich vollkommen auf; man geht zu §. 123. 4. über, denn es ist weder Chlor, noch Jod, noch Cyan zugegen.

β) Es bleibt ein Rückstand, er deutet auf Chlor, Jod und Cyan. Man digerirt ihn, nachdem er ausgewaschen worden ist, mit Ammoniak.

aa) Es bleibt ein gelblicher Rückstand. Er rührt von Jod her. Wie man sich von seiner Anwesenheit überzeugt, siehe §. 100. c. Man filtrirt ab und versetzt das Filtrat mit Salpetersäure im Ueberschuss; entsteht dadurch ein Niederschlag, so deutet er auf Chlor oder Cyan. Man verfährt damit, wie sogleich in bb. gesagt wird.

bb) Es bleibt kein Rückstand, Chlor oder Cyan und kein Jod. Man schlägt zu weiterer Untersuchung die Lösung wieder mit Salpetersäure nieder. Ehe man die Unterscheidung des Chlor- und Cyansilbers unternimmt, prüft man die Flüssigkeit auf Cyan, um zu sehen, ob eine Unterscheidung überhaupt nothwendig ist. Man setzt nämlich zu einem Pröbchen der ursprünglichen Lösung EisenoxyduloxydLösung und dann Salzsäure. Entsteht ein blauer Niederschlag, so ist Cyan zugegen¹⁾. Ent-

aber der Borsäure nicht überzeugt sein, weil die Barytsalze dieser Säuren bei Gegenwart von Ammoniaksalzen in Wasser nicht unlöslich sind.

¹⁾ Wenn es als freie Cyanwasserstoffsäure vorhanden gewesen wäre, was der Geruch erkennen lässt, so hätte diese vor dem Zusatz der Eisenlösung mit Kali gesättigt werden müssen. Dass das Cyan durch salpetersaures Silber in

steht kein Niederschlag, auch keine blaue Färbung, so ist der von Ammoniak aufgelöste Niederschlag bloß Chlorsilber. Im Falle man Cyan gefunden hat, wäscht man den zu prüfenden Niederschlag aus, nimmt ihn noch feucht vom Filter, trocknet ihn in einem Porzellantiegelchen und glüht. Chlorsilber schmilzt nur, Cyansilber wird reducirt. Durch Salpetersäure kann man das regulinische Silber vom Chlorsilber trennen.

4) Man prüft die wässrige Lösung auf Salpetersäure, indem man sie mit Indigolösung bis zur hellblauen Färbung versetzt, etwas Schwefelsäure zufügt und erhitzt; und ferner, indem man in die mit dem dritten Theil concentrirter Schwefelsäure versetzte Lösung einen Krystall von schwefelsaurem Eisenoxydul wirft. Bei Anwesenheit von Salpetersäure wird sich die blaue Lösung entfärben und um den Krystall eine braun gefärbte Zone bilden.

Es bleiben jetzt noch die Untersuchungen auf Phosphorsäure, Borsäure, Kieselsäure, Oxalsäure und Chromsäure übrig. Man hat nur dann nöthig sie anzustellen, wenn sowohl Chlorbarium, als salpetersaures Silber in neutraler Lösung Niederschläge hervorgebracht haben. Vergleiche oben die Anmerkung zu §. 123. 2. a.

5) War der durch salpetersaures Silber hervorgebrachte Niederschlag gelblich, so hat man ganz besondere Ursache auf Phosphorsäure zu achten. Um sie zu erkennen, setzt man zu einer Probe der Flüssigkeit Ammoniak im Ueberschuss, filtrirt, im Falle ein Niederschlag entsteht und setzt dem Filtrat Chlorammonium und dann schwefelsaure Magnesia zu. Entsteht ein krystallinischer Niederschlag, so ist Phosphorsäure zugegen.

6) Man übergießt ein Pröbchen der zu untersuchenden Substanz mit Alkohol, setzt Schwefelsäure zu, erhitzt in einem kleinen Tiegelchen zum Kochen und zündet an. Grüne Flamme lässt Borsäure erkennen. Bei Gegenwart von Kupfer muss dieses erst durch Kochen der Flüssigkeit mit Kaliüberschuss oder mittelst Schwefelwasserstoff entfernt werden.

einigen Verbindungen (Cyanquecksilber) nicht angezeigt wird, ist bereits oben §. 100. d. erwähnt worden.

- 7) War die Flüssigkeit roth, oder gelb durch Zusatz von Salzsäure roth werdend, und hatte der durch salpetersaures Silber in neutraler Lösung erzeugte Niederschlag purpurrothe Farbe, so wird dadurch die Anwesenheit der Chromsäure bestätigt.
- 8) Auf Kieselsäure prüft man nach §. 99 b. 2.
- 9) Oxalsäure findet man, wenn man Gypslösung zu einer Probe der Flüssigkeit, welche, im Falle sie sauer ist, zuvor mit Ammoniak neutralisirt werden muss, setzt; ein weißer, durch Zusatz von Essigsäure nicht verschwindender Niederschlag lässt sie erkennen.

Seltener aber doch hie und da kommen chlorsaure Salze, Brom- und Fluorverbindungen vor. Man wurde auf erstere schon durch das heftige Verpuffen des geschmolzenen Salzes mit Kohle, siehe §. 105. A. I. 2. c., hingewiesen. Man erkennt sie, indem man etwas des festen Salzes in einer unten zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt und an das offene Ende ein glimmendes Holzspänchen hält. Bei Gegenwart von Chlorsäure wird es sich entzünden. Der in Wasser gelöste Rückstand giebt sodann mit salpetersaurem Silber einen reichlichen Niederschlag von Chlorsilber. Ferner, indem man einige Körnchen in rauchende Schwefelsäure wirft (§. 101. b. 6.), oder mit Cyankalium schmilzt (§. 101. b. 3.). — Die Erkennung der Brommetalle ist einfach, wenn nicht zugleich Jodmetalle zugegen sind. Wie man in beiden Fällen zur sicheren Erkennung des Broms zu verfahren habe, ist oben §. 100. angegeben worden. Zur Erkennung der Fluormetalle sind unter allen Umständen die §. 98. d. 4. und 5. beschriebenen Methoden die sichersten.

Verbindungen, in welchen sämmtliche häufiger vorkommende Basen, Säuren u. s. w. vorausgesetzt werden.

A. 1. In Wasser lösliche Körper. Ausmittlung der Säuren und der sie vertretenden Körper.

II. Bei Anwesenheit organischer Säuren.

§. 124.

- 1) Die Chromsäure und die Arseniksäuren hat man schon beim Aufsuchen der Basen gefunden; wegen Unterscheidung der letzteren, vergl. §. 93. Zusätze und Bemerkungen.

- 2) Man versetzt eine Probe der Lösung mit Salzsäure. Entsteht ein Niederschlag, der sich beim Erhitzen auf dem Platinblech unter Verbreitung des bekannten Benzoësäuregeruches ganz oder theilweise verflüchtigt, so ist diese Säure zugegen. Entsteht beim Zusatz der Salzsäure Aufbrausen, so kann es von Kohlensäure oder Schwefelwasserstoff herrühren, siehe §. 108. 2.
- 3) Man versetzt eine Probe mit Ammoniak bis zur schwach alkalischen Reaction, filtrirt wenn nöthig, und setzt Chlorbarium zu. Im Falle Salzsäure einen Niederschlag hervorgebracht hätte, müsste man die davon abfiltrirte Lösung zu diesem Versuch verwenden.
- a) Es entsteht kein Niederschlag. Abwesenheit von Schwefelsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Borsäure, Arseniksäure, arseniger Säure, Kieselsäure, Oxalsäure, Weinsteinsäure, Citronensäure, auf welche man daher bei der weiteren Untersuchung nicht Rücksicht zu nehmen hat. In Bezug auf die sechs letzten Säuren gilt das §. 123. 2. a. in der Anmerkung Gesagte.
- b) Es entsteht ein Niederschlag. Man setzt Chlorwasserstoffsäure zu.
- α) Er löst sich auf, keine Schwefelsäure.
- β) Es bleibt ein Rückstand, Schwefelsäure.
- 4) Man versetzt eine Probe, nachdem man sie, im Falle die Flüssigkeit alkalisch oder sauer ist, mit Salpetersäure oder Ammoniak ganz genau neutralisirt hat, mit salpetersaurem Silber.
- a) Es entsteht kein Niederschlag; zeigt die Abwesenheit der Phosphorsäure, Borsäure, Chromsäure, Kieselsäure, Oxalsäure, Weinsteinsäure, Citronensäure, auf welche man daher keine Rücksicht zu nehmen hat.
- b) Es entsteht ein Niederschlag.
- α) *Er ist weißlich oder gelb.*
- Man kocht eine Probe der Flüssigkeit sammt dem suspendirten Niederschlag. Vollständige, schnelle Reduction deutet Ameisensäure an. Man überzeugt sich von ihrer Gegenwart durch salpetersaures Quecksilberoxydul (§. 104. b.), beachtet übrigens die Bemerkung am Schlusse der Nummer 4.
- Man übergießt den Rest des Niederschlags mit Salpeter-

säure. Löst er sich, so ist weder Chlor, noch Jod, noch Cyan vorhanden; löst er sich nicht vollständig, so prüft man den Rückstand auf die genannten Salzbildner nach §. 123. 3. b. β .

β) Der durch salpetersaures Silber entstandene Niederschlag ist purpurroth, Chromsäure. Im Falle Arsensäure zugegen ist, vergewissert man sich, indem man eine andere Probe der Lösung mit essigsaurem Blei versetzt, wodurch ein gelber Niederschlag entstehen muss. Auf Chlor, Jod und Cyan, welche gleichfalls in dem rothen Silberniederschlag vorhanden sein könnten, prüft man nach §. 123. 3. b.

Bei Anwesenheit von Chromsäure lässt sich die Ameisensäure durch die entstehende Silber- und Quecksilber-Reduction nicht mit Bestimmtheit erkennen, und es bleibt in diesem Falle zu ihrer Nachweisung kein anderes Mittel, als eine Destillation der Verbindung mit Zusatz von etwas Schwefelsäure. Das Destillat sättigt man mit Natron und prüft mit Eisenchlorid, welches davon blutroth gefärbt wird, und mit salpetersaurem Silber, vergl. §. 104. b.

5) Haben Chlorbarium und salpetersaures Silber Niederschläge erzeugt, so prüft man auf Phosphorsäure, wie oben §. 123. 5. gezeigt wurde, auf Kieselsäure nach §. 99. b. 2.

6) Man verdampft einen Theil der Lösung, nachdem sie, im Falle sie sauer reagirt, zuvor mit Kali gesättigt worden ist, zur Trockne, und übergießt diesen Rückstand oder, wenn man die Substanz trocken hat, ein Theilchen derselben mit etwas Alkohol in einem Röhrchen, setzt etwa den dritten Theil des Alkohols (dem Volumen nach) concentrirte Schwefelsäure zu und erhitzt zum Kochen. Entwickelt sich ein Geruch nach Essigäther, der sich sehr oft bei oder nach dem Erkalten wenn man umschüttelt am deutlichsten erkennen lässt, so ist Essigsäure zugegen. Man gießt den Inhalt des Röhrchens in ein Tiegelchen, erhitzt und zündet an. Grüne Flamme zeigt Borsäure.

7) Man macht eine Probe der Flüssigkeit mit Ammoniak schwach alkalisch, filtrirt wenn nöthig, und setzt Chlorcalcium zu. Im

Falle die Lösung neutral war, fügt man vor dem Zusatz des Chlorcalciums etwas Salmiak zu.

a) Es entsteht weder sogleich, noch nach einiger Zeit ein Niederschlag. Abwesenheit der Oxalsäure und Weinsteinsäure; man geht zu 8. über.

b) Es entsteht sogleich oder nach einigen Minuten ein Niederschlag. Man filtrirt denselben nach einiger Zeit ab, bewahrt das Filtrat zur weiteren Untersuchung nach 8. auf und wäscht aus.

Den Niederschlag digerirt und schüttelt man mit Kalilauge, die man etwas verdünnt hat, im Ueberschuss ohne zu erwärmen, filtrirt nach einiger Zeit ab und kocht das Filtrat eine Weile. Scheidet sich dadurch ein Niederschlag aus, der beim Erkalten wieder verschwindet, so ist Weinsteinsäure zugegen.

Zu einer Probe der ursprünglichen Lösung, die man nöthigenfalls mit Ammoniak neutral macht, setzt man Gypslösung. Entsteht ein Niederschlag, der durch Zusatz von Essigsäure nicht verschwindet, von Salzsäure aber gelöst wird, so ist Oxalsäure zugegen.

8) Man vermischt die Flüssigkeit, in der Chlorcalcium keinen Niederschlag hervorgebracht hat, oder die von dem entstandenen abfiltrirt ist (in welchem letzteren Fall man noch etwas Chlorcalcium hinzufügt) mit Alkohol.

a) Es entsteht kein Niederschlag. Abwesenheit der Citronensäure und der Aepfelsäure. Man geht zu 9 über.

b) Es entsteht ein Niederschlag. Man filtrirt ihn ab, verfährt mit dem Filtrat nach 9, mit dem Niederschlag aber, nachdem man ihn mit etwas Weingeist ausgewaschen hat, folgendermaßen.

Man löst ihn in möglichst wenig verdünnter Salzsäure auf dem Filtrum auf, setzt zum Filtrat Ammoniak bis zur schwach alkalischen Reaction und erhitzt es alsdann anhaltend zum Kochen.

a) Es bleibt klar. Abwesenheit der Citronensäure. Anwesenheit der Aepfelsäure. Man setzt der Flüssigkeit wieder Alkohol zu und überzeugt sich von der Anwesenheit der Aepfelsäure, indem man den Kalkniederschlag glüht. Er muss unter Kohleabscheidung in kohlenauren Kalk

übergehen; ferner prüft man zu gröfserer Sicherheit mit essigsauerm Bleioxyd (§. 102. e. 5.).

β) Es entsteht ein schwerer weifser Niederschlag; Anwesenheit von Citronensäure. Man filtrirt kochend ab und verfährt mit dem Filtrat zur Prüfung auf Aepfelsäure, wie im Falle α.

9) Zum Filtrat von 8. b. oder zu der Flüssigkeit, in welcher beim Vermischen mit Alkohol kein Niederschlag entstand (§. 128. 8. a.) setzt man, nachdem der Alkohol durch Erhitzen verjagt worden ist und nachdem man genau mit Salzsäure neutralisirt hat, Eisenchlorid. Entsteht kein hellbrauner, flockiger Niederschlag, so ist weder Bernsteinsäure noch Benzoësäure zugegen; entsteht einer und hat man oben keine Benzoësäure gefunden, so rührt er von Bernsteinsäure her. War jedoch Benzoësäure zugegen, so filtrirt man ab, digerirt den ausgewaschenen Niederschlag mit Ammoniak im Ueberschuss, filtrirt ab, verdampft das Filtrat zur Trockne und zieht mit Alkohol das benzoësaure Ammon aus, das bernsteinsaure bleibt zurück. Man löst es in Wasser und prüft beide Lösungen mit Eisenchlorid.

10) Man prüft auf Salpetersäure, wie oben §. 123. angegeben.

Verbindungen, in welchen sämmtliche häufiger vorkommende Basen, Säuren u. s. w. vorausgesetzt werden.

A. 2. In Wasser unlösliche, in Salzsäure oder Salpetersäure lösliche Körper. Ausmittlung der Säuren und der sie vertretenden Körper.

I. Bei Abwesenheit organischer Säuren.

§. 125.

Bei diesen Verbindungen hat man auf alle in §. 123. vorkommenden Säuren mit Ausnahme der Chlorsäure Rücksicht zu nehmen. Cyanverbindungen werden nicht nach diesem Gange untersucht, vergl. §. 128.

1) In Bezug auf die Arseniksäuren, die Kohlensäure, Hydrothionsäure und Chromsäure gilt das §. 111. 2. Angeführte.

2) Man kocht ein Theilchen der Substanz mit Salpetersäure und filtrirt von etwa bleibendem Rückstande ab.

a) Entsteht ein Aufbrausen, so kann es von Kohlensäure und Stickoxydgas herrühren. Erstere erkennt man nach §. 99.

a., letzteres deutet gewöhnlich auf eine Schwefelverbindung.

b) Es entweichen violette, Amylum bläuende Dämpfe, Jod.

3) Zu einem Theilchen der Lösung in Salpetersäure setzt man salpetersaures Silber.

a) Es entsteht kein Niederschlag. Man geht zu 4. über, denn es ist kein Chlor zugegen.

b) Es entsteht ein Niederschlag. Man filtrirt die Flüssigkeit ab, wäscht aus und digerirt mit Ammoniak. Löst er sich ganz oder theilweise, so ist Chlor zugegen.

4) Man kocht eine Probe des Körpers mit Salzsäure, filtrirt, wenn nöthig, ab und versetzt ein Theilchen der Lösung mit Chlorbarium. Entsteht ein Niederschlag, so ist Schwefelsäure vorhanden.

5) Einen andern Theil der salzsauren Lösung verwendet man zur Prüfung auf Salpetersäure mittelst Indigo und schwefelsaurem Eisenoxydul, siehe §. 123. 4. In vielen Fällen wird man sie schon durch das Verpuffen auf der Löthrohrkohle erkannt haben.

6) Hat der Versuch §. 125. 2. b. die Anwesenheit des Jods noch nicht kund gethan, so erhitzt man zu genauerer Prüfung ein Theilchen der Substanz mit concentrirter Schwefelsäure. Bei Anwesenheit irgend einer Jodverbindung entstehen violette, Amylum bläuende Dämpfe, vergleiche §. 100. c. 6.

7) Auf Borsäure untersucht man, indem man eine Probe mit Schwefelsäure und Alkohol behandelt, s. § 98. b. 5.

8) Zur Prüfung auf Phosphorsäure und Oxalsäure, welche man, wenn sie an Baryt, Strontian und Kalk und, was die Phosphorsäure anbetrifft, Magnesia gebunden waren, schon bei Ausmittelung der Basen erkannt hat, verwendet man die aufbewahrte, von den Metallen befreite Flüssigkeit, siehe §. 121., und weist die beiden Säuren darin nach den in §. 123. 5. und 9. angegebenen Methoden nach.

9) Auf Kieselsäure prüft man nach §. 99. b. 3.

Was die seltener vorkommenden Brom- und Fluorverbindungen betrifft, so vergl. §. 123. am Ende.

Verbindungen, in welchen sämtliche häufiger vorkommende Basen, Säuren u. s. w. vorausgesetzt werden.

A. 2. In Wasser unlösliche, in Salzsäure oder Salpetersäure lösliche Körper. Ausmittlung der Säuren etc.

II. Bei Anwesenheit organischer Säuren.

§. 126.

1) Auf Kohlensäure, Arsenik-Säure, arsenige Säure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Borsäure, Chromsäure, Kieselsäure, Chlor, Jod und Schwefel prüft man wie oben §. 125, auf Essigsäure nach §. 124. 6. Vom Cyan gilt gleichfalls das §. 125. am Anfang Bemerkte.

2) Einen Theil der Verbindung löst man in Salzsäure, filtrirt von etwaigem Rückstand, der auf Benzoësäure nach §. 124. 2. zu prüfen ist, ab, setzt kohlensaure Kalilösung im Ueberschuss zum Filtrat und kocht damit eine Zeitlang. Man filtrirt sodann von dem entstandenen Niederschlag ab, sättigt das Filtrat mit verdünnter Salzsäure und prüft auf Phosphorsäure und Oxalsäure nach §. 123. 5. u. 9, auf Weinstein-, Citronen-, Aepfel-, Bernstein- und Benzoë-Säure aber genau nach §. 124. 7, 8 und 9.

Verbindungen, in welchen sämtliche häufiger vorkommende Basen, Säuren u. s. w. vorausgesetzt werden.

B. In Wasser und in Salzsäure unlösliche oder schwer lösliche Körper. Ausmittlung der Basen, Säuren und Metalloide.

§. 127.

Unter dieser Rubrik sind folgende Körper und Verbindungen aufzuführen.

Schwefelsaurer Baryt, Strontian und Kalk, Chlor-

silber, Chlorblei, schwefelsaures Blei, einfach und doppelt Schwefelquecksilber, Quecksilberchlorür, einige Eisencyanmetalle, einige Schwefelmetalle, Kieselsäure, Schwefel, Kohle. — Ausserdem gehören hierher einige saure arsensaure Verbindungen, welche jedoch bei den Analysen der in pharmaceutischer oder technischer Hinsicht wichtigeren Gemenge oder Verbindungen eben so selten vorkommen dürften, als die unlösliche Modification des Chromoxyds, geglühtes Zinnoxid und Fluorcalcium. Gröfserer Deutlichkeit wegen soll nur für die Auffindung der ersteren Körper ein schematisches Verfahren angegeben, das Verhalten der seltner vorkommenden aber und die Art ihres Erkennens besonders betrachtet werden.

Hinsichtlich der unlöslichen Cyanmetalle ist §. 128. zu vergleichen.

A) Der Rückstand ist weifs. Er kann alsdann von obigen Körpern enthalten: schwefelsauren Baryt, Strontian, Kalk, schwefelsaures Bleioxyd, Chlorblei, Chlorsilber, Quecksilberchlorür, Kieselsäure, Schwefel.

Auf schwefelsauren Kalk hat man nur Rücksicht zu nehmen, wenn man ihn schon in der wässerigen Lösung fand; auf die Bleiverbindungen ebenfalls nur, wenn die Untersuchung schon Blei ergeben hat.

1) Man erhitzt eine kleine Probe auf Platinblech und lässt die Flamme darauf spielen. Verbreitet sich Geruch nach schwefliger Säure, so war Schwefel vorhanden. Bleibt kein Rückstand, so war blos Schwefel zugegen. Hat man sehr stark erhitzt, so könnte sich auch Quecksilberchlorür verflüchtigt haben. Ob dies zu fürchten, lehrt schon das äussere Ansehn des Rückstandes.

2) Man setzt zu einem ganz kleinen Pröbchen Schwefelammonium.

a) *Es bleibt weifs*; man geht zu §. 127. 3. über, denn es sind keine Metallverbindungen zugegen.

b) *Es wird schwarz*. In diesem Falle ist jedenfalls ein Metallsalz, also entweder Quecksilberchlorür, Chlorsilber, Chlorblei oder schwefelsaures Blei zugegen. Ausserdem können noch alle übrigen sub A. genannten Verbindungen vorhanden sein.

Die weitere Trennung wird, je nachdem Blei zugegen ist oder nicht, auf verschiedene Art fortgesetzt. Um zu wissen, welchen Weg man wählen soll, macht man folgende vorläufige Probe.

Ein kleines Theilchen mengt man mit Soda und setzt der innern Löthrohrflamme aus. Bekommt man ein Metallkorn, welches in der äußern Flamme oxydirt wird und bildet sich auf der Kohle ein gelber Beschlag, so ist Blei zugegen.

α) Der weisse Rückstand enthält nach dieser vorläufigen Prüfung Blei.

aa) Man schmilzt den größten Theil des Rückstandes, welcher, wenn er feucht ist, zuvor getrocknet werden muss, mit 3 Thle. trockner Soda und 3 Thle. Cyankalium in einem kleinen Porzellantiegel über der Weingeistlampe zusammen. Die Masse kommt sehr leicht in Fluss. Sie wird darin einige Zeit erhalten. Nach dem Erkalten kocht man mit Wasser, filtrirt und wäscht den Rückstand sehr sorgfältig aus. Das Filtrat übersättigt man zum größten Theil mit Salzsäure und prüft ein Pröbchen desselben mit Chlorbarium, ein entstehender Niederschlag zeigt die Anwesenheit einer schwefelsauren Verbindung. (Entsteht beim Uebersättigen des Filtrats mit Salzsäure ein Niederschlag (Kieselsäure), so verdünnt man die Flüssigkeit, filtrirt, wenn nöthig, und prüft alsdann auf Schwefelsäure.) Den Rest der mit Salzsäure versetzten Flüssigkeit verdampft man zur Trockne und behandelt das Residuum mit Wasser. Bleibt ein Rückstand, so ist er Kieselerde. Mit Soda giebt sie in guter Löthrohrflamme ein klares Glas. — Den nicht mit Salzsäure versetzten Rest des Filtrats säuert man mit Salpetersäure an, kocht, bis aller Geruch nach Blausäure verschwunden ist, und fügt salpetersaures Silber hinzu; entsteht ein Niederschlag von Chlorsilber, so enthält der in Wasser und Salzsäure unlösliche Rückstand (vorausgesetzt, dass die Reagentien chlorfrei waren und der Rückstand vollkommen ausgewaschen wurde) ein Chlormetall. — Den beim Behandeln der geschmolzenen Masse erhaltenen wohlausgewaschenen Rückstand übergießt man mit Essigsäure, löst er sich darin unter Aufbrausen theilweise auf, so waren jedenfalls schwefelsaure alkalische Erden vorhanden. — Entsteht kein Aufbrausen, so ist die Abwesenheit der schwe-

felsauren alkalischen Erden dargethan; man behandelt daher den Rückstand mit Salpetersäure und verfährt mit der Lösung, wie gleich gesagt werden soll. — Gesetzt also, es sei ein Aufbrausen entstanden, so prüft man ein Theilchen der essigsauren Lösung mit Schwefelwasserstoff; entsteht dadurch ein schwarzer Niederschlag (Schwefelblei), so entfernt man aus der gesammten essigsauren Lösung das Blei auf gleiche Weise, verfährt mit dem nöthigenfalls durch Abdampfen eingengten Filtrat nach §. 119. und beginnt bei 2. a. Bleibt die Probe der essigsauren Lösung durch Schwefelwasserstoff unverändert, so verfährt man mit dem Rest derselben geradezu nach §. 119. 2. a. — Den von Essigsäure nicht aufgelösten Rückstand behandelt man mit Salpetersäure und prüft ein Theilchen der Lösung, nachdem der Säureüberschuss durch Abdampfen entfernt ist, mit Schwefelsäure auf Blei, den Rest, nachdem man mit Wasser stark verdünnt hat, mit Salzsäure auf Silber. — Lässt Salpetersäure einen Rückstand, so rührt er von unaufgenommener Kieselsäure oder auch einer nicht vollständig zersetzten schwefelsauren alkalischen Erde her.

bb) Man kocht die Hälfte von dem Rest des Rückstandes mit kohlensaurem Kali. Geht die weiße Farbe desselben in grau oder schwarz über, so ist Quecksilberchlorür zugegen. Zur Bestätigung erhitzt man die andere Hälfte des Restes mit trockner Soda in einem Glasröhrchen, siehe §. 90. b. 7.

β) Der weiße Rückstand enthält nach der vorläufigen Prüfung kein Blei.

Man übergießt den gesammten Rückstand mit Schwefelammonium im Ueberschuss, digerirt damit einige Zeit, filtrirt ab, wäscht aus und kocht den Niederschlag mit Salpetersäure.

aa) *Er löst sich bis auf den ausgeschiedenen Schwefel.* Alleinige Anwesenheit von Chlorsilber. Zur Bestätigung weist man in der salpetersauren Lösung das Silber mit Salzsäure nach. Um das Chlor darzuthun, übersättigt man die vom entstandenen Schwefelsilber abfiltrirte schwefelammonhaltige Flüssigkeit mit Salpetersäure, kocht zur Verjagung des Schwefelwasserstoffs, filtrirt vom ausge-

schiedenen Schwefel ab und prüft mit salpetersaurem Silber.

bb) *Es bleibt außer dem ausgeschiedenen Schwefel ein Rückstand.*

$\alpha\alpha$) Er ist schwarz, deutet auf Quecksilber. Man filtrirt ab und prüft das Filtrat mit Salzsäure auf Silber, den Niederschlag aber erhitzt man mit Königswasser. Erfolgt vollständige Lösung bis auf den ausgeschiedenen Schwefel, so ist, indem hierdurch die Abwesenheit der schwefelsauren alkalischen Erden und der Kieselsäure dargethan wird, die Untersuchung beendet; — bleibt ein weißer Rückstand, so wäscht man ihn aus und verfährt damit nach §. 127. A. 3. Die Lösung in Königswasser prüft man zu größerer Sicherheit mit blankem Kupfer oder Zinnchlorür, siehe §. 117. 2. — Das Chlor, welches zugegen sein muss, weist man in dem schwefelammonhaltigen Filtrat nach der in aa. angegebenen Methode nach.

$\beta\beta$) Er ist nicht schwarz. Abwesenheit des Quecksilbers, man verfährt damit nach 3.

3) Diesen Rückstand oder den ursprünglichen im Falle §. 127. A. 2. a. schmilzt man in Ermangelung eines Platintiegels mit sechs Theilen eines Gemenges von gleichen Theilen trockner Soda und Cyankalium in einem Porzellantiegel, besser aber mit vier Theilen kohlen sauren Natronkalis in einem Platintiegel über der Weingeistlampe mit doppeltem Luftzug, weicht die geschmolzene Masse mit Wasser auf, kocht sie damit aus, filtrirt ab und wäscht einen etwa bleibenden Rückstand so lange aus, bis Chlorbarium in dem ablaufenden Wasser keinen Niederschlag mehr hervorbringt (das Waschwasser lässt man nicht zum ersten Filtrat ablaufen). Das Filtrat übersättigt man mit Salzsäure und prüft ein Theilchen desselben mit Chlorbarium; ein entstehender Niederschlag zeigt die Anwesenheit schwefelsaurer alkalischer Erden. Den Rest verdampft man zur Trockne und zieht mit Wasser aus; bleibt ein Rückstand, so ist er Kieselsäure.

4) Ist beim Ausziehen der mit kohlsaurem Natronkali oder mit Soda und Cyankalium geschmolzenen Masse ein Rückstand geblieben, so deutet er auf schwefelsaure alkalische Erden. Man übergießt ihn, nachdem er sehr gründlich ausgewaschen ist, mit Salzsäure. Löst er sich unter Brausen ganz oder theilweise auf, so waren jedenfalls schwefelsaure Erden vorhanden. Man prüft die salzsaure Lösung nach §. 119. und beginnt bei 2. a. Lässt Salzsäure einen Rückstand, so rührt er von unaufgenommener Kieselsäure oder auch einer nicht vollständig zersetzten schwefelsauren Erde her.

B. Der Rückstand ist nicht weiß. Die Farbe lässt dann schon manchen Schluss ziehen (Zinnober, Schwefelarsen).

1) Man prüft auf Schwefel, wie in §. 127. A. 1.

2) Man übergießt den größten Theil mit Königswasser, kocht damit, filtrirt noch heiß ab, kocht, im Falle außer etwa ausgeschiedenem Schwefel ein Rückstand bleibt, nochmals mit Wasser, filtrirt zur ersten Lösung, verdampft das Filtrat beinahe zur Trockne, nimmt mit etwas Wasser auf und prüft ein Theilchen mit Schwefelsäure auf Blei, ein anderes mit blankem Kupfer auf Quecksilber. (Hat man nach §. 106. eine salzsaure Lösung zur Untersuchung auf Basen angewendet, so muss die Lösung in Königswasser nach dem gewöhnlichen Gange auf Metalle untersucht werden, da noch verschiedene andere Schwefelmetalle, welche in Salzsäure theils schwerlöslich, theils unlöslich sind, zugegen sein könnten.)

3) Hat Königswasser außer etwa ausgeschiedenem und nicht vollständig gelöstem Schwefel einen Rückstand gelassen, so wäscht man ihn gut aus. Ist eine Bleiverbindung vorhanden gewesen, so lange mit heißem Wasser, bis das Filtrat von Schwefelammonium nicht mehr geschwärzt wird.

a) Er ist weiß, man prüft ein Theilchen mit Schwefelammonium.

α) *Es wird schwarz.* Man digerirt den gesamten Rückstand mit Schwefelammonium und verfährt überhaupt genau nach §. 127. A. 2. b. β .

β) *Es bleibt weiß.* Man verfährt mit dem Rückstande, wie oben §. 127. A. 3. gezeigt wurde.

b) Der in Königswasser unlösliche Rückstand ist schwarz, zeigt die Anwesenheit von Kohle in irgend einem Zustande: Holzkohle, Steinkohle, Knochenkohle, Graphyt etc. Verbrennt er im Platinlöffelchen oder vor dem Löthrohr ganz, so ist weiter Nichts vorhanden; bleibt ein Rückstand, oder gelingt das Verbrennen nicht vollständig (Graphyt), so muss man noch auf Chlorsilber, schwefelsaure alkalische Erden und Kieselsäure achten; man behandelt daher den Rückstand nach §. 127. B. 3. a. α.

Von Säuren und electronegativen Körpern können auſser den schon besprochenen nur noch Chlor und Schwefelsäure zugegen sein. Zu ihrer Nachweisung digerirt man den Rest des in Salzsäure unlöslichen Rückstandes mit Schwefelammonium, übersättigt und kocht das Filtrat theils mit Salzsäure, theils mit Salpetersäure, filtrirt und prüft die salzsaure Flüssigkeit mit Chlorbarium auf Schwefelsäure, die salpetersaure mit salpetersaurem Silber auf Chlor.

Das unlösliche Zinnoxid und Chromoxid erkennt man vor dem Löthrohr. Ersteres giebt mit Soda und Cyankalium auf Kohle in der Reductionsflamme ein weiches Metallkorn ohne gleichzeitigen Beschlag; letzteres, welches auſserdem durch seine grüne Farbe ausgezeichnet ist, behandelt man mit Phosphorsalz, siehe §. 87. b. 5., oder schmilzt es mit Soda und Salpeter zusammen, §. 87. b. 4. Die unlöslichen arseniksauren Verbindungen erkennt man, was die Säure anbetrifft, vor dem Löthrohr und durch Reduction im Röhrchen, siehe §. 94. d. Zur Untersuchung auf die Basen müssen sie durch Köchen mit concentrirter Schwefelsäure zerlegt werden. — Fluorcalcium zerlegt man mit concentrirter Schwefelsäure im Platintiegel, das Fluor wird am Aetzen des Glases erkannt, der Kalk bleibt als Gyps zurück.

Einige andere Verbindungen werden durch Glühen gleichfalls in Säuren unlöslich; sie alle anzuführen, überstiege die Gränze dieser Anweisung.

§. 128.

Besonderes Verfahren zur Zerlegung in Wasser unlöslicher Cyan-, respective Ferrocyan- etc. Verbindungen ¹⁾.

Da bei der Behandlung dieser Verbindungen nach der gewöhnlichen Weise oft so abweichende Erscheinungen eintreten, dass dadurch sehr leicht Irrungen entstehen, da ferner die Auflösung derselben in Säuren oft nur unvollkommen gelingt, so schlägt man zu ihrer Analyse besser folgendes Verfahren ein.

Man kocht den durch Wasser von allen löslichen Substanzen befreiten Rückstand mit kohlensaurer Kalilauge.

a) Es entsteht vollständige Zersetzung, was man sehr leicht an der Farbenveränderung und dem schnellen Absetzen der ausgeschiedenen reinen oder kohlensauren Oxyde erkennen kann; man filtrirt und wäscht den Niederschlag aus. Er kann sämtliche Basen enthalten, welche als in Wasser unlösliche Verbindungen in der Substanz enthalten waren. Man verfährt damit zu ihrer Ausmittlung genau nach §. 106. A. 2. In der abfiltrirten Flüssigkeit erkennt man das Cyan, indem man zu einer mit Salzsäure bis zur stark sauren Reaction versetzten Probe Eisenchlorürchloridlösung setzt, wodurch ein Niederschlag von Berlinerblau entstehen muss. Zur Auffindung der übrigen Säuren verfährt man mit dem Filtrat nach §. 124. — In der abfiltrirten Flüssigkeit kann ferner möglicherweise alles Kobalt, alles Eisen, auch Chrom und Mangan vorhanden sein, da die Verbindungen ihrer Cyanmetalle mit andern Cyanüren sich beim Kochen mit Alkalien in der Art zerlegen, dass unlösliche Oxyde abgeschieden werden, während Kobaltcyanidkalium, Ferrocyankalium u. s. w. gelöst bleiben. Um diese Metalle nicht zu übersehen, muss man daher einen Theil der Flüssigkeit mit Salpetersäure in starkem Ueberschuss versetzen, zur Trockne verdampfen und unter Zusatz von etwas Salpeter (wenn die Menge des gebildeten nicht schon hinreichend ist) schmelzen. Die Metalle bleiben mit Ausnahme des Chroms als Oxyde zurück und werden nach den oben angegebenen Methoden geschieden und erkannt. Das Chrom erhält man als lösliches chromsaures Kali.

¹⁾ Man mache sich, ehe man nach diesem Gang analysirt, vor Allem mit den in dem 2. Abschnitt gegebenen Bemerkungen zu §. 128. bekannt.

b) Es entsteht keine vollständige Zersetzung. Man setzt noch kaustisches Kali hinzu und kocht. Bleibt ein Rückstand, so filtrirt man ihn, nachdem man etwas Wasser zugesetzt hat, ab. Er wird nach §. 106. A. 2. aufgelöst und weiter geprüft. Das alkalische Filtrat sättigt man mit Schwefelwasserstoff; entsteht ein Niederschlag, so filtrirt man wiederum, löst denselben in Salpetersäure und verfährt mit der Lösung nach §. 114. III. Die ablaufende Flüssigkeit macht man mit Salzsäure gelinde sauer und setzt, im Falle es nöthig erscheint, noch Schwefelwasserstoff zu, ein hierdurch etwa erzeugter Niederschlag wird nach §. 116. untersucht. Das Filtrat prüft man auf Cyan, auf die übrigen electronegativen Körper und Säuren und auf Kobalt, Eisen, Mangan und Chrom nach §. 128. a. Bei den nach der angegebenen Methode durch Schmelzen mit Salpeter zu erhaltenden Oxyden erhält man gleichzeitig die Thonerde, wenn welche zugegen war, worauf zu achten.

§. 129.

Allgemeine Regeln zur Auffindung unorganischer Körper bei Gegenwart von organischen Substanzen, die durch Farbe, Consistenz oder sonstige Eigenschaften die Anwendung der Reagentien oder das Erkennen der hervorgebrachten Erscheinungen hindern.

Wie schon in der Einleitung bemerkt wurde, sind der Fälle dieser Art so mannichfache, dass die Verfahrensarten für jeden einzelnen unmöglich mit Bestimmtheit angegeben werden können. Es sollen daher hier nur die in den meisten Fällen anwendbaren Methoden angeführt werden, deren durch die einzelnen Fälle bedingte Modification dem Arbeitenden überlassen bleibt.

1) Der Körper löst sich in Wasser, die Lösung hat aber dunkle Farbe oder schleimige Consistenz.

a) Man kocht einen Theil der Lösung mit Salzsäure und fügt nach und nach chloresaurer Kali zu bis die Flüssigkeit dünnflüssig und entfärbt ist, alsdann erhitzt man bis der Chlorgeuch verschwunden, verdünnt mit Wasser und filtrirt. Mit diesem Filtrat verfährt man nach dem gewöhnlichen Gange und beginnt bei §. 115.

b. Man kocht einen andern Theil eine Zeitlang mit Salpetersäure und prüft das Filtrat auf Silber, Kali und Chlorwasserstoff-

säure. Gelingt die Zerstörung der färbenden, schleimigen etc. Substanzen mit Salpetersäure gut, so ist diese Art der Behandlung überhaupt oft vorzuziehen.

2) Der Körper löst sich nicht oder nur theilweise in kochendem Wasser. Man filtrirt und verfäht mit der Lösung entweder nach §. 114., oder wenn sie entfärbt werden muss, nach §. 129. 1. — Lässt sich die Lösung nicht filtriren, so verfäht man nach §. 129. 2. c. — Der Rückstand kann von verschiedener Natur sein.

a) Er ist fettig. Man entfernt das Fett durch Aether und verfäht mit etwaigem Rückstand nach §. 106.

b) Er ist harzartig. Man wendet statt Aether Alkohol oder auch beide nach einander an.

c) Er ist anderer Natur, z. B. organischer Faserstoff etc. Man trocknet, reibt den grössten Theil mit drei bis vier Theilen reinen Salpeters zusammen und verpufft das Gemenge nach und nach in einem glühenden Tiegel. Mit dem Rückstand verfäht man nach §. 106. A. Einen zweiten Theil des in Wasser unlöslichen Rückstandes kocht man mit Königswasser und prüft das Filtrat auf Quecksilber. Den Rest prüft man auf Ammoniak nach §. 122.

§. 130.

IV. Bestätigende Versuche.

Wenn man nach dem angegebenen Verfahren die Basen, Säuren und electronegativen Körper, die in der Substanz zugegen waren, gefunden hat, so ist es in manchen Fällen nothwendig, in anderen rathsam, die gefundenen Resultate auf irgend eine Art zu controliren. Bei manchen Körpern ist dies leicht, da sie durch gewisse Reactionen so genau charakterisirt sind, dass man ihre Gegenwart auch bei Anwesenheit vieler anderer Körper auf eine empfindliche und bestimmte Weise darthun kann. Man darf ja nachträglich nur bei weiteren Proben der zu untersuchenden Substanz diese Reactionen hervorrufen, um sogleich zur völligen Gewissheit zu gelangen. — Bei vielen andern Körpern fehlen uns solche ausgezeichnete Reactionen, wir müssen daher in solchen Fällen, anstatt auf bestätigende Versuche, unsere Ueberzeugung

darauf gründen, dass wir uns genaue Rechenschaft geben, ob die Erscheinungen, welche uns bestimmten, die Gegenwart eines Körpers zu erkennen, nicht von einer andern Ursache, als der angenommenen, hergerührt haben könnten. Wie oft z. B. wird irrigerweise Ammoniak in einer Substanz aufgefunden, weil die Atmosphäre des Laboratoriums ammoniakhaltig ist, wie häufig Thonerde entdeckt, weil die angewandte Kalilauge in Folge einer Verunreinigung beim Vermischen mit Salmiaklösung getrübt wird. etc.

Da die sämtlichen Reactionen, die uns zur Controle dienen, ebenso wie die Vorsichtsmafsregeln, welche bei Anwendung der Reagentien nöthig sind und endlich die Prüfung der Reagentien auf ihre Reinheit oben schon ausführlich angegeben worden sind, so muss, indem jede weitere Ausführung dieses Gegenstandes als Wiederholung erscheinen würde, die controlirende Prüfung dem Nachdenken des Einzelnen überlassen bleiben.

Zweiter Abschnitt.

Erklärung des praktischen Verfahrens, Zusätze und Bemerkungen zu demselben.

I. Bemerkungen zur einleitenden Prüfung.

Zu §. 105.

Aus der Betrachtung der physikalischen Eigenschaften eines Körpers, besonders wenn es kein Gemenge ist, lässt sich wie oben bemerkt in vielen Fällen ein gewisser Schluss auf seine Natur im Allgemeinen machen. Hat man z. B. einen weissen Körper, so schliesst man, es ist kein Zinnober, hat man einen sehr leichten, so vermuthet man, es sei keine Bleiverbindung u. s. w. — Solche Schlüsse führen häufig schneller zum Ziele und sind daher zulässig und räthlich, so lange sie in ihrer Allgemeinheit bleiben. Treten sie aber aus dieser heraus, so wird daraus leicht ein Rathen, es entstehen vorgefasste Meinungen, welche fast immer, indem sie für alle eintretenden widersprechenden Reactionen blind machen, zu falschen Resultaten führen. —

Um das Verhalten einer Substanz in höherer Temperatur zu

prüfen, kann man sich anstatt eines eisernen Löffelchens in vielen Fällen auch kleiner, 2—3 Zoll langer, am einen Ende zugeschmolzener Glasröhren bedienen. Sie bieten den Vortheil, dass man flüchtige Körper, organische Substanzen etc. weniger leicht übersieht, auch ihrer Natur nach besser beurtheilen kann. Da man aber zu jedem Versuche ein neues Röhrchen anwenden muss, so ist, so lange man zur Uebung analysirt, ein Löffelchen billiger und bequemer.

Hinsichtlich der einleitenden Prüfung mit dem Löthrohre ist als wohl zu beachtend hinzuzufügen, dass der Anfänger, so lange ihm die bei Löthrohrversuchen so unentbehrliche Uebung und der dadurch sich bildende richtige Blick fehlt, aus den pyrochemischen Versuchen nicht zu viel schliesse. Es geschieht gar leicht, dass, wenn man an einem schwachen Beschlag mit Bestimmtheit ein Metall erkennen will, oder wenn man sich durch nicht eintretende Reduction, nicht erfolgende Färbung mit Kobaltsolution u. s. w. für überzeugt hält, dieser oder jener Körper könne nicht zugegen seyn, Irrungen und Uebersehen einzelner Bestandtheile die Folge ist, indem zwar die Erscheinungen meist untrüglich, ihre Hervorrufung aber nicht immer leicht ist, auch zufällige Umstände die Reactionen modificiren.

Endlich ist noch als eine Erfahrungssache zu erwähnen, dass viele Anfänger, in der Meinung, sie würden durch die eigentliche Untersuchung die Natur der Substanz schon zu ermitteln wissen, die einleitende Prüfung zur Ersparung von Zeit und Mühe ganz vernachlässigen. Anstatt die Unklugheit dieser Ansicht nachzuweisen, bemerke ich nur beispielsweise, dass man in solcher Meinung Befangene stundenlang nach allen organischen Säuren suchen sieht, bis sie endlich finden, dass gar keine zugegen ist. Alles blofs um Zeit und Mühe zu ersparen!

II. Bemerkungen zur Auflösung der Körper u. s. w.

Zu §. 106.

Wenn man die Charakteristick der im §. 106. aufgestellten Classen, in welche wir die Körper mit Ausnahme der regulinischen Metalle nach ihrem Verhalten zu gewissen Lösungsmitteln bringen, betrachtet, so scheinen sie schärfer begränzt, als sie in Wirklichkeit sind. Diese Unbestimmtheit rührt von den auf der Gränze

stehenden, sogenannten schwerlöslichen Körpern her und giebt dem Anfänger oft zu Irrungen Veranlassung. Es soll daher über diese Eintheilung im Allgemeinen Einiges hinzugefügt werden.

Am schwierigsten ist es, genau festzustellen, welche Körper man als in Wasser lösliche, welche als unlösliche zu betrachten habe, da die Zahl der in Wasser schwerlöslichen besonders groß und die Uebergänge sehr allmählig sind. Der schwefelsaure Kalk, in 461 Theilen löslich, könnte vielleicht als Gränze dienen, da er in wässriger Lösung durch die scharfen Reagentien, die wir auf Kalk und Schwefelsäure besitzen, noch mit großer Sicherheit erkannt werden kann.

Prüft man eine wässrige Flüssigkeit durch Abdampfen einiger Tropfen auf Platinblech, ob sie einen festen Körper aufgelöst enthält, so bleibt oft ein ganz unbedeutender Rückstand, der über den zu ziehenden Schluss in Zweifel lässt. In diesem Falle prüft man erstens die Reaction der Flüssigkeit mit Lackmuspapieren, zweitens setzt man zu einem Theilchen derselben einen Tropfen Chlorbariumlösung, und endlich zu einem andern etwas kohlen-saures Kali. Entsteht durch diese Reagentien keine Veränderung und ist die Flüssigkeit zugleich neutral, so hat man nicht nöthig dieselbe auf Basen oder Säuren weiter zu untersuchen. Man kann überzeugt sein, dass der Körper, von welchem der beim Verdampfen bleibende Rückstand herrührte, besser bei den in Wasser Unlöslichen aufzufinden sei, da sowohl die Säuren, als die Basen, welche vorzugsweise schwerlösliche Verbindungen bilden, durch die angewandten Reagentien mit Empfindlichkeit angezeigt werden.

Hat Wasser irgend Etwas aufgelöst, so thut der Anfänger stets am Besten, diese Lösung in Bezug auf Basen und Säuren für sich zu untersuchen, da ein solches Verfahren leichter die Natur der vorhandenen Verbindung erkennen lässt und größere Sicherheit gewährt; zwei Vorzüge, die leicht die Unannehmlichkeit, in wässriger und saurer Lösung zuweilen auf denselben Stoff zu stoßen, aufwiegen.

In Wasser unlöslich, aber in Salzsäure oder Salpetersäure löslich sind, freilich mit Ausnahmen, die phosphorsauren, arsenik-sauren, arsenigsauren, borsauren, kohlen-sauren und oxalsaurer Erd- und Metall-Salze; ferner verschiedene weinsteinsäure, citronensäure, äpfelsäure, benzoësaure und bernsteinsäure Salze, die Oxyde und Schwefelverbindungen der schweren Metalle, Thonerde, Magnesia, viele Jod- und Cyan-Metalle u. s. w. Diese Ver-

bindungen werden nun zwar fast alle, wenn nicht durch verdünnte, doch durch concentrirte kochende Salzsäure zersetzt (die Ausnahmen siehe §. 127.), jedoch entstehen dadurch bei Anwesenheit von Silberoxyd unlösliche, bei Gegenwart von Quecksilberoxydul und Blei aber schwerlösliche Produkte. Bei Anwendung von Salpetersäure findet dies nicht statt, daher man oft mit dieser eine vollständige Auflösung erhält, wenn Salzsäure einen Rückstand lässt. Salpetersäure lässt dagegen, außer den in einfachen Säuren überhaupt unlöslichen Körpern, Antimonoxyd, Zinnoxid Bleisuperoxyd etc. zurück und löst manche andere mehr oder minder vollkommen. Ist die Verbindung daher in Salpetersäure (bis auf etwa ausgeschiedenen Schwefel) nicht vollständig löslich, so verweist der Gang desswegen wieder auf die salzsaure Lösung, damit die dritte Abtheilung der Körper, die in Wasser und einfachen Säuren unlöslichen, wenigstens nach dieser Seite einigermaßen genau begränzt ist.

In Bezug auf die Auflösung regulinischer Metalle und Legirungen ist zu bemerken, dass sich beim Kochen derselben mit Salpetersäure häufig weißse Niederschläge bilden, auch wenn kein Zinn und Antimon zugegen ist. Diese Niederschläge werden von Anfängern öfters mit den eben genannten Oxyden verwechselt, obgleich sie ein ganz anderes Ansehen haben. Es sind salpetersaure Salze, welche in der vorhandenen Salpetersäure schwerlöslich, in Wasser hingegen leichtlöslich sind. Bevor man also aus einem ungelösten weißen Rückstand auf Zinn oder Antimon schließt, ist wohl zu prüfen, ob sich derselbe nicht in Wasser löst.

III. Bemerkungen zur eigentlichen Untersuchung.

Zu §. 107 — §. 129.

A. Allgemeine Uebersicht und Erklärung des analytischen Ganges.

a. Auffindung der Basen.

Wir haben oben in dem dritten Abschnitt der ersten Abtheilung, welcher von dem Verhalten der Körper zu Reagentien handelt, die Basen in sechs Gruppen getheilt, und an den betreffenden Stellen bereits angeführt, wie man die in diese Gruppen gehörenden Basen von einander trennt oder neben einander erkennt. Diese

Gruppen sind im Allgemeinen dieselben, in welche wir die Basen bei dem Gang der Analyse scheiden. Auf dieser Trennung in Gruppen und auf der Einzelerkennung der gruppenweise geschiedenen Metalle beruht der §. 114. — §. 122. auseinandergesetzte Gang der Analyse zur Untersuchung von Verbindungen, in welchen sämtliche hier überhaupt in Betracht kommende Basen vorausgesetzt werden. — Es wurde daselbst lediglich darauf Rücksicht genommen, eine praktische Anleitung zu geben, wie man zu verfahren habe, wenn man wirklich analysiren will. Da dieses Zweckes halber Vieles aufgenommen werden musste, was zum rein theoretischen Verständniss nicht nothwendig und zur schnellen Uebersicht eher hinderlich ist, und da Verständniss und Uebersicht als die unerlässlichsten Bedingungen zu erfolgreicher Arbeit erscheinen, so soll hier kurz der Schlüssel zu obigem Verfahren, was die Scheidung in Gruppen betrifft, gegeben werden. In Bezug auf die Einzelerkennung der Basen verweise ich auf das §. 85. — §. 94. in den Zusätzen und Bemerkungen Gesagte. —

Die allgemeinen Reagentien, deren wir uns im Gang der Analyse zur Trennung der Basen in Hauptgruppen bedienen, sind: Salzsäure, Schwefelwasserstoff, Schwefelammonium und kohlensaures Ammoniak. Die Reihenfolge, in welcher sie angewendet werden, ist dieselbe, in der sie eben aufgezählt worden sind. Das Schwefelammonium spielt eine doppelte Rolle.

Nehmen wir an, wir hätten sämtliche Basen, arsenige Säure und endlich phosphorsauren Kalk (der uns als Typus für die in Säuren löslichen, durch Ammoniak unverändert abgeschieden werdenden alkalischen Erdsalze dienen mag) d. h. alle Körper, welche wir oben bei dem Gang zur Auffindung der Basen berücksichtigt haben, gleichzeitig in Auflösung.

Chlor bildet nur mit Silber und Quecksilber unlösliche Verbindungen, Chlorblei ist in Wasser schwer löslich. Das unlösliche Chlorquecksilber entspricht dem Quecksilberoxydul. Setzen wir daher zu unserer Auflösung:

1) *Salzsäure*, so entfernen wir aus der Lösung die Metalloxyde der ersten Abtheilung der fünften Gruppe, namentlich alles Silberoxyd und alles Quecksilberoxydul. Je nach der Concentration der Lösung fällt vielleicht auch ein Theil des Bleis als Chlorblei nieder. Das Letztere ist an und für sich unwesentlich, da jedenfalls eine zur Erkennung des Bleis genügende Menge in Lösung bleibt.

Schwefelwasserstoff schlägt aus einer Lösung, welche eine freie Mineralsäure enthält, die Oxyde der fünften und sechsten Gruppe vollständig nieder, da die Verwandtschaft der metallischen Radikale der genannten Oxyde zum Schwefel nebst der des Wasserstoffs zum Sauerstoff so groß ist, dass sie die zwischen Metall und Sauerstoff, sammt der zwischen dem Oxyd und einer starken Säure bestehende, überwindet, auch wenn die Säure im Ueberschuss vorhanden ist. Alle andern Basen aber werden unter den angegebenen Umständen nicht gefällt, und zwar die der ersten, zweiten und dritten Gruppe desswegen nicht, weil sie keine in Wasser unlösliche Schwefelverbindungen bilden, die der vierten Gruppe aber aus dem Grunde nicht, weil die Verwandtschaft der metallischen Radikale derselben zum Schwefel sammt der des Sauerstoffs zum Wasserstoff nicht groß genug ist, die des Metalls zum Sauerstoff und des Oxyds zu einer starken Säure zu überwinden, wenn die letztere im Ueberschuss vorhanden ist.

Setzen wir daher zu unserer Lösung, aus welcher wir mit Salzsäure Silberoxyd und Quecksilberoxydul bereits vollständig entfernt haben und in welcher sich noch Salzsäure im freien Zustande befindet, 2) *Schwefelwasserstoff*, so entfernen wir aus derselben den Rest der Oxyde der fünften und die Oxyde der sechsten Gruppe, also Blei-, Quecksilber-, Kupfer-, Wismuth-, Cadmium-Oxyd, sowie Gold- und Platin-Oxyd, Zinn-oxydul, Zinn- und Antimonoxyd, arsenige Säure und Arseniksäure. Alle übrigen Oxyde bleiben in Lösung, und zwar entweder unverändert, oder auf eine niedere Oxydationsstufe zurückgeführt, wie z. B. Eisenoxyd, Chromsäure u. s. w.

Die den Oxyden der sechsten Gruppe entsprechenden Schwefelverbindungen haben die Eigenschaft, sich mit electropositiven Schwefelmetallen (den Schwefelverbindungen der Alkalimetalle) zu in Wasser löslichen Schwefelsalzen zu verbinden, die den Oxyden der fünften Gruppe entsprechenden Schwefelverbindungen haben diese Eigenschaft nicht. Behandeln wir daher die sämtlichen durch Schwefelwasserstoff aus saurer Lösung gefällten Schwefelmetalle 3) mit *Schwefelammonium* oder *Schwefelkalium*, so bleiben Quecksilber-, Blei-, Kupfer-, Wismuth- und Cadmium-Sulfid ungelöst, die übrigen Sulfide lösen sich als Schwefelgold-, Schwefelplatin-, Schwefelantimon-, Schwefelzinn-, Schwefelarsen-Schwefelammonium oder -Schwefelkalium auf und werden aus dieser Lösung durch Zusatz einer Säure entweder

unverändert, oder, was das Zinnsulfür anbelangt, als höhere Schwefelungsstufe (es nimmt vom Schwefelammon Schwefel auf) gefällt. Die Säure zersetzt nämlich das gebildete Schwefelsalz. Die Schwefelbase (Schwefelammonium oder Schwefelkalium) wird auf Kosten der Bestandtheile zerlegten Wassers in eine Sauerstoffbase (Ammoniumoxyd oder Kali) und in Schwefelwasserstoff zerlegt, erstere verbindet sich mit der zugesetzten Säure, letzteres entweicht, das freigewordene electronegative Schwefelmetall aber fällt nieder. (Ist die Säure eine Wasserstoffsäure, so tritt ihr Radikal mit dem Ammonium, ihr Wasserstoff mit dem Schwefel zusammen.) Zugleich wird Schwefel abgeschieden, da das Schwefelammonium stets einen Ueberschuss desselben enthält. Er macht die Farbe der gefällten Schwefelmetalle heller, was bei ihrer Beurtheilung zu berücksichtigen ist.

Von den noch in Lösung befindlichen Oxyden blieben die Alkalien, die alkalischen Erden, Thonerde und Chromoxyd in Auflösung, weil ihre Schwefelverbindungen in Wasser löslich sind, oder weil ihre Salze durch Schwefelwasserstoff gar keine Veränderung erleiden; die Oxyde der vierten Gruppe aber würden durch Schwefelwasserstoff gefällt worden sein, hätte die anwesende freie Säure es nicht verhindert, denn die ihnen entsprechenden Schwefelverbindungen sind ja in Wasser unlöslich. Nehmen wir daher diese Bedingung des nicht gefällt Werdens, die freie Säure, weg, machen wir also die Lösung alkalisch und fügen Schwefelwasserstoff hinzu, oder setzen wir 4) *Schwefelammonium*, welches beides in sich vereinigt, zur Lösung, so fallen die den Oxyden der vierten Gruppe entsprechenden Schwefelmetalle, also Schwefeleisen, Schwefelmangan, Schwefelkobalt, Schwefelnickel und Schwefelzink nieder. Mit ihnen aber werden Thonerde und Chromoxyd und phosphorsaurer Kalk niedergeschlagen und zwar desswegen, weil die Verwandtschaft des Ammoniumoxyds zu der Säure des Chromoxyd- oder Thonerdesalzes oder zu der, welche die Bedingung des Gelöstseins beim phosphorsauren Kalk ist, eine Wasserzersetzung veranlasst, in Folge welcher sich eben aus Schwefelammonium und Wasser Ammoniumoxyd und Schwefelwasserstoff bildet. Ersteres verbindet sich mit der Säure, — der Schwefelwasserstoff, unfähig, sich mit den ihrer Säure beraubten Oxyden oder mit dem phosphorsauren Kalke zu verbinden, entweicht, — die Oxyde und das Kalksalz fallen nieder. —

In Lösung sind uns jetzt nur noch die alkalischen Erden und die Alkalien geblieben. Die neutralen kohlensauren Verbindungen der ersteren sind in Wasser unlöslich, die der letzteren löslich. Setzen wir daher

5) *kohlensaures Ammoniak* zu und erhitzen, um etwa gebildete saure kohlensaure Salze zu zersetzen, so müssten die alkalischen Erden sämmtlich niedergeschlagen werden. Es ist dies jedoch nur in Bezug auf Baryt, Strontian und Kalk wahr, von der Magnesia wissen wir, dass sie, wegen ihrer Neigung mit Ammoniaksalzen Doppelverbindungen zu bilden, nur theilweise und bei Anwesenheit eines anderweitigen Ammoniaksalzes gar nicht niedergeschlagen wird. Um diese Unsicherheit ganz zu vermeiden, setzt man daher vor dem Zusatz des kohlensauren Ammoniaks Salmiak zu, damit dadurch die Fällung der Magnesia ganz und gar verhindert werde.

In Lösung haben wir jetzt noch Magnesia und die Alkalien. Von der Anwesenheit der ersteren überzeugen wir uns durch phosphorsaures Natron und Ammoniak; die Abscheidung derselben nehmen wir jedoch auf andere Weise vor, um keine Phosphorsäure, welche die weitere Analyse erschweren würde, ins Spiel zu bekommen. Man gründet sie entweder darauf, dass die Magnesia im reinen oder darauf, dass sie im kohlensauren Zustande unlöslich ist. Man glüht nämlich, um die Ammoniaksalze zu verjagen, und schlägt die Magnesia entweder mit Baryterde nieder, wobei die Alkalien in Lösung bleiben, oder man glüht unter Zusatz von Schwefelsäure, verwandelt die erhaltenen schwefelsauren Salze durch Zersetzung mit essigsaurem Baryt in essigsaure und diese durch Glühen in kohlensaure Salze, bei deren Behandlung mit Wasser alsdann die kohlensaure Magnesia zurückbleibt, während sich die kohlensauren Alkalien lösen.

Zur Aufsuchung des Ammoniaks endlich muss, wie sich von selbst versteht, eine neue Probe genommen werden.

b. Auffindung der Säuren.

Bevor man zur Untersuchung der Säuren und electronegativen Körper übergeht, beachtet man, welche überhaupt, je nach den gefundenen Basen und der Classe, in welche der Körper nach seiner Löslichkeit gehört, vorhanden sein können, damit man nicht unnöthige Versuche mache. Die im Anhange zugefügte Tabelle wird dem Anfänger dabei von Nutzen sein.

Die allgemeinen Reagentien, welche wir zur Auffindung der Säuren gebrauchen, sind, wie sich aus dem Frühern ergibt, bei den unorganischen Säuren Chlorbarium und salpetersaures Silberoxyd, bei den organischen Chlorcalcium und Eisenchlorid. Vor Allem muss man sich daher aufs gewisseste überzeugt haben, ob man bloß mit unorganischen oder bloß mit organischen Säuren zu thun hat, oder ob gleichzeitig Säuren beider Classen zugegen sind. — Bei der Untersuchung auf Basen dienen uns die allgemeinen Reagentien dazu, die verschiedenen Gruppen der Basen wirklich zu trennen, bei den Säuren bedienen wir uns derselben in anderer Art, nämlich nur, um uns von der Abwesenheit oder Anwesenheit der in die verschiedenen Gruppen gehörenden Säuren zu überzeugen. —

Nehmen wir, wie wir es eben bei den Basen gethan haben, auch hier an, wir hätten eine wässrige Lösung, in welcher alle Säuren, welche überhaupt in den obigen Gang aufgenommen sind, etwa an Natron gebunden zugegen wären.

Baryt bildet mit Schwefelsäure, Phosphorsäure, mit arseniger Säure, Arsensäure, mit Kohlensäure, Kieselsäure, Borsäure, Chromsäure und Oxalsäure, Weinsäure und Citronensäure unlösliche Verbindungen; dieselben lösen sich mit Ausnahme des schwefelsauren Baryts in Salzsäure. Setzen wir daher zu einem Theilchen unserer neutralen oder nöthigenfalls neutral gemachten Auflösung

1) *Chlorbarium*,

so erfahren wir sogleich allgemein, dass wenigstens eine von den oben angeführten Säuren zugegen ist. Fügen wir zu dem entstandenen Niederschlage Salzsäure, so giebt sich die Anwesenheit der Schwefelsäure zu erkennen, indem ja die anderen Barytsalze sämtlich gelöst werden, während der schwefelsaure Baryt ungelöst bleibt. — Bei seiner Anwesenheit lässt sich nur die Gegenwart eines Theils der übrigen eben genannten Säuren durch die Reaction mit Chlorbarium mit Sicherheit erkennen. Denn wenn man die salzsaure Auflösung der Niederschläge abfiltrirt und mit Ammoniak übersättigt, so wird z. B. der borsaure, der weinsaure, citronensaure u. s. w. Baryt nicht wieder niederfallen, weil diese Niederschläge vom gebildeten Salmiak in Auflösung gehalten werden. Aus diesem Grunde kann Chlorbarium nicht zur wirklichen Abscheidung der sämtlichen genannten Säuren dienen und wir legen daher darauf, was die Einzelerkennung

der Säuren mit Ausnahme der Schwefelsäure anbetrifft, kein weiteres Gewicht. Von grosser Bedeutung ist es uns aber deswegen, weil durch nicht entstehende Fällung in neutraler oder alkalischer Lösung ein so grosser Theil der Säuren alsobald ausgeschlossen wird. —

Silber bildet mit Chlor, Jod, Brom und Cyan, Silberoxyd mit Phosphorsäure, arseniger Säure, Arsensäure, Borsäure, Chromsäure, Kieselsäure, Oxalsäure, Weinsäure und Citronensäure in Wasser unlösliche Verbindungen. Dieselben sind mit Ausnahme des Jodsilbers in Ammoniak, mit Ausnahme des Chlor-, Jod-, Brom- und Cyan-Silbers in Salpetersäure löslich. Setzen wir daher zu unserer Auflösung, welche aus dem eben angeführten Grunde ganz neutral sein muss,

2) *Salpetersaures Silberoxyd,*

so giebt sich uns die Anwesenheit einer oder mehrerer der genannten Säuren alsobald kund und zwar, was die meisten anbetrifft, nur allgemein. Chromsäure, Arsensäure und andere, deren Silbersalze gefärbt sind, können jedoch mit ziemlicher Sicherheit schon aus der Farbe des Niederschlags erkannt werden. Setzen wir zu dem Niederschlag Salpetersäure, so giebt sich uns die Anwesenheit der Haloidverbindungen zu erkennen, da sie ungelöst bleiben, während die Oxydsalze sich sämmtlich lösen. — Die vollständige Abscheidung der Säuren, welche mit Silberoxyd in Wasser unlösliche Verbindungen bilden, durch salpetersaures Silber, gelingt aus derselben Ursache nicht, welche die Abtrennung der Säuren durch Chlorbarium unsicher macht. Das entstehende Ammoniaksalz verhindert nämlich, wie oben die Wiederfällung mehrerer Barytsalze, so hier die Wiederausscheidung mehrerer Silbersalze durch Ammoniak aus der sauren Lösung. Das salpetersaure Silberoxyd ist demnach, abgesehen davon, dass es zur Abscheidung des Chlors, Broms, Jods und Cyans dient und auf Chromsäure u. s. w. hinweist, besonders auch wie das Chlorbarium dazu wichtig, dass es, wenn neutrale Lösungen nicht davon gefällt werden, die Abwesenheit vieler Säuren von vorn herein anzeigt. — Das Verhalten zu untersuchender Lösungen zu diesen beiden Reagentien giebt daher gleich von Anfang guten Aufschluss, ob man alle angeführten Proben machen müsse, oder welche man überschlagen könne. Hat man also z. B. durch Chlorbarium einen Niederschlag bekommen, durch salpetersaures Silberoxyd hingegen nicht, so wird

es, angenommen, die Lösung enthielte nicht schon Ammoniaksalze, überflüssig sein, auf Phosphorsäure, Chromsäure, Borsäure, Kieselsäure, arsenige Säure, Arsensäure, Oxalsäure, Weinsäure und Citronensäure zu prüfen. Derselbe Umstand wird eintreten, im Falle man nur durch Silberlösung, nicht aber durch Chlorbarium einen Niederschlag bekommen hat. Es ist einleuchtend, wie viele Einzelversuche durch diese einfachen Combinationen erspart werden. — Wenn wir nach diesen Betrachtungen nun wieder zu unserm vorliegenden Falle, in dem wir alle Säuren als gleichzeitig anwesend voraussetzen, zurückkehren, so hätten wir also Chlor, Brom, Jod und Cyan (deren Trennung und specielle Erkennung schon in den Zusätzen und Bemerkungen zu §. 100. auseinandergesetzt ist), sowie Schwefelsäure bereits erkannt, und es wäre Grund und Ursache vorhanden, auf alle übrigen durch beide Reagentien gefällt werdenden Säuren Rücksicht zu nehmen. Die Erkennung derselben beruht auf den Resultaten von lauter einzelnen Versuchen, welche, da sie oben schon abgehandelt und erklärt sind, hier übergangen werden können. Das Nämliche gilt von dem Rest der unorganischen Säuren, also von der Salpetersäure und der Chlorsäure. —

Von den organischen Säuren werden die Oxalsäure, die Weinsäure und die Traubensäure von Chlorcalcium aus wässeriger Lösung in der Kälte gefällt, auch wenn Salmiak zugegen ist, das Niederfallen des citronensauren Kalks wird jedoch durch die Gegenwart von Ammoniaksalzen hintertrieben und tritt erst beim Kochen der Lösung oder beim Vermischen derselben mit Alkohol ein; das letztere Mittel dient uns auch zur Abscheidung des äpfelsauren Kalks aus wässeriger Lösung. Setzen wir daher zu unserer Lösung

3) Chlorcalcium und Salmiak,

so wird Oxalsäure, Traubensäure und Weinsteinsäure gefällt, gleichzeitig fallen jedoch die Kalksalze einiger nicht abgeschiedener unorganischer Säuren, z. B. phosphorsaurer Kalk, mit nieder. Wir müssen daher zur Einzelerkennung der gefällten organischen Säuren lauter Reactionen wählen, welche keine Verwechselung derselben mit den ebenfalls gefällten unorganischen Säuren zulassen. — Zur Erkennung der Oxalsäure wählen wir demnach Gypslösung unter Zusatz von Essigsäure (§. 98. c. 4.), zur Auffindung der Weinsteinsäure und Traubensäure aber behan-

deln wir den durch Chlorcalcium erzeugten Niederschlag mit Kalilauge, da hierin nur die Kalksalze der beiden genannten Säuren in der Kälte löslich sind, alle anderen unlöslichen Kalksalze aber davon nicht aufgenommen werden.

In Lösung haben wir jetzt von organischen Säuren noch Citronensäure und Aepfelsäure, Bernsteinsäure und Benzoësäure, Essigsäure und Ameisensäure. Die Citronensäure und Aepfelsäure werden abgeschieden, wenn man zu der von dem oxalsauren, weinsauren etc. Kalk abfiltrirten Flüssigkeit, welche noch überschüssiges Chlorcalcium enthält, Alkohol setzt. Mit dem äpfelsauren und citronensauren Kalk fällt stets schwefelsaurer und borsaurer Kalk nieder, wenn Schwefelsäure und Borsäure zugegen ist, daher man sich wohl zu hüten hat, die Kalkniederschläge dieser Säuren nicht mit denen der Citronensäure und Aepfelsäure zu verwechseln. Durch Abdampfen entfernen wir jetzt den Alkohol und setzen alsdann

4) *Eisenchlorid*

zu. Bernsteinsäure und Benzoësäure werden dadurch in Verbindung mit Eisenoxyd niedergeschlagen, Ameisensäure und Essigsäure bleiben in Lösung. Die Methoden zur weiteren Trennung der einzelnen Gruppen und die Reactionen, worauf die Erkennung der einzelnen Säuren beruht, sind oben bereits ausführlich angegeben worden und können daher hier übergangen werden.

B. Besondere Bemerkungen und Zusätze zum Gang der Analyse.

Zu §. 114.

Im Anfange des §. 114. ist vorgeschrieben, neutrale oder saure wässrige Lösungen mit Salzsäure zu versetzen. Man thut dies tropfenweise. Entsteht kein Niederschlag, so genügen wenige Tropfen, entsteht einer, so tröpfelt man so lange zu, als er sich vermehrt und bis die Reaction deutlich sauer ist. Zusatz von sehr viel Salzsäure ist nicht allein unnöthig, sondern auch nachtheilig. Ein in neutralen oder sauren Lösungen durch Salzsäure hervorbrachter Niederschlag kann Chlorsilber, Quecksilberchlorür, Chlorblei und ein basisches Antimonsalz sein. Die beiden letzten werden durch Verdünnen und Erhitzen der sauren Flüssigkeit aufge-

löst, daher, wenn nach diesen Operationen der Niederschlag nicht verschwindet, wahrscheinlich Chlorsilber oder Quecksilberchlorür zugegen ist. Da durch dieses Verdünnen mit Wasser aus etwa zugegebenen Antimon- oder Wismuthverbindungen unlösliche basische Salze höchst fein zertheilt ausgeschieden werden können, so müssen diese durch Zusatz von Salzsäure aufgelöst werden, ehe man das Verschwinden oder Bleiben des durch Salzsäure erzeugten Niederschlages mit Sicherheit beurtheilen kann.

Setzt man Salzsäure zu einer alkalischen Lösung, so ist dabei zu berücksichtigen, dass man so lange zutröpfele, bis die Flüssigkeit stark sauer reagirt. Großer Ueberschuss der Säure ist auch hier zu vermeiden. Es wird dadurch der die alkalische Reaction bedingende Körper gebunden und die etwa in ihm aufgelösten und mit ihm vereinigten Substanzen scheiden sich aus. War das Alkali frei vorhanden, so kann also hier z. B. Zinkoxyd, Thonerde etc. gefällt werden. Diese lösen sich aber im Ueberschuss der Salzsäure wieder auf. Chlorsilber hingegen würde sich nicht, Chlorblei nur schwierig lösen. War die alkalische Reaction durch ein metallisches Schwefelsalz bedingt, so wird durch Zusatz der Salzsäure das electronegative Schwefelmetall ausgeschieden z. B. Schwefelantimon, während das electropositive z. B. Schwefelnatrium, mit den Bestandtheilen der Chlorwasserstoffsäure Chlornatrium und Schwefelwasserstoff bildet. Rührt sie von einem kohlensauren Alkali oder einem alkalischen Schwefelmetall her, so entweicht Kohlensäure und Schwefelwasserstoff. Alle diese Erscheinungen sind gehörig zu beachten, da sie nicht allein die Anwesenheit der betreffenden Substanzen zu erkennen geben, sondern auch ganze Reihen von Körpern von der Untersuchung ausschliessen.

Zu §. 115.

Wenn man zu einer Flüssigkeit ein Reagens setzt, so sind fast immer zwei allgemeine und ausserdem mehrere besondere Fälle möglich. So kann z. B. beim Zusatz von Schwefelwasserstoff erstens keine Fällung eintreten oder zweitens ein Niederschlag entstehen. Derselbe kann a, weifs, b, gelb, c, orange, d, braun oder schwarz sein. Jeder dieser Fälle ist eine verschiedene Antwort, welche man auf die mit dem Reagens gestellte Frage erhält, jede verschiedene Antwort hat aber eine andere Bedeutung. Es ist also richtige Beobachtung, scharfe Unterscheidung der einzelnen Fälle

eine unerlässliche Bedingung. Jeder Fehlgriff in dieser Beziehung führt vom rechten Wege ab. —

Im Gang der Analyse wird fast immer auf die Farbe des Niederschlags als Kriterium hingewiesen. Wie man vermuthen kann, dass ein dunkler Niederschlag einen helleren verdecke, dass also z. B. bei schwarzem Schwefelquecksilber gelbes Schwefelarsen, dem Auge unbemerkt, vorhanden sein könne, so darf man auch schließen, dass in einem hellen kein dunkler, in einem weissen kein schwarzer Niederschlag enthalten sey. Dieser Schluss lässt sich jedoch nicht immer mit gleicher Sicherheit ziehen, da sich nicht alle Farben so schroff entgegenstehen, wie weiss und schwarz, sondern mehr in einander übergehen, wie z. B. gelb und orange. Lässt daher die Farbe des Niederschlags auf irgend eine Art zweifeln, welcher Nummer man zu folgen habe, so geht man immer am sichersten, wenn man dem Gange folgt, auf welchen die dunklere der fraglichen Farben hinweist, weil bei diesem auf alle möglicherweise gefällten Metalle Rücksicht genommen wird, bei dem andern aber die dunkler gefällten unbeachtet bleiben. Der sichere, wenn auch weitere Weg ist immer dem näheren, wenn er weniger sicher ist, vorzuziehen. —

Um Analysen in möglichst kurzer Zeit zu machen, muss man sich daran gewöhnen, Mancherlei gleichzeitig zu thun, und nicht z. B. nach der Fällung mit Schwefelwasserstoff die Hände in den Schoofs legen, bis der entstandene Niederschlag völlig ausgewaschen ist. Die ersten ablaufenden Tropfen genügen ja schon, um zu prüfen, ob auch ein mit Schwefelammonium fällbarer Körper zugegen sei, oder wenn dieses nicht der Fall ist, ob durch phosphorsaures Natron ein Niederschlag entsteht. Je nach den erhaltenen Resultaten wird man sodann, während man den mit Schwefelwasserstoff entstandenen Niederschlag auswäscht, die davon abfiltrirte Flüssigkeit alsobald mit Schwefelammonium oder kohlensaurem Ammoniak fällen; — während man alsdann den ersten Niederschlag mit Schwefelammonium digerirt, wird der zweite ausgewaschen u. s. w. — Wenn man sich auf diese Art gewöhnt hat, seine Zeit einzutheilen, kann man, ohne im geringsten flüchtig zu arbeiten, in einer Stunde noch einmal so viel zu Stande bringen, als im andern Falle in zwei.

In den Fällen, in welchen man nur mit Metalloxyden aus der sechsten Gruppe z. B. mit Antimonoxyd und mit solchen aus der vierten Gruppe z. B. mit Eisen zu thun hat, kann man zur Tren-

nung derselben die Fällung mit Schwefelwasserstoff aus angesäuerter Lösung ganz ersparen und zu der neutral gemachten Lösung gleich von Anfang Schwefelammonium im Ueberschuss setzen. Man erhält alsdann das Schwefeleisen etc. im Niederschlag, das Antimon etc. in einer Lösung, aus welcher es durch Zusatz einer Säure sogleich als Schwefelantimon gefällt wird. Man hat dabei den Vortheil, dass die Flüssigkeit weniger verdünnt wird, als bei der Fällung mit Schwefelwasserstoffwasser, und dass die Operation schneller und bequemer auszuführen ist, als wenn man Schwefelwasserstoffgas einleitet. — Endlich mag hier nochmals darauf aufmerksam gemacht werden, wie außerordentlich oft sich Anfänger durch Anwendung von verdorbenem oder zu schwachem Schwefelwasserstoffwasser, oder durch Hinzufügung einer zur Fällung unzureichenden Menge desselben, ihre Arbeit erschweren.

Zu §. 116.

Bei der Digestion der aus saurer Lösung mit Schwefelwasserstoff erhaltenen Niederschläge mit Schwefelammonium ist es vor Allem nothwendig, dass man von dem letzteren Reagens die richtige Menge nimmt. Im Durchschnitt genügt eine kleine Quantität, ist Zinnsulfür zugegen, braucht man etwas mehr. Anfänger nehmen jedoch meistens so viel, dass sich bei Zusatz von Säure eine so große Menge Schwefel abscheidet, dass dadurch die Farbe des gleichzeitig ausgeschiedenen electronegativen Schwefelmetalls ganz verdeckt wird. Die Trennung und Einzelerkennung des Antimonoxyds, Zinnoxys und Arsens ist, wenn alle zugleich als Schwefelmetalle gefällt worden sind, eine nicht ganz leichte Aufgabe. Geübte mögen die drei Oxyde immerhin mit dem Löthrohr auch nebeneinander zu erkennen im Stande sein, Anfängern wird es selten mit Sicherheit gelingen. Von den vielen Methoden, welche sich zur Unterscheidung der genannten Metalle anwenden lassen, hat die Erfahrung die §. 116. beschriebene als diejenige bezeichnet, bei welcher Täuschungen am seltensten vorkommen. — Wird Schwefelarsen, Schwefelzinn und Schwefelantimon mit überschüssigem Salpeter und kohlensaurem Natron verpufft, so oxydiren sich die Metalle und der Schwefel auf Kosten des Sauerstoffs der Salpetersäure. In der geschmolzenen Masse hat man sonach arseniksaures, antimonsaures, schwefelsaures und Zinnoxid-Alkali, außerdem Ueberschuss von Salpeter und Soda. Behandelt man mit Wasser, so löst sich das schwefelsaure und das arsensaure

Alkali; das antimonsaure Alkali wird zersetzt, saures Salz bleibt unlöslich zurück, eine geringe Menge Antimonsäure kommt in Form eines basischen Salzes in Lösung. Von dem Zinnoxid löst sich ebenfalls ein Theil in dem vorhandenen kohlensauren Alkali. Wendet man kochendes Wasser an, so ist die Menge der aufgelösten Antimonsäure und des in die Lösung übergehenden Zinnoxids nicht unbedeutend, nimmt man kaltes Wasser, so ist sie sehr gering. Das Ausziehen der Masse mit letzterem ist daher vorzuziehen. Sättigt man jetzt die erhaltene alkalische Lösung mit Salpetersäure und erwärmt, so schlägt sich das gelöste Zinnoxid und die gelöste Antimonsäure nieder, der entstehende Niederschlag ist jedoch nie frei von Arsen. Man ersieht hieraus, wie sorgfältig man es vermeiden muss, viel Antimonsäure oder Zinnoxid in Lösung zu bekommen. — In der mit Salpetersäure gesättigten oder schwach angesäuerten, vom entstandenen Niederschlag abfiltrirten Flüssigkeit hat man jetzt noch arsensaures und schwefelsaures Alkali. Ein Theil derselben soll nach §. 116. mit Silberlösung und Ammoniak, ein anderer mit Bleilösung gefällt werden. Da zur Sichtbarmachung des arsensauren Silberoxyds die Flüssigkeit ganz neutral sein muss, und da der Neutralitätspunkt nicht immer leicht getroffen wird, so ist wie oben angegeben die saure mit Silberlösung versetzte Flüssigkeit mit einer Schicht verdünnten Ammoniaks zu übergießen. Es gelingt bei kleinen Mengen von Arsen auf diese Art am leichtesten den Niederschlag hervorzurufen. — Bei der Fällung mit essigsaurer Bleioxydlösung erhält man ein Gemenge von schwefelsaurem und arsensaurem Bleioxyd. Die Anwesenheit des ersteren macht, dass der Niederschlag bedeutender ist, also leichter gesammelt und vor dem Löthrohr geprüft werden kann; ferner, dass das arsenhaltige Bleikügelchen nicht zu klein wird, so dass man den Arsengeruch durch wiederholtes Blasen längere Zeit hervorzubringen im Stande ist. — So unzweifelhaft man durch diese Reactionen nun auch die Anwesenheit des Arsens darthun kann, so muss doch immer als unerlässliche Bedingung seine Darstellung in metallischer Form festgehalten werden, wie schon oben mehrfach erwähnt ist.

Wird der bei Behandlung der verpufften Masse mit Wasser zurückbleibende, auf Zinn und Antimon zu prüfende Rückstand vor dem Zusammenschmelzen mit Cyankalium nicht sorgfältig durch Auswaschen von allem Salpeter befreit, so erfolgen Explosionen (vgl. §. 101. a. 3.), wodurch nicht nur die Proben weggeschleudert

werden, sondern bei welchen man auch leicht beschädigt werden kann.

Zu §. 117.

Erhitzt man die Schwefelmetalle der zweiten Abtheilung der Gruppe V, zu deren Untersuchung man jetzt übergeht, mit Salpetersäure zum Kochen, so werden Blei, Wismuth, Kupfer und Cadmium auf Kosten eines Theils der Salpetersäure, welche in Stickoxyd und Sauerstoff zerfällt, oxydirt, der Schwefel wird ausgeschieden und die Oxyde verbinden sich mit einem andern Theil Salpetersäure zu auflöslichen salpetersauren Salzen. Schwefelquecksilber hingegen wird durch Salpetersäure nicht zersetzt, wenn nicht in Folge unvollständigen Auswaschens zugleich eine Chlorverbindung vorhanden ist. Ammoniak zersetzt die sämtlichen aufgelösten salpetersauren Metallsalze. Blei und Wismuthoxyd sind aber im Ueberschuss desselben unlöslich, während Cadmium- und Kupferoxyd davon aufgelöst werden. Es ist daher dieses Reagens ein Mittel, die Lösung sowohl auf die Anwesenheit des Blei- und Wismuthoxyds im Allgemeinen zu prüfen, als auch dieselben abzuscheiden. Zugleich lässt es die Gegenwart des Kupferoxyds durch die von gebildetem salpetersaurem Kupferoxydammoniak herrührende blaue Farbe der Flüssigkeit erkennen. Die Ursachen, worauf die weitere Trennung und Erkennung der vier in Frage stehenden Metalle beruht, sind bereits pag. 92. genügend auseinandergesetzt worden. In Bezug auf die Auffindung des Wismuths ist noch zu bemerken, dass dieselbe stets misslingt, wenn man nicht gehörig darauf achtet, den vorhandenen Säureüberschuss möglichst gering zu machen. Durch die §. 117. angegebene Methode wird dies am besten erreicht. Dampft man aber nur fast zur Trockne ab, so bleibt oft so viel Säure zugegen, dass an die Ausscheidung eines basischen Salzes nicht zu denken ist.

Außer der pag. 92. und §. 117. auseinandergesetzten Methode zur Unterscheidung des Cadmiums, Kupfers, Bleis und Wismuths führt auch folgende mit großer Sicherheit zum Ziele. — Man setzt zu der salpetersauren Lösung kohlensaures Kali, so lange noch ein Niederschlag entsteht, alsdann fügt man Cyankaliumlösung im Ueberschusse hinzu und erwärmt. Blei und Wismuth werden hierdurch vollständig als kohlensaure Salze abgeschieden, Kupfer und Cadmium bekommt man als Cyankupfer-Cyankalium und

Cyancadmium-Cyankalium in Lösung. Die ersteren können durch Schwefelsäure leicht getrennt werden, die letzteren scheidet man, indem man der Lösung ihrer Cyanverbindungen in Cyankalium Schwefelwasserstoff im Ueberschuss zusetzt, erwärmt und zur Wiederlösung etwa mit niedergefallenen Schwefelkupfers nochmals etwas Cyankalium hinzufügt. Ein darin unlöslicher gelber Niederschlag von Schwefelcadmium lässt Cadmium erkennen. Zum Filtrat fügt man Salzsäure, ein schwarzer Niederschlag von Schwefelkupfer zeigt Kupfer an. —

Die Anwesenheit des Quecksilbers wäre nun zwar eigentlich schon dadurch dargethan, dass bei dem Erhitzen der Schwefelmetalle mit Salpetersäure ein schwarzer Rückstand bleibt. Da aber öfters ausgeschiedener Schwefel kleine Antheile der andern schwarzen Schwefelmetalle einhüllt und dadurch selbst hie und da schwarz erscheint, da ferner das Schwefelquecksilber unter gewissen Umständen seine schwarze Farbe verlieren kann und der Niederschlag dann mit schwefelsaurem Blei, in welches meist ein Antheil vorhandenen Schwefelbleies verwandelt wird oder mit Zinnoxid zu verwechseln wäre, welches durch Einwirkung der Salpetersäure auf anwesendes, durch Schwefelammonium nicht vollständig ausgezogenes Zinnsulfuret entstanden sein könnte, so ist nähere Prüfung jedes Rückstandes, der beim Kochen mit Salpetersäure bleibt, wenn er nicht reiner, meist auf der Flüssigkeit schwimmender, gelber Schwefel ist, nothwendig. Die Prüfung mit blankem Kupfer geht sehr schnell und ist in hohem Grade bequem. Man beobachtet jedoch, dass dabei häufiger Täuschungen unterlaufen als bei der mit Zinnchlorür. Bei der letzteren ist ganz besonders darauf Rücksicht zu nehmen, dass das Reagens unzersetzt sei, sowie darauf, dass die Quecksilberlösung keine Salpetersäure mehr enthalte. — Hat man, nach der angegebenen Methode verfahren, das Quecksilberoxydul erst durch Salzsäure abgeschieden und man erhält mit Schwefelwasserstoff einen Niederschlag von Schwefelquecksilber, so entspricht dieses stets dem Quecksilberoxyd, Chlorid etc. Hat man mit einer wässerigen oder mit einer Lösung in ganz verdünnter Salzsäure zu thun, so war es als solches in der ursprünglichen Substanz vorhanden. Ist die Lösung aber eine salpetersaure, so kann es sich sehr leicht erst aus Oxydul gebildet haben.

Zu §. 118.

Der Niederschlag, welchen man durch Schwefelammonium

nach §. 118. erhält, kann, wie bereits pag. 225 angeführt worden ist, aus Schwefelmetallen, aus Oxyden und aus phosphorsauren alkalischen Erden, phosphorsaurer Thonerde, oxalsaurer Kalk- (Baryt- und Strontian-) Erde bestehen. Außerdem würden auch die borsauen alkalischen Erden und die oxalsaure Magnesia gefällt werden, sie bleiben aber durch den in der Flüssigkeit gebildeten oder ihr zugesetzten Salmiak in Lösung. Durch Auflösen des Niederschlags in Salzsäure oder Königswasser verwandeln sich die Schwefelmetalle und Oxydhydrate in lösliche Chlormetalle, die phosphorsauren und oxalsauren Salze aber werden unzersetzt gelöst. Fügt man dieser sauren Lösung Ammoniak hinzu, so werden die letzteren wieder niedergeschlagen, mit ihnen fallen Thonerde, Chromoxyd und Eisenoxyd nieder, da dieselben nicht gleich den Oxyden des Mangans, Nickels, Kobalts und Zinks mit Ammoniaksalzen lösliche Doppelverbindungen bilden. Diese Fällung mit Ammoniak bei Gegenwart von Salmiak ist die Basis, auf welcher die weitere Unterscheidung und Einzelerkennung der sämtlichen genannten Körper beruht.— Zu diesem Ausgangspunkt kann man, wie leicht zu ersehen, auch auf eine andere Art gelangen, nämlich dadurch, dass man zu der Flüssigkeit, welche von dem aus saurer Lösung durch Schwefelwasserstoff gefällten Niederschlag abfiltrirt ist, nachdem man durch Kochen den überschüssigen Schwefelwasserstoff verjagt und durch Erhitzen mit Salpetersäure etwa zugegebenes Eisen in Oxyd verwandelt hat, bloß Salmiak und Ammoniak im Ueberschuss setzt. Man erhält alsdann wie natürlich Eisenoxyd, Thonerde, Chromoxyd und die phosphorsauren etc. Erden allein als Niederschlag; aus der ablaufenden Flüssigkeit werden durch Schwefelammonium Mangan, Nickel, Kobalt und Zink gefällt. — Diese letztere Methode führt unter gewissen Umständen leichter und schneller zum Ziele als die oben angegebene, daher man sie geeignetenfalls mit Vortheil anwenden kann. Im Allgemeinen dürfte sie jedoch nicht kürzere sondern längere Zeit erfordern, als die in den Gang aufgenommene. — In Bezug auf die weitere Erkennung des Nickels, Kobalts, Mangans und Zinks ist dem pag. 193 Angeführten nur noch hinzuzufügen, dass, um diese vier Metalle nach der am eben genannten Ort beschriebenen Methode scheiden zu können, Ammoniaksalze nicht zugegen sein dürfen. Da die Abscheidung des Mangans, Nickels etc. vom Eisen u. s. w. nun aber auf der Gegenwart von Ammoniaksalzen beruht, so muss, um diese zu entfernen, die Lösung entweder abgedampft

und der Rückstand geglüht werden, oder man muss die vier Metalle wiederum mit Schwefelammonium fällen. Das letztere Verfahren ist in der Regel dem ersteren vorzuziehen. Der Niederschlag der Schwefelmetalle ist, soll anders der beabsichtigte Zweck vollständig erreicht werden, natürlich gut auszuwaschen. — Die Trennung des Eisenoxyds und der phosphorsauren und oxalsauren alkalischen Erden von der Thonerde und dem Chromoxyd beruht auf der Löslichkeit dieser und der Unlöslichkeit jener Verbindungen in kaustischem Kali; die des Eisenoxyds von den Erdsalzen aber auf dem Umstande, dass die Fällung des ersteren, nicht aber die der letzteren verhindert wird, wenn man vor dem Zusatze von Ammoniak zur sauren Lösung Weinsteinsäure hinzufügt. Vergl. Zus. u. Bemerk. zu §. 88.

Zu §. 127.

Auch die dritte Classe von Körpern hat keine scharf bestimm- baren Grenzen, da die Löslichkeit oder Unlöslichkeit mehrerer dahin zu rechnender Verbindungen sehr von der Menge und Con- centration der Säure und der Dauer des Kochens abhängt. Aufser den angeführten schwerlöslichen Körpern ist besonders noch auf manche Schwefel- und Jodmetalle zu achten, welche sich gleich- falls nur in concentrirter Salzsäure und durch längere Einwirkung in der Hitze lösen. Hat sich ein Körper durch längeres Kochen in Salpetersäure gelöst, so darf man nicht auf die Abwesenheit des Quecksilberchlorürs schliessen, da dieses, wie schon oben erwähnt, durch solche Behandlung in salpetersaures Quecksilberoxyd und Quecksilberchlorid verwandelt und so aufgelöst wird.

— Was die unter den Körpern der dritten Classe genannten Chlorverbindungen, nämlich Chlorsilber, Quecksilberchlorür und Chlorblei, betrifft, so können sie sowohl in der ursprünglichen Verbindung als solche vorhanden gewesen, als auch durch die Behandlung mit Salzsäure erst gebildet worden sein. Die Gegen- wart des Chlorbleis hat man alsdann schon in der wässerigen Lö- sung erkannt, von der ursprünglichen Anwesenheit der beiden Andern kann man sich folgendermassen überzeugen. Man erschöpft die in Wasser unlösliche Substanz mit verdünnter Salpetersäure. Dadurch werden alle Quecksilberoxydul- und Silberoxydsalze auf- gelöst, die genannten Chlorverbindungen und Jodsilber bleiben zu- rück. Man trennt sie durch Ammoniak, welches die Anwesenheit des Quecksilberchlorürs zugleich erkennen lässt.

Die Zersetzung der schwefelsauren alkalischen Erden kann man auch auf nassem Wege, durch längeres Kochen derselben mit kohlensaurer Kalilauge, ausführen. Das Schmelzen mit kohlensaurem Natronkali giebt jedoch weit sicherere Resultate und ist, wenn man kleine Proben nimmt, auch sehr schnell auszuführen. Man hat dabei zugleich den Vortheil, dass man die Anwesenheit der Kieselsäure mit Gewissheit erkennt.

Die schwefelsauren Erden werden durch das kohlensaure Alkali so zerlegt, dass sich kohlensaure Erden und schwefelsaures Alkali bildet. Würde man den Niederschlag jener nicht oder nicht vollständig auswaschen, ehe man ihn in Salzsäure löste, so bildeten sich durch Einwirkung des nicht gewaschenen schwefelsauren Alkalis wieder schwefelsaure Erden und die Untersuchung wäre, wo nicht vereitelt, doch unsicher gemacht; indem dadurch z. B. aller gelöste Baryt wieder gefällt worden sein könnte.

Auf Kohlenstoff wurde bei dieser dritten Classe desswegen Rücksicht genommen, weil er zuweilen bei Untersuchungen vorkommt und alsdann dem nicht darauf vorbereiteten Anfänger oft große Schwierigkeiten macht. Der Graphyt zeichnet sich vor den andern Kohlenarten dadurch aus, dass er im Platinlöffel nicht und vor dem Löthrohre sehr schwer verbrennt, auch deutet das Eisen, welches er im Durchschnitt beigemischt enthält, darauf hin.

Zu §. 128.

Die Analyse der Cyanverbindungen ist in gewissen Fällen nicht ganz leicht, besonders ist es zuweilen schwierig, nur erst zu finden, dass man überhaupt mit einer solchen zu thun hat. Beachtet man jedoch die Erscheinungen beim Glühen der Substanz (§.105. A. I. 2. f.) sowie ob sich beim Kochen mit Salzsäure ein Geruch nach Blausäure entwickelt (§.106. A. 2.), so wird man über die Anwesenheit einer Cyanverbindung im Allgemeinen in der Regel nicht lange in Zweifel sein.

Man hat nun vor Allem ins Auge zu fassen, dass die in der Pharmacie u. s. w. vorkommenden unlöslichen Cyanverbindungen zwei ganz verschiedenen Classen angehören. Es sind nämlich entweder einfache Cyanverbindungen, oder es sind Verbindungen von Metallen mit Ferrocyan oder einem andern von diesen zusammengesetzten Radikalen.

Die einfachen Cyanverbindungen werden alle durch Kochen mit concentrirter Salzsäure in Chlormetalle und Cyanwasserstoff-

säure zerlegt. Ihre Analyse ist daher niemals schwierig. Die Ferrocyanverbindungen etc. jedoch, auf welche sich der im §. 128. angegebene Gang auch eigentlich allein bezieht, erleiden durch Säuren so verwickelte Zersetzungen, dass ihre Analyse auf diese Art nicht leicht gelingt. — Weit einfacher gestaltet sich stets ihre Zersetzung durch Alkalien. Dieselben scheiden nämlich das mit dem Ferrocyan oder überhaupt mit dem zusammengesetzten Radikal verbundene Metall als Oxyd ab, indem sie an dasselbe ihren Sauerstoff abgeben und als Metalle mit den Radikalen zu löslichem Ferrocyankalium etc. in Verbindung treten. — Der Gang im §. 128. beruht nun darauf, dass man zuerst versucht, eine Zersetzung der Art durch kohlen-saures Kali zu bewirken. Gelingt dies, so hat man den Vortheil, dass die abgeschiedenen Oxyde ungelöst bleiben, dass also ihre weitere Analyse sich sehr einfach gestaltet; gelingt es nicht, so muss man zu kaustischem Kali seine Zuflucht nehmen. Im Ueberschuss desselben sind nun aber mehrere Oxyde löslich, als Bleioxyd, Zinkoxyd etc. Kocht man daher z. B. das Ferrocyanzinkkalium mit kaustischem Kali, so löst es sich gänzlich auf; wir können annehmen, dass in der Lösung Ferrocyankalium und Zinkoxyd in Kali gelöst vorhanden sei. Fügten wir zu dieser Lösung eine Säure, so bekämen wir wie natürlich unsern ursprünglichen Niederschlag von Ferrocyanzinkkalium wieder und hätten also durch die Operation nichts erreicht. Wir leiten also, um diesem Uebelstande vorzubeugen, in die kalische Lösung Schwefelwasserstoff. Hierdurch werden alle schweren Metalle, welche sich als Oxyde in Kali gelöst befinden, in Schwefelmetalle verwandelt. Die in Kali unlöslichen, als Schwefelblei, Schwefelzink etc. scheiden sich aus, die in alkalischen Schwefelmetallen löslichen, als Schwefelzinn, Schwefelantimon etc. bleiben gelöst und scheiden sich erst beim Zusatz einer Säure aus. —

In der von den Oxyden oder Schwefelmetallen abfiltrirten Flüssigkeit hat man das Cyan also stets (im Falle man nämlich wirklich mit Verbindungen zusammengesetzter Cyan-Radikale zu thun hat) als Ferrocyan- etc. Kalium. Aus den meisten derselben (dem Ferrocyan-, Ferridcyan-, Chromidcyan- und Manganocyan-Kalium) wird das Cyan theilweise als Cyanwasserstoffsäure abgeschieden, wenn man die Lösungen derselben mit Schwefelsäure kocht, und kann also auf diese Art leicht aufgefunden werden; — das Kobaltcyanidkalium aber kann durch Schwefelsäure nicht zerlegt werden, daher die direkte Nachweisung des Cyans in demselben

nicht leicht gelingt. — Durch Schmelzen mit Salpeter werden sämmtliche in Rede stehenden Verbindungen, auch das Kobaltcyanidkalium, zersetzt. Dampft man dieselben nicht zuvor mit einem Ueberschuss von Salpetersäure ein, so entstehen bei dem Schmelzen mit Salpeter leicht Explosionen. — Man thut überhaupt wohl daran, bei dieser Operation unter allen Umständen vorsichtig zu sein. —

Will man endlich in einfachen oder zusammengesetzten Cyanverbindungen nur die anwesenden Basen finden, so genügt es in den meisten Fällen, die Substanz eine Zeit lang für sich zu glühen oder besser mit kohlensaurem Natronkali zusammenzuschmelzen. Man erhält hierdurch die Metalle entweder regulinisch oder mit Kohlenstoff verbunden. Im Falle man mit kohlensauren Alkalien geschmolzen hat, bekommt man in der Schlacke Cyankalium, wenn es nicht durch die zufällige Gegenwart reducirbarer Oxyde (vergl. §. 100. d. 1.) in cyansaures Kali übergeführt worden ist.

Wenn man sich mit dem Verhalten der Körper zu Reagentien vertraut gemacht hat, so geht man behutsam der Erkennung der vorhandenen chemischen Analyse zu wirklichen Untersuchungen über. Es ist nicht gleichgültig, ob man dabei in der Reihenfolge der Substanzen, die man zur Lösung analysirt, ganz regellos verfährt, oder ob man stänbliche Untersuchungen unter einem bestimmten Gesichtspunkt bringt. Viele Wege können zum Ziele führen, aber einer ist immer der nächste. — Um auch in dieser Beziehung Anfinger nicht ohne Leitung zu lassen, theile ich in Folgendem einen Faden mit, an welchem fortschreitend man, wie die Erfahrung gelehrt hat, schnell und sicher zum Ziele gelangt. Vor Allem muss man, so lange man zur Lösung analysirt, mit größter Bestimmtheit erfahren können, ob die gefundenen Resultate richtig sind, weil nur dadurch das Vertrauen auf die Sicherheit des Ganges hervorgerufen und eine gewisse Zuversicht, ein gewisses notwendiges Selbstvertrauen geweckt wird; weil nur daraus die sichere Ueberzeugung erwächst, dass man bloß durch ein geregeltes und durchdachtes Verfahren zum Ziele gelangt. Man lasse sich also die zu untersuchenden Substanzen von einem Andern, der ihre Bestandtheile ganz genau kennt, mischen. Hat man dazu keine Gelegenheit, so ist es noch besser, man mischt sie sich selbst und erist sodann, gerade als ob man sie nicht wüßte, die Bestandtheile nach, als

Anhang zur zweiten Abtheilung.

Allgemeines Schema, nach dem man die Substanzen, welche zur Erlernung der qualitativen Analyse untersucht werden sollen, zweckmäfsig auf einander folgen lässt.

Wenn man sich mit dem Verhalten der Körper zu Reagentien vertraut gemacht hat, so geht man behufs der Erlernung der qualitativen chemischen Analyse zu wirklichen Untersuchungen über. Es ist nicht gleichgültig, ob man dabei in der Reihenfolge der Substanzen, die man zur Uebung analysirt, ganz regellos verfährt, oder ob man sämtliche Untersuchungen unter einen bestimmten Gesichtspunkt bringt. Viele Wege können zum Ziele führen, aber einer ist immer der nächste. — Um auch in dieser Beziehung Anfänger nicht ohne Leitung zu lassen, theile ich in Folgendem einen Faden mit, an welchem fortschreitend man, wie die Erfahrung gelehrt hat, schnell und sicher zum Ziele gelangt.

Vor Allem muss man, so lange man zur Uebung analysirt, mit größter Bestimmtheit erfahren können, ob die gefundenen Resultate richtig sind, weil nur dadurch das Vertrauen auf die Sicherheit des Gangs hervorgerufen und eine gewisse Zuversicht, ein gewisses nothwendiges Selbstvertrauen geweckt wird; weil nur daraus die sichere Ueberzeugung erwächst, dass man blofs durch ein geregeltes und durchdachtes Verfahren zum Ziele gelangt. Man lasse sich also die zu untersuchenden Substanzen von einem Andern, der ihre Bestandtheile ganz genau kennt, mischen. Hat man dazu keine Gelegenheit, so ist es noch besser, man mischt sie sich selbst und weist sodann, gerade als ob man sie noch nicht wüsste, die Bestandtheile nach, als

wenn man ganz unbekannte Substanzen zur Untersuchung wählt. Man gebe nur einem Anfänger ein Gemenge, dessen Bestandtheile man selbst nicht genau kennt, zum Analysiren; er findet dies und jenes, das unterliegt keinem Zweifel, wo soll aber sein Vertrauen auf die Methode und auf die eigne Kraft herkommen, wenn man ihm nur antworten kann, »es ist leicht möglich, es kann wohl sein«, und wenn man nicht zu sagen vermag »ja« oder »nein«. —

Je nach der Individualität und den Vorkenntnissen wird der Eine sehr viele, der Andere nur eine geringere Anzahl von Untersuchungen machen müssen, bevor er seiner Sache gewiss wird. Ich theile das folgende Schema in hundert Nummern, weil ich zu der Ueberzeugung gelangt zu sein glaube, dass eine solche Anzahl zweckmäfsig ausgewählter Analysen zur gründlichen Erlernung des Verfahrens im Durchschnitte hinreichend ist.

A. Von 1 — 20.

Wässerige Lösungen einfacher Salze, z. B. von schwefelsaurem Natron, salpetersaurem Kalk, Chlorkupfer etc. —

Zur Erlernung des Ganges bei der Analyse von in Wasser löslichen Substanzen, die nur eine Base enthalten. Hierbei soll nur nachgewiesen werden, welche Base in der Flüssigkeit gelöst ist, auf den Beweis aber, dass sonst keine andere zugegen ist, wie auch auf die Auffindung der Säure kein Gewicht gelegt werden.

B. Von 21 — 50.

Eine Säure und eine Base enthaltende Salze etc. in fester Form (zerrieben), z. B. kohlensaurer Baryt, borsaures Natron, phosphorsaurer Kalk, arsenige Säure, Chlornatrium, Weinstein, Grünspan, schwefelsaurer Baryt, Chlorblei etc.

Zur Erlernung, wie eine feste Substanz in eine zur Untersuchung geeignete Form gebracht (also aufgelöst oder aufgeschlossen) wird, wie ein Metalloxyd gefunden wird, wenn der Körper auch nicht in Wasser löslich ist, und wie man die Gegenwart einer Säure nachweist. — Base und Säure muss gefunden werden; der Beweis, dass sonst keine Bestandtheile vorhanden sind, ist nicht zu führen.

C. Von 51 — 70.

Wässerige oder saure Lösungen mehrerer Basen. Zur Erlernung der Trennung und Unterscheidung mehrerer

Metalloxyde. Es muss der Beweis geführt werden, dass außer den gefundenen Basen keine weiteren vorhanden sind. Die Säuren bleiben unberücksichtigt.

I. Von Nro. 51 — 60; zur Erlernung der Scheidung der Metalloxyde in die Hauptgruppen. Die Lösungen enthalten also z. B. Kali, Kalk und Blei; — Kupfer, Eisen und Arsen; — Baryt, Antimon, Wismuth und Kali etc.

II. Von Nro. 61 — 70; zum Erkennenlernen der einzelnen in eine Gruppe gehörenden Basen neben einander. Die Nummern enthalten demnach etwa: Kali, Natron und Ammoniak; — Zink, Mangan und Nickel; — Kupfer, Quecksilber und Blei; — Antimon, Zinn und Arsen etc.

D. Von Nr. 71 — 80.

Wässerige Lösungen, welche mehrere Säuren in freiem oder gebundenem Zustande enthalten, z. B. Schwefelsäure, Phosphorsäure und Borsäure; — Kohlensäure, Schwefelwasserstoff und Blausäure; — Weinsteinsäure, Citronensäure und Aepfelsäure; — Chlor, Jod und Brom; — Salpetersäure, Chlorwasserstoffsäure und Oxalsäure etc. —

Zur Erlernung der Auffindung mehrerer Säuren neben einander. Es muss der Beweis geführt werden, dass außer den gefundenen keine weiteren zugegen sind. — Die Basen bleiben unberücksichtigt.

E. Von Nr. 81 — 100.

Legirungen, Mineralien und gemengte Körper jeder Art.

Zur weiteren Uebung und zur Bestätigung, dass man seiner Sache sicher sei. — Es müssen alle Bestandtheile gefunden, es muss die Natur der Substanz erforscht werden.

Zusammensetzung
der
häufiger vorkommenden Formen und Verbindungen der
beachteten Körper,
mit besonderer Berücksichtigung der Classen,
in welche sie nach ihrer Löslichkeit
in Wasser, in Salzsäure oder Salpetersäure
gehören.

Vorbemerkungen.

Der Kürze wegen sind die Classen, in welche die Verbindungen nach der in §. 106. gemachten Eintheilung gehören, durch Zahlen ausgedrückt. Für die auf der Gränze stehenden Körper sind die Zahlen der betreffenden Classen verbunden angegeben. Es bezeichnet also 1—2 einen Körper, der in Wasser schwerlöslich ist, von Salzsäure oder Salpetersäure aber gelöst wird. 1—3 einen in Wasser schwerlöslichen Körper, dessen Löslichkeit durch Zusatz von Säuren nicht vermehrt wird, und 2—3 einen in Wasser unlöslichen, in Salzsäure oder Salpetersäure schwerlöslichen Körper. Ist das Verhalten einer Verbindung zu Salzsäure von dem zu Salpetersäure wesentlich verschieden, so wird es in den Anmerkungen gesagt.

Die Haloidsalze und Schwefelverbindungen sind der Uebersichtlichkeit wegen, je nachdem sie ihnen entsprechen, in den Columnen des Oxyds oder Oxyduls ohne besondere Ueberschrift des reinen Metalls angeführt.

Die officinellen und besonders häufig vorkommenden Verbindungen sind mit römischen Zahlen bezeichnet.

Unter den Salzen sind im Durchschnitt die neutralen verstanden, basische und saure aber, wie auch Doppelsalze, im Falle sie officinell sind, in den Anmerkungen angeführt. Die bei den betreffenden neutralen oder einfachen Salzen stehenden kleineren Zahlen deuten auf sie hin.

Cyan, Chlorsäure, Citronensäure, Aepfelsäure, Benzoësäure, Bernsteinsäure und Ameisensäure kommen nur in Verbindung mit wenigen Basen öfter vor und sind daher nicht in die Tabelle aufgenommen. Die am häufigsten vorkommenden Verbindungen dieser Körper sind: Cyankalium I, Ferrocyankalium I, Ferridcyankalium I, Eisenferrocyanid (Berlinerblau) III, Ferrocyanzinkkalium II — III, chlorsaures Kali I, citronensaure Alkalien I, äpfelsaure Alkalien I, äpfelsaures Eisenoxyd I, benzoësäure Alkalien I, bernsteinsaure Alkalien I, ameisensaure Alkalien I.


	KO	NaO	NH ₄ O	BaO	SrO	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	MnO	FeO	Fe ₂ O ₃	CoO	NiO	ZnO
	I	I	I	I	1	I-II	II	II	II	II	II	II	II	
S	I	I	I	I	1	I-II	2		II	II	II	15	16	II
Cl	I	I	I ₁₂	I	1	I	1	1	I	I	I ₁₂	I	I	1
J	I	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1
SO ₃	I ₁	I	I ₁₃	III	III	I-III	1	I ₁₋₁₃	I	I	I	1	1	I
NO ₅	I	I	1	I	1	1	1	1	I	1	1	I	I	1
PO ₅	1	I ₁₀	1 ₁₀	2	2	II ₁₄	2	2	2	2	II	2	2	2
CO ₂	I ₂	I ₁₁	I	II	II	II	II		II	2		2		II
C ₂ O ₃	I ₃	1	I	2	2	II	2	2	2	1-2	1-2	2	2	2
BO ₃	1 ₄	I ₄	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
$\bar{A}$	I	I	I	I	1	1	1	1		1	I	1	1	I
$\bar{T}$	I ₄₋₉	I ₇	1 ₆	2	2	II	1-2	1	1-2	1-2	I ₈	1		2
AsO ₅	I	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
AsO ₃	I	1	1	2	1	2				2		2	2	
CrO ₃	I	1	1	2	2	1	1	2	1		1	2	1	

A n m e r k u n g e n.

1. Schwefelsaure Kalithonerde I.
2. Doppelt kohlensaures Kali I.
3. Saures oxalsaures Kali I.
4. Boraxweinstein I.
5. Saures weinsteinsaures Kali I.
6. Weinsteinsaures Ammoniak-Kali I.
7. Weinsteinsaures Natron-Kali I.
8. Weinsteinsaures Eisenoxyd-Kali I.
9. Weinsteinsaures Antimonoxyd-Kali I.
10. Phosphorsaures Natron - Ammoniak I.
11. Doppelt kohlensaures Natron I.
12. Ammoniumeisenchlorid I.
13. Schwefelsaure Ammoniakthonerde I.
14. Basisch phosphorsaurer Kalk II.
15. Schwefelkobalt wird von Salpetersäure leicht, von Salzsäure sehr schwierig zersetzt, nicht officinell.
16. Schwefelnickel wie Schwefelkobalt.
17. Schwefelzink wie Schwefelkobalt.
18. Mennige wird von Salzsäure in Chlorblei, von Salpetersäure in vom Ueberschuss der Säure gelöst werdendes Oxyd und in braunes in Salpetersäure unlösliches Bleisuperoxyd verwandelt.
19. Basisch essigsaures Bleioxyd I.
20. Zinnsulfuret und Zinnsulfid werden von Salzsäure zersetzt und aufgelöst, von Salpetersäure in im Ueberschuss der Säure unlösliches Oxyd verwandelt. Sublimirtes Zinnsulfid wird nur von Königswasser aufgelöst.

	CdO	PbO	SnO	SnO ₂	BiO	CuO	Hg ₂ O	HgO	AgO	PtO ₂	AuO ₃	SbO ₃	Cr ₂ O ₃
	2	2 ₁₈	2	2 et 3	2	II ₂₂	II	II	2	2		35	II et III
S	2	2	2 ₂₀	2 ₂₀	2	2 ₂₃	III	III	3 ₃₀	3 ₃₁		II ₃₆	
Cl	1	I-III	I	1	I	I ₂₄	II-III	I ₂₈	III	I ₃₂₋₃₃	I ₃₄	I ₃₇	I
J	1	II	2				II	II	3				
SO ₃	I	II-III	1	1	1	I ₂₅	1-2	I ₂₉	I-III	1		2	I
NO ₅	1	I			I ₂₁	I	I ₂₇	I	I	1			I
PO ₅	2	2				2	2	2	2				2
CO ₂	2	II			2	II	2	2	2				
C ₂ O ₃	2	II	2		2	2	2	2	2			1-2	1
BO ₃	1-2	2	2		2	2	1		2				2
$\bar{A}$	1	I ₁₉	1	1	1	I ₂₆	1-2	1	I			1	1
$\bar{T}$	1-2	II	1-2		2	1	1-2	2	2			I ₃₈	1
AsO ₅		2			2	2	2	2	2			2	1
AsO ₃		2				II	2	2	2			2	
CrO ₃		II-III	2		2	2	2	1-2	2			2	2

21. Basisch salpetersaures Wismuthoxyd II.
22. Kupferoxydammoniak 1.
23. Schwefelkupfer wird von Salzsäure schwierig, von Salpetersäure leicht zersetzt.
24. Ammoniumkupferchlorid 1.
25. Schwefelsaures Kupferoxydammoniak 1.
26. Basisch essigsaures Kupferoxyd, in Wasser partiell, in Säuren vollständig löslich.
27. Basisch salpetersaures Quecksilberoxydul-Ammoniak II.
28. Basisches Ammoniumquecksilberchlorid II.
29. Basisch schwefelsaures Quecksilberoxyd II.
30. Schwefelsilber nur in Salpetersäure löslich.
31. Schwefelplatin wird von Salzsäure nicht angegriffen, von kochender Salpetersäure in lösliches schwefelsaures Platinoxid verwandelt.
32. Kaliumplatinchlorid 1—3.
33. Ammoniumplatinchlorid 1—3.
34. Natrium-Goldchlorid I.
35. Antimonoxyd in Salzsäure, nicht in Salpetersäure löslich.
36. Schwefelantimoncalcium 1—2.
37. Basisches Antimonchlorid II.
38. Weinsaures Antimonoxydkali I.



Fresenius, Remigius,

Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse oder die Lehre von den Operationen, von den Reagentien und von dem Verhalten der bekannteren Körper zu Reagentien, sowie systematisches Verfahren zur Auffindung der in der Pharmacie, den Künsten und Gewerben häufiger vorkommenden Körper in

Braunschweig 1843

Chem. 102 h

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10072590-2